

Muscles de la hanche

Plan :

- I. Introduction :
 - II. Les muscles du bassin :
 1. Muscle ilio-psoas (psoas iliaque)
 2. Muscle petit psoas
 - III. Les muscles de la région glutéale :
 1. Groupe des muscles glutéaux (muscles fessiers) et tenseurs du fascia lata.
 - 1.1. Muscle petit glutéal (petit fessier)
 - 1.2. Muscle moyen glutéal (moyen fessier)
 - 1.3. Muscle grand glutéal (grand fessier)
 - 1.4. Tenseur du fascia lata
 2. Groupe des muscles pelvi-trochantériens
 - 2.1. Muscle piriforme (Pyramidal)
 - 2.2. Muscle obturateur interne
 - 2.3. Muscle obturateur externe
 - 2.4. Muscles jumeaux
 - 2.5. Muscle carré fémoral (carré crural)
-

Les objectifs :

- *Connaitre les muscles du bassin et les muscles glutéaux.*
 - *Comprendre l'action des différents muscles.*
 - *Connaitre l'innervation des muscles.*
-

I. Introduction :

Les muscles de la hanche se disposent en deux groupes :

- Groupe antérieur :(muscle du bassin) muscle iliopsoas, le petit psoas(inconstant)
- Groupe postérieur : région glutéale faite de 10 muscles disposés en deux plans :
 - * plan superficiel : les muscles glutéaux et le tenseur du fascia lata.
 - * plan profond : les pelvitrochantériens au nombre de six placés derrière l'articulation coxo-fémorale.

I. muscles du bassin :

Les muscles du bassin sont représentés par deux muscles : le muscle iliaque et le muscle psoas.

A ces deux muscles s'ajoute un muscle inconstant, le muscle petit psoas.

1. Muscle ilio-psoas (psoas iliaque) composé de deux muscles, muscle grand psoas et muscle iliaque :

Origine :

- Muscle iliaque : fosse iliaque.

- Muscle grand psoas : face antéro-latérale des corps vertébraux T12 - L5, disques intervertébraux, les processus transverses L1- L5.

Trajet : les fibres se rejoignent au-dessus de l'articulation coxo-fémorale pour former un tendon commun.

Terminaison : sur le petit trochanter.

Action : fléchisseur et rotateur latéral de la cuisse.

Innervation : par des branches du plexus lombaire pour le grand psoas, et par le nerf fémoral pour le muscle iliaque.

2. Muscle petit psoas

Origine : face latérale des corps vertébraux et disque intervertébral de D12 à L1.

Terminaison : par un long tendon sur la ligne arquée (ligne innominée).

Action : fléchisseur accessoire du bassin.

Innervation : par des branches du plexus lombaire.

II. Muscles de la région glutéale :

Les muscles de la région glutéale se répartissent en deux groupes musculaires :

- Le groupe des muscles glutéaux (muscles fessiers) et tenseurs du fascia lata (4 muscles).
- Le groupe des muscles pelvi-trochantériens (6 muscles).

1. Groupe des muscles glutéaux (muscles fessiers) et tenseurs du fascia lata.

Ils sont disposés en trois plans :

1.1. Muscle petit glutéal (plan profond)

Origine : surface glutéale en avant de la ligne glutéale antérieure.

Terminaison : bord antérieur du grand trochanter.

Actions : abducteur de la cuisse et rotateur de la cuisse.

Innervation : nerf glutéal supérieur (plexus sacral).

1.2. Muscle moyen glutéal (plan moyen)

Origine : surface glutéale, entre les lignes glutéales antérieure et postérieure.

Terminaison : par un tendon sur la face latérale du grand trochanter.

Actions : abducteur et rotateur de la cuisse.

Innervation : nerf glutéal supérieur (plexus sacral).

1.3. Muscle grand glutéal (plan superficiel)

C'est le muscle le plus volumineux et puissant de l'organisme, il est constitué de deux faisceaux : superficiel et profond.

Origine :

- faisceau profond : sur la surface glutéale, sacrum (bord latéral), coccyx.

- faisceau superficiel : sacrum (crête médiane et intermédiaire), ¼ postérieur de la crête iliaque.

Terminaison :

- faisceau profond : sur la tubérosité glutéale du fémur (crête du grand fessier de la ligne âpre)

- faisceau superficiel : sur la lame tendineuse du fascia lata.

Actions :

- extenseur et rotateur latéral de la cuisse, il est aussi abducteur et adducteur de la cuisse par ses faisceaux supérieur et inférieur respectivement.

Innervation : nerf glutéal inférieur (plexus sacral).

1.4. Muscle tenseur du fascia lata (plan superficiel) :

Muscle allongé, charnu à son extrémité supérieure, il forme la limite externe de la région glutéale.

Origine : sur la crête iliaque et l'épine iliaque antéro-supérieure.

Terminaison : sur la partie supérieure du tractus ilio-tibial (lame tendineuse du fascia lata) qui se termine sur la face latérale de la tubérosité latérale du tibia.

Actions : tenseur du tractus ilio-tibial, extenseur de la jambe, abducteur de la cuisse.

Innervation : nerf glutéal supérieur (plexus sacral).

NB : le muscle grand glutéal et le muscle tenseur du fascia lata sont situés dans le même plan et forment un ensemble fonctionnel appelé le deltoïde fessier de FARABEUF.

2. Groupe des muscles pelvi-trochantériens :

2.1. Muscle piriforme (pyramidal du bassin)

Origine : sur la face antérieure du sacrum de S2 à S4.

Trajet : il sort du bassin par la grande incisure ischiatique.

Terminaison : face supérieure du grand trochanter.

Actions : abducteur et rotateur latéral de la cuisse.

Innervation : nerf du pyramidal (plexus sacral).

2.2. Muscle obturateur interne

Origine endopelvienne : cadre interne du trou obturateur et de sa membrane obturatrice.

Trajet : il sort du bassin par la petite incisure ischiatique, où il se réfléchit à angle droit, et se dirige vers le grand trochanter.

Terminaison : face interne du grand trochanter du fémur.

Actions : rotateur latéral de la cuisse.

Innervation : nerf de l'obturateur interne et du jumeau supérieur (plexus sacral).

2.3. Muscle obturateur externe :

Origine exopelvienne : cadre externe du trou obturateur et de sa membrane obturatrice.

Terminaison : face interne du grand trochanter.

Actions : rotateur latéral.

Innervation : rameau du nerf obturateur (**plexus lombaire**).

2.4. Muscles jumeaux :

Origine :

- jumeau supérieur : face externe de l'épine ischiatique.

- jumeau inférieur : au-dessus de la tubérosité ischiatique.

Terminaison : face interne du grand trochanter du fémur.

Actions : rotateur latéral de la cuisse.

Innervation :

- Jumeau supérieur : nerf de l'obturateur interne et du jumeau supérieur (plexus sacral).

- Jumeau inférieur : nerf du jumeau inférieur et du carré fémoral (plexus sacral).

2.5. Muscles carré fémoral (carré crural) :

Origine : Tubérosité ischiatique en dedans des ischio-jambiers.

Terminaison : bord postérieur du grand trochanter (crête intertrochantérique).

Actions : rotateur latéral de la cuisse, un puissant adducteur de la cuisse.

Innervation : nerf du jumeau inférieur et du carré fémoral (plexus sacral).

III- RÉFÉRENCES

BRIZON J, CASTAING J. Les Feuilletts d'Anatomie. Muscles du membre inférieur. Fascicule V. Librairie Maloine SA. Paris 1953.

HAMMOUDI SS. Le cours d'Anatomie, appareil locomoteur 2, membre inférieur. Auto édition.2004.p162-171.

ROUVIERE H. Anatomie Humaine. Descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome troisième. Membres. 13ème Ed. Masson éd. Paris 2002:p410-422.




Figure 01 : muscles de la région glutéale




Figure 02 : muscles du bassin