

Muscles de la jambe

Plan :

I. Introduction :

II. Anatomie descriptive :

1. La loge antérieure

- 1.1. Tibial antérieur (jambier antérieur)
- 1.2. Long extenseur de l'hallux (extenseur propre du gros orteil)
- 1.3. Long extenseur des orteils (extenseur commun des orteils)
- 1.4. Troisième fibulaire (péronier antérieur)

2. La loge latérale

- 2.1. Court fibulaire (court péronier latéral)
- 2.2. Long fibulaire (long péronier latéral)

3. La loge postérieure

- 3.1. Poplité
- 3.2. Long fléchisseur des orteils (long fléchisseur commun des orteils)
- 3.3. Tibial postérieur (jambier postérieur)
- 3.4. Long fléchisseur de l'hallux (long fléchisseur propre du gros orteil)
- 3.5. Le soléaire
- 3.6. Muscles gastrocnémiens médial et latérale (jumeaux interne et externe)
- 3.7. Plantaire (plantaire grêle)

Les objectifs :

- *Connaitre les muscles de la jambe.*
- *Comprendre l'action des différents muscles.*
- *Connaitre l'innervation des muscles.*

I. Introduction :

La jambe est divisée en trois loges musculaires (antérieure, latérale et postérieure) par deux septums intermusculaires antérieur et postérieur (cloisons intermusculaires antérieure et postérieure), tendues des bords antérieur et postérieur de la fibula à la face profonde du fascia crural (aponévrose jambière).

II. Anatomie descriptive :

1. La loge antérieure :

La loge antérieure est limitée : en dedans par la face latérale du tibia ; en dehors par le septum intermusculaire antérieur ; en avant par le fascia crural.

La loge antérieure comprend le groupe musculaire antérieur : composé de 4 muscles juxtaposés de dedans en dehors, en arrière par la membrane interosseuse crurale.

1.1. Tibial antérieur (jambier antérieur) :

Origine : Sur le tubercule infracondyloire (de Gerdy) sur le condyle latéral du tibia, sur la crête oblique de la tubérosité tibiale et les 2/3 supérieur la face latérale du tibia.

Terminaison : sur la face médiale de l'os cunéiforme médial et la base du 1er métatarsien.

Action : Fléchisseur dorsal puis adducteur et rotateur médial du pied.

Innervation : le nerf fibulaire profond.

1.2. Long extenseur de l'hallux (extenseur propre du gros orteil) :

Origine : la face médiale de la fibula.

Terminaison : la face dorsale de la phalange distale de l'hallux, sur les bords latéraux de P1.

Action : extenseur de P2 sur P1 et P1 sur le premier métatarsien, fléchisseur dorsal et rotateur médial du pied.

Innervation : le nerf fibulaire profond

1.3. Long extenseur des orteils (extenseur commun des orteils) :

Origine : le condyle latéral du tibia et sur la face médiale de la fibula.

Terminaison : Par 4 tendons destinés aux 4 derniers orteils.

Action : extenseur des orteils et fléchisseur et rotateur latéral du pied.

Innervation : le nerf fibulaire profond

1.4. Troisième fibulaire (péronier antérieur) : muscle inconstant.

Origine : Il s'insère sur la face médiale de la fibula.

Terminaison : sur la face dorsale de la base du 5ème métatarsien.

Action : fléchisseur et abducteur du pied.

Innervation : le nerf fibulaire profond.

2. La loge latérale :

Cette loge est limitée par les 02 septums intermusculaires antérieur et postérieur, et par la fibula.

La loge latérale comprend le groupe musculaire latéral : composé de 2 muscles disposés en 2 plans :

- Plan profond : court fibulaire.

- Plan superficiel : long fibulaire

2.1. Court fibulaire (court péronier latéral) :

Origine : la face latérale de la fibula.

Terminaison : sur la tubérosité du 5ème métatarsien et une expansion pour le 4ème métatarsien.

Action : abducteur et rotateur latéral du pied.

Innervation : le nerf fibulaire superficiel.

2.2. Long fibulaire (long péronier latéral) :

Origine : Le condyle latéral du tibia, la tête de la fibula, la face latérale de la fibula sur le tiers supérieur.

Terminaison : Par un tendon qui passe sous la plante du pied pour aller se fixer sur le tubercule latéral de la base du 1er métatarsien et une expansion sur l'os cunéiforme médial.

Action : extenseur du pied et abducteur et rotateur latéral du pied.

Innervation : nerf fibulaire superficiel.

3. La loge postérieure :

Les muscles du groupe postérieur sont situés en arrière du squelette de la jambe, de la membrane interosseuse et du septum intermusculaire postérieur.

Ils sont divisés en 02 plans par le septum intermusculaire transverse.

Plan profond (4 muscles) :

- Poplité
- Long fléchisseur des orteils (long fléchisseur commun des orteils)
- Tibial postérieur (jambier postérieur)
- Long fléchisseur de l'hallux (long fléchisseur propre du gros orteil)

Plan superficiel (4 muscles) :

- Triceps sural (composé de 3 muscles) : les muscles gastrocnémiens médial et latéral (jumeaux interne et externe) et le soléaire
- Plantaire (plantaire grêle)

3.1. Poplité :

Origine : Il s'insère dans une fossette osseuse, située au-dessous et en arrière de la tubérosité du condyle latéral du fémur.

Terminaison : la face postérieure du tibia sur la surface poplitée, située au-dessus de la ligne oblique.

Action : flexion et rotation médiale de la jambe.

Innervation : le nerf tibial.

3.2. Long fléchisseur des orteils (long fléchisseur commun des orteils)

Origine : face postérieure du tibia au-dessous de la ligne oblique.

Terminaison : par 4 tendons sur la face plantaire de la base de P3 des 4 derniers doigts.

Action : Fléchisseur des orteils puis extenseurs du pied.

Innervation : le nerf tibial.

3.3. Tibial postérieur (jambier postérieur)

Origine : Sur la face postérieure du tibia, sur la face médiale de la fibula.

Terminaison : Sur la tubérosité de l'os naviculaire et par des expansions irradiées sur les 3 cunéiformes, le cuboïde, le sustentaculum tali, la base des métatarsiens II, III, IV.

Action : Il est adducteur et rotateur médial du pied.

Innervation : le nerf tibial.

3.4. Long fléchisseur de l'hallux (long fléchisseur propre du gros orteil)

Origine : 2/3 inférieur de la face postérieure de la fibula.

Terminaison : sur la face plantaire de la base de P2 de l'hallux et par des expansions au long fléchisseur des orteils.

Action : flexion de l'hallux.

Innervation : le nerf tibial.

3.5. Le soléaire :

Origine : 02 chefs

- Chef fibulaire : sur la tête et la face postérieure de la fibula (1/4 supérieur)
- Chef tibial : sur la ligne oblique du tibia et au 1/3 moyen du bord médial de cet os.

Terminaison : par une lame terminale qui s'unie à celle des gastrocnémiens pour former le tendon calcanéen ou tendon d'Achille qui se termine sur la tubérosité du calcaneus.

Action : Extension du pied.

3.6. Muscles gastrocnémiens médial et latérale (jumeaux interne et externe)

Origine : sur les tubercules supra-condyliques médial et latéral et les coques condyliques.

Terminaison La lame tendineuse des deux gastrocnémiens se réunit à la lame tendineuse terminale du soléaire pour former le tendon calcanéen ou le tendon d'Achille.

Action : extension du pied.

Innervation : le nerf tibial.

NB : les gastrocnémiens forment avec le soléaire le triceps sural.

3.7. Plantaire (plantaire grêle) :

Origine : sur la surface poplitée au niveau du condyle latéral du fémur et la coque condylienne.

Terminaison : sur la tubérosité du calcaneus en dedans du tendon d'Achille.

Action : Axillaire du triceps sural cependant l'action reste très faible.

Innervation : le nerf tibial.

RÉFÉRENCES :

BRIZON J, CASTAING J. Les Feuilles d'Anatomie. Muscles du membre inférieur. Fascicule V. Librairie Maloine SA. Paris 1953.

HAMMOUDI SS. Le cours d'Anatomie, appareil locomoteur 2, membre inférieur. Auto édition.2004. p202-220. 3-

ROUVIERE H. Anatomie Humaine. Descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome troisième. Membres. 13ème Ed. Masson éd. Paris 2002: p378-390

