

Artère fémorale

PLAN :

- I. Introduction.
- II. Anatomie descriptive.
 - 1. Origine.
 - 2. Trajet.
 - 3. Terminaison.
- III. Rapports.
- IV. Branches collatérales.

Les objectifs :

Connaitre l'origine, le trajet et la terminaison de l'artère fémorale.

Connaitre les rapports de l'artère fémorale.

Connaitre les branches collatérales de l'artère fémorale.

I. Introduction :

La vascularisation du membre inférieur est assurée essentiellement par l'axe artériel qui fait suite à l'artère iliaque externe, et accessoirement par les branches pariétales extra-pelviennes de l'artère iliaque interne(hypogastrique):

- L'artère obturatrice.
- L'artère glutéale supérieure.
- L'artère glutéale inférieure.
- L'artère pudendale interne.

L'artère fémorale est un gros tronc artériel de la cuisse, elle est située à la partie antéro-médiale de la cuisse, elle représente le premier segment de l'axe artériel du membre inférieur.

L'artère fémorale est d'un grand intérêt sémiologique (pouls fémoral), radiologique (cathétérismes artériels), chirurgical (implantation de prothèse dans l'hémodialyse)

II. Anatomie descriptive :

1. Origine :

Fait suite à l'artère iliaque externe au milieu du ligament inguinal (arcade crurale ou arcade fémorale)

2. Trajet :

Elle traverse d'abord le trigone fémoral où elle est superficielle, puis descend dans le canal des adducteurs et devient profonde.

3. Terminaison :

Elle se termine dans le hiatus (anneau) du muscle grand adducteur où elle devient artère poplitée.

III. Rapports :

L'artère parcourt le canal fémoral qui est situé à la partie antéro-médiale de la cuisse. Il s'étend de du ligament inguinal au hiatus grand adducteur. Il est croisé en avant par le sartorius.

Il est constitué par : Le revêtement aponévrotique des muscles (aponévroses des muscles ilio-psoas, vaste médial en dehors, pectiné et adducteurs en dedans).

Le canal a une forme de prisme triangulaire Topographiquement il a :

- 2 orifices proximal et distal.
- 2 régions, le trigone fémoral et le canal des adducteurs.

1. Orifice proximal du canal fémoral ou lacune vasculaire ou anneau crural :

❖ Limites de l'orifice :

- En avant : le ligament inguinal (arcade crurale ou arcade fémorale)
- En dehors : arcade ilio-pectinée (bandelette ilio-pectinée)
- En dedans : le ligament lacunaire (ligament de GIMBERNAT)
- En arrière : éminence ilio-pubienne (ilio-pectinée) et l'épaississement aponévrotique du muscle pectiné (ligament de Cooper)

❖ Rapports de l'artère au niveau de l'orifice proximal :

- L'artère est située dans une gaine fémorale, dans cette dernière, l'artère et la veine sont séparées par une cloison sagittale. La veine est située en dedans de l'artère.
- Dans son compartiment l'artère est accompagnée par un rameau du nerf fémoral.
- En dehors de la gaine, l'artère répond :
 - *Arcade ilio-pectinée
 - *Rameau fémoral du nerf génito-fémoral (génito-crural).
 - * Nerf fémoral et muscle ilio-psoas.En dedans de la gaine, l'artère répond : Le nœud lymphatique (ganglion de Cloquet), ligament lacunaire et le pubis.
- En arrière de la gaine, l'artère répond : muscle pectiné et son épaissement aponévrotique.

2. Trigone fémoral ou triangle de Scarpa :

❖ Limites :

- En haut : le ligament inguinal.
- En dehors : le muscle sartorius (couturier).
- En dedans : le muscle long adducteur (moyen adducteur).
- En arrière : le muscle ilio-psoas et le muscle pectiné.
- En avant : le fascia lata (aponévrose fémorale). Elle est dédoublée en 2 feuilles : Une feuille profonde située en arrière des vaisseaux fémoraux et une feuille superficielle appelée le fascia criblé ou fascia cribriformis c'est le couvercle du trigone.

❖ Rapports : L'artère fémorale, dans sa gaine vasculaire est en rapport avec :

- La veine fémorale est en dedans de l'artère.
- Les nœuds lymphatiques inguinaux profonds sont à distance de l'artère et en dedans de la veine.
- Le nerf fémoral est en dehors de l'artère.

3. Canal des adducteurs ou canal de Hunter.

❖ Limites :

- Paroi antéro-latérale : par le septum intermusculaire médial et le muscle vaste médial.
- Paroi postérieure : par les muscles ; long et grand adducteur.
- Paroi médiale : par l'aponévrose du canal de Hunter qui est une lame fibreuse tendue entre le muscle vaste médial et le bord médial du 3ème faisceau du grand adducteur.

❖ Rapports :

- La veine est située en arrière de l'artère.
- Le nerf saphène en avant de l'artère.

4. Orifice distal du canal fémoral ou hiatus du grand adducteur :

Le canal est circonscrit par le faisceau moyen et le faisceau inférieur du muscle grand adducteur.

L'artère est en rapport avec la veine fémorale et les lymphatiques profonds.

V. Branches collatérales :

1. L'artère épigastrique superficielle (artère sous cutanée abdominale).
2. L'artère circonflexe iliaque superficielle.
3. L'artère pudendale externe supérieure (artère honteuse externe supérieure).

4. L'artère pudendale externe inférieure (artère honteuse externe inférieure).
5. L'artère profonde de la cuisse (artère fémorale profonde) : c'est la plus volumineuse des collatérales, elle naît de la face postérieure de la fémorale et se termine en perforant le grand adducteur un peu au-dessus du hiatus fibreux du grand adducteur (anneau du 3ème adducteur) où elle devient 3ème perforante.

Ses branches collatérales sont :


- * L'artère circonflexe latérale.
- * L'artère circonflexe médiale.
- * Les artères perforantes au nombre de trois (première, deuxième et troisième perforantes).

6. L'artère descendante du genou ou artère grande anastomotique.

Bibliographie :

BRIZON J, CASTAING J. Les Feuilletts d'Anatomie. Artères du membre inférieur. Fascicule V. Librairie Maloine SA. Paris 1953.


HAMMOUDI SS. Le cours d'Anatomie, appareil locomoteur 2, membre inférieur. Auto édition.2004.




Artères de la cuisse

Lacunes musculaire et vasculaire


- 1 - m. sartorius
- 2 - bourse iliopectinée
- 3 - n. cutané latéral de la cuisse
- 4 - lig. inguinal
- 5 - m. iliopsoas
- 6 - n. fémoral
- 7 - arcade iliopectinée
- 8 - branche fémorale du n. génito-fémoral
- 9 - a. fémorale
- 10 - gaine fémorale
- 11 - v. fémorale
- 12 - nœud lymphatique iliaque profond
- 13 - lig. lacunaire
- 14 - m. pectiné





Parois du trigone fémoral (vue ant.)

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 - n. fémoral | 5 - m. long adducteur |
| 2 - m. ilio-psoas | 6 - m. gracile |
| 3 - n. et v. fémorales | 7 - m. grand adducteur |
| 4 - m. pectiné | 8 - m. sartorius |



Coupe transversale de la cuisse (segment proximal)