

les déterminants de la politique vaccinale

introduction :

- la vaccination est une stratégie de santé publique qui est l'un des meilleurs outils pour : (prévenir les, éviter la propagation des , préserver contre les , éradication des) maladies infectieuses et contagieuses (معدية) graves
- les vaccins sont **spécifiques** , peu coûteux et **administrés à des personnes en bonne santé**
- **elle donne une protection individuelle et collective contre une maladie**

histoire de la vaccination :

- **xvi(16)** ème siècle : c'est la vaccination contre la variole (الجدري) qui a amorcé cette avancée médicale et scientifique

-diagnostic facile : des pustules sur tout le corps

-méthodes prophylactiques وقائية :

En Chine : 1-insuffler dans les narines une poudre de pustules

2-insertion (incubation) de pus varioleux sous la peau avec une aiguille

En 1796 : Edouard **Jenner (Angleterre)** inocule une pustule bovine confère une immunité croisée contre la variole (vache, vacca, vaccin)

- **La fin du xix(19)** ème siècle : avec le développement de la microbiologie il devient possible d'isoler des germes , de les cultiver **ou les modifier pour atténuer leur virulence** puis les inoculer à des fins prophylactiques
 - en 1881 : Louis Pasteur inventa le terme de vaccin pour désigner les virus vaccins
 - en 1885 : le premier de ligne, le vaccin contre la rage (virale) داء الكلب
 - en 1914 : le premier vaccin tué contre la typhoïde (bactérienne)
 - en 1922 : le BCG contre la tuberculose (bactérie) السل
 - en 1926 : la toxine **diphtérique (fragment de l'agent infectieux)** contre la diphtérie الخناق
 - en 1930 : la coqueluche السعال الديكي
 - 1949 : JOHN ENDERS : cultiver les virus par des milieux vivants cellulaires

-en 1952 :vaccin tué injectable américains préparé par JONAS SALK contre la polio (شلل الأطفال virale)

➤ **XX(20) ème siècle** :cultures cellulaires

-1962 :rougeole الحصبة -1967 :oreillons

-1969 :rubéole الحصبة الألمانية -1974 :varicelle

-1970 :la grippe -1977 :pneumocoque المكورات الرئوية

-1978 :méningocoque المكورات السحائية -1981 :hépatite B التهاب الكبد

1985 :hemophilus -1998 :borréliose, rotavirus

Le PEV EN Algérie :la politique vaccinal algérienne a évolué de puis l'indépendance à nos jours

-1966 :BCG

-1969 :diphtérie ,tétanos الكزاز (fragment de l'agent infectieuse),coqueluche ,polio,et variole

1985 :rougeole,et suppression de la variole -2000 :hépatite B

-2007 :hémophilus ,influanzae B

-2014 :nouveau calendrier vaccinal,introduction du pneumocoque et ROR(rougeole ,oreillons,rubéole)

-2018 calendrier vaccinal actuel ملحق

Intérêt de la vaccination :l'effondrement de la mortalité :

-Eviter 2à3millions de décès par an dus à la diphtérie, tétanos, coqueluche, rougeole(baisser à79%).

Chuter l'incidence mondiale de la poliomyélite de 99%depuis1988

-En algérie : 0cas pour la poliomyélite ,quelque cas pour la diphtérie <200cas pour la rougeole en 2000

Ethique et politique vaccinal :

-la gratuité de soins

-le rôle des professionnels de santé dans la mise en œuvre de la politique vaccinale basé sur un éthique du consentement et du choix éclairé

-but de cette politique :maîtriser les épidémies par la poursuite du programme de vaccination jusque à la disparition de la maladie

-les recommandations vaccinales varient d'un pays à un autre selon la situation épidémiologique .

Age de la vaccination	VACCINS
Naissance	BCG Anti Hépatite B
2 mois	Anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-coquelucheux Anti-haemophilus influenza B Anti-polimyélitique (voie injectable) Anti Hépatite B Anti-pneumococcique 13
4 mois	Anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-coquelucheux Anti-haemophilus influenza B Anti-polimyélitique (voie injectable) Anti Hépatite B Anti-pneumococcique 13 Anti-polimyélitique (voie orale)
11 mois	Anti-rougeoleux, anti-ourléen, anti-rubéoleux (ROR)

Age de la vaccination	VACCINS
12 mois	Anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-coquelucheux Anti-haemophilus influenza B Anti-polimyélitique (voie injectable) Anti Hépatite B Anti-pneumococcique 13 Anti-polimyélitique (voie orale)
18 mois	Anti-rougeoleux, anti-ourléen, anti-rubéoleux (ROR)
6 ans	Anti-diphtérique, anti-tétanique, anti-coquelucheux Anti-polimyélitique (voie injectable)
11-13 ans	Anti-diphtérique, anti-tétanique (Adulte)
16-18 ans	Anti-diphtérique, anti-tétanique (Adulte)
Tous les 10 ans à partir de 18 ans	Anti-diphtérique, anti-tétanique (Adulte)