


Université Salah Boubnider Constantine3,
Faculté de Médecine, Département de Médecine,
Module de Biochimie 1ere Année Médecine
Présenté par : Dr ZEKRI. S

STRUCTURE ET PROPRIETES DES LIPIDES COMPLEXES

I-INTRODUCTION

- Les lipides complexes : sont **des hétéros lipides** qui renferment en plus des éléments C, H, O du phosphore (P), de l'azote (N) ou du soufre (S).
- Ils sont formés d'un alcool **qui fixe** un acide gras et/ou d'autres composés.
- On peut les classer en fonction de **l'alcool** :
 - ❖ Soit **le glycérol** : on distingue : Les glycérophospholipides (Phosphore)
Les Glycéro glycolipides (sucre)
 - ❖ Soit **un alcool aminé** : **Sphingosine** qui définit les sphingolipides.
- Les lipides complexes sont les **constituants essentiels** des membranes biologiques.
- Par contre, ils **n'ont aucun rôle énergétique**.





II/GLYCEROPHOSPHOLIPIDES (ou PHOSPHOGLYCÉRIDES)

- Les phospholipides ou glycérophospholipides sont des composés lipidiques **contenant du phosphore**.
- Ce sont les représentants **les plus nombreux** des lipides complexes.
- On les trouve **en forte concentration** dans les **membranes biologiques**.

A/Structure :

- Ce sont **des esters** de glycérol contenant : 1 phosphate, 2 acides gras, 1 alcool x
- Les Phospholipides = 2 Acides gras + Glycérol + Phosphate + Alcool X
- La formule générale s'écrit comme suit




1) Acides phosphatidiques :

-Ce sont des **esters phosphoriques de di glycéride**, Le glycérol est donc estérifié par 2 AG et par l'acide phosphorique.

-En général, les AG ont entre 16 et 18 atomes de C. Souvent l'un des AG est saturé et il est en position C1 et l'autre est insaturé et il est en position C2.

-Charge **globale négative** (phospholipides acides)

Ils existent **rarement à l'état libre**, et jouent un rôle important dans la **biosynthèse des glycérophospholipides**.



-Selon l'**alcool** qui estérifie l'acide phosphatidique on obtient des classes différentes :

2) Glycérophospholipides azotés :

-Phosphatidylsérines = Acides Phosphatidiques + Sérine


-Phosphatidyléthanolamines = Acides Phosphatidiques + Ethanolamine (céphalines)

-Phosphatidylcholines = Acides Phosphatidiques + Choline (lécithines)


❖ Les céphalines sont présentes dans tous les tissus animaux et beaucoup de végétaux. Elles sont abondantes dans le cerveau (d'où leur nom).

❖ Les lécithines sont **un des constituants du jaune d'œuf** (acide oléique en 2, acide stéarique en 3), mais aussi des cellules du foie, du rein, des muscles et du tissu nerveux.


Phosphatidylsérine



Phosphatidyléthanolamine



Phosphatidylcholine



3) Glycérophospholipides non azotés :


- Phosphatidyl-glycérols = Acides Phosphatidiques + glycérol

Ils sont abondants chez certains micro-organismes et les plantes.

Charge globale négative (phospholipides acides)

-Phosphatidyl-inositols (inositides) = Acides Phosphatidiques + inositol

Le phosphatidyl-inositol est situé à la face interne des membranes plasmiques où il est le précurseur métabolique de deux messagers secondaires : les diglycérides et l'inositol triphosphate.



phosphatidylglycérol

B/PROPRIETES PHYSIQUES

1-Polarité et caractère amphiphile :

Les glycérophospholipides se présentent en tête polaire ($\text{PO}_4\text{—X}$) et en queue apolaire (groupement acyl) : ce sont des molécules amphipathiques

Ils s'organisent pour former des micelles où les têtes polaires seront en contact avec le milieu aqueux alors que les queues apolaires sont dirigées vers le milieu hydrophobe.

2-Molécules amphotères : une fonction acide (apportée par H_3PO_4)

une fonction basique (apportée par l'alcool)

C/PROPRIETES CHIMIQUES

1/L'Hydrolyse chimique :

✓ **Hydrolyse acide** : un traitement acide à chaud hydrolyse les liaisons esters et libère les acides gras et les autres constituants des phosphoglycérides.

✓ **Hydrolyse alcaline** : **saponification** :

-**Alcaline douce** : Libération des AG sous forme de savons + squelette (glycérol-acide P-alcool(X))


-**Alcaline forte** : Libération des AG sous forme de savons + Alcool (X) + squelette (glycérol-acide P).

2/L'Hydrolyse enzymatique

L'hydrolyse enzymatique des phospholipides par les phospholipases permet la libération de composés biologiquement actifs.

Il existe 4 phospholipases **A1**, **A2**, **C** et **D** qui hydrolysent de façon hautement spécifique les liaisons esters.

Il existe 4 phospholipases spécifiques **A₁**, **A₂**, **C** et **D** :



III/ GLYCEROLYCOLIPIDES :

-Comme dans les Glycéro lipides, les **C1** et **C2** du glycérol sont **estérifiés** par des acides gras, mais sur le **C3** un **ose** ou un **oligoside** est fixe par son **carbone hémiacétalique** par une liaison **glycosidique**.

-Ces **glyceroglycolipides** sont abondants dans les membranes des plantes.


Ex: 1,2-diacyl-[β -D-galactosyl-(1'-3)]-glycerol

IV/ LES SPHINGOLIPIDES

A / Structure

-L'alcool n'est plus du glycérol mais **la sphingosine** : un amino-alcool à longue chaîne (C18):

- avec deux fonctions alcools : une en C1 et une en C3,
- et une fonction amine primaire en C2.
- et une double liaison en C4 et C5.




Sphingosine

-A partir de la sphingosine on a des dérivés :

1)Acylsphingosine ou Céramide

sphingosine + acide gras = céramide

Acide lignocérique (C24:0)




-Le plus simple des sphingolipides est **la céramide** ou **acylsphingosine**.

-L'acide gras est saturé et à longue chaîne.

-Le Céramide est **un second messager** intracellulaire

✚ Les groupes sanguins, c'est **l'association** d'un motif glucidique et d'une céramide, qui donne **un glycolipide**.


Les groupes sanguins



2) Les Sphingomyélines

Céramide + phosphocholine = sphingomyéline

- Elles sont constituées de l'association Sphingosine + AG + Phosphoryl-choline
- L'acide gras le plus fréquent est l'**acide lignocérique (C24:0)**.
 - Au pH du sang, **la molécule est ionisée**.
 - On les trouve dans le tissu nerveux (gaine de myéline) et dans les membranes.
Cerveau : Matière grise : C18: 0 (Stéarique)
Substance blanche : (C24 :0; C24:1)
- Rôle **dans la transduction cellulaire** et **activité neuronale**




Molécule ionisée dans le sang

3) Les Glycolipides

a/Les Cérébrogalactosides ou Galactosylcéramides

- Ils sont constitués de : **Sphingosine + AG + βD Galactose**
- Le galactose est uni à l'alcool primaire de la sphingosine par **une liaison β osidique**



b/ Les Cérébroglucides ou Glucosylcéramides

-Ils sont constitués de : **Sphingosine + AG + β D Glucose**


c/ Les Gangliosides ou Oligosylcéramides

-Ils sont constitués de : **Sphingosine + AG + chaîne de plusieurs oses et dérivés d'oses (NANA) (= oligoside)**

-Ils sont abondants dans les ganglions d'où leur nom.

-Les gangliosides sont des glycolipides **acides** dont le chaînon oligosaccharidique se termine par un ou plusieurs résidus d'acide sialique (NANA).

-Ils sont abondants dans les cellules ganglionnaires du cerveau d'où leur nom.



B/ Propriétés et rôles des sphingolipides

- Rôle structural dans les membranes : les sphingolipides sont principalement des constituants de la membrane des cellules. Ils sont insérés dans le feuillet externe de la membrane, la partie glucidique des glycosphingolipides est toujours à la surface externe de la cellule (comme pour les glycoprotéines).
- Rôle dans la reconnaissance cellulaire :
 - un rôle antigénique : Ag des groupes sanguins A, B, O.
- Rôle de médiateurs intracellulaires : la sphingomyéline joue un rôle dans la transduction d'un signal extracellulaire à l'intérieur de la cellule :