

Muscles du bras

PLAN :

- I. Introduction.
- II. Anatomie descriptive
 1. La loge musculaire antérieure
 - 1.1. Plan profond
 - 1.2. Plan superficiel
 2. La loge musculaire postérieure

Les objectifs :

- *Connaitre les insertions musculaires.*
- *Comprendre l'action des différents muscles.*
- *Connaitre l'innervation des muscles.*

I. Introduction :

Le bras est divisé en 2 groupes musculaires antérieure et postérieure par les septums intermusculaires médial et latéral, ces 2 groupes sont entourés par le fascia brachial.

- La loge antérieure : pour les muscles fléchisseurs.
- La loge postérieure : pour le muscle extenseur.

II. Anatomie descriptive :

1. **Loge musculaire antérieur :** formé par 03 muscles repartis en 2 plans profond et superficiel :

- Plan profond :

1.1. Le muscle coraco-brachial :

Origine : le sommet du processus coracoïde par un tendon commun avec le chef court du biceps brachial.

Terminaison : la partie moyenne de la face médiale de l'humérus.

Action : adducteur et fléchisseur du bras, il est aussi suspenseur du bras et assure la coaptation de la tête humérale.

Innervation : nerf musculo-cutané (branche terminale du plexus brachial).

1.2. Le muscle brachial :

Origine : moitié distale des faces antéro-médiale et antéro-latérale de la diaphyse humérale.

Terminaison : processus coronoïde de l'ulna.

Action : fléchisseur de l'avant-bras sur le bras.

Innervation : nerf musculo-cutané (branche terminale du plexus brachial).

- Plan superficiel :

1.3. Le muscle biceps brachial :

Origine : elle se fait par deux chefs :

- Le chef court : sur le sommet du processus coracoïde de la scapula.
- Le chef long : sur le tubercule supra-glénoïdal de la scapula, c'est un tendon intra capsulaire mais extra synovial.

Terminaison : les 02 chefs se réunissent à la partie moyenne de l'humérus pour former un muscle épais qui se termine sur la tubérosité radiale.

Action : flexion de l'avant-bras, puissant supinateur de l'avant-bras, stabilisateur de la tête humérale (chef long) suspenseur du bras (chef court)

Innervation : nerf musculo-cutané (branche terminale du plexus brachial).

2. Groupe musculaire postérieur : il est formé par un seul muscle le triceps brachial.**Muscle triceps brachial :**

Origine : elle se fait par 03 chefs.

- Chef long : tubercule infra-glénoïdal de la scapula.
- Chef latéral : face dorsale de l'humérus au-dessus du sillon du nerf radial.
- Chef médial : face dorsale de l'humérus au-dessous du sillon du nerf radial.

Terminaison : par un tendon commun aux 03 chefs sur l'olécrâne de l'ulna.

Action : extension de l'avant-bras.


Innervation : nerf radial (branche terminale du plexus brachial).

Références :

Brizon J, Castaing J. Les feuillets d'anatomie. Fascicule IV. Maloine Ed, Paris 1953.

Hammoudi SS. Le cours d'Anatomie. Descriptive, topographique et fonctionnelle. Fascicule I (appareil locomoteur, membre supérieur). ISBN.2004.


Rouvière H. Anatomie humaine descriptive et topographique. Tome 3- membres. Masson 10ème Ed 2ème tirage révisé par Delmas A, Paris 2002.




Vue ventrale

Plan profond :

- 2. processus coracoïde
- 9. muscle coraco-brachial
- 10. muscle brachial
- 11. processus coronoïde



plan superficiel : muscle biceps



Vue dorsale

muscle triceps

- 13. Le chef long
- 14. Chef latéral
- 16. Chef médial