

Muscles de la cuisse

Plan :

- I. Introduction :
- II. Anatomie descriptive :
 1. Groupe musculaire antérieur
 - 1.1. Plan profond :
 - 1.1.1. Muscle quadriceps fémoral
 - 1.1.2. Muscle articulaire du genou
 - 1.2. Plan superficiel : muscle Sartorius
 2. Groupe musculaire médial :
 - 2.1. Plan profond : muscle grand adducteur
 - 2.2. Plan moyen : court adducteur
 - 2.3. Plan superficiel :
 - 2.3.1. Muscle long adducteur
 - 2.3.2. Muscle pectiné
 - 2.3.3. Muscle gracile
 3. Groupe musculaire postérieur :
 - 3.1. Plan profond : muscle semi membraneux
 - 3.2. Plan superficiel :
 - 3.2.1. Muscle semi tendineux
 - 3.2.2. Muscle biceps fémoral

Les objectifs :

- *Connaitre les muscles de la cuisse.*
 - *Comprendre l'action des différents muscles.*
 - *Connaitre l'innervation des muscles.*
-

I. Introduction :

Les muscles de la cuisse sont répartis en trois groupes musculaires : antérieur, postérieur et médial ; qui sont placés en deux loges :

- Loge antérieure : comprend le groupe antérieur.
- Loge postérieure : comprend les groupes ; postérieur et médial.

II. Anatomie descriptive :

1. Groupe musculaire antérieur :

Ce groupe est composé de 3 muscles : sartorius, quadriceps, et l'articulaire du genou, il occupe la loge antérieure, limitée en avant par le fascia lata (aponévrose de recouvrement) et en arrière par les cloisons intermusculaires.

1.1. Plan profond : 02 muscles d'inégale importance, disposés en 02 plans.

1.1.1. Muscle quadriceps fémoral (quadriceps crural) : il a un rôle fonctionnel majeur.

C'est l'un des plus gros muscles du corps humain ; il est constitué de 04 chefs : droit fémoral, vaste latéral, vaste médial et le vaste intermédiaire.

Origine :

- muscle vaste intermédiaire(crural) : faces antérieure et postéro-latérale du fémur.
- muscle vaste médial (vaste interne) : ligne âpre du fémur sur la lèvre médiale et la ligne spirale.
- muscle vaste latéral (vaste externe) : Il s'insère sur la crête rugueuse qui limite en dedans et en bas de la face antérieure du grand trochanter et sur la lèvre latérale de la ligne âpre.
- muscle droit fémoral (droit antérieur) : par 03 tendons.
 - Tendon direct : sur l'épine iliaque antéro-inférieure.
 - Réfléchi : sur le sillon supra-acétabulaire.
 - Récurrent : sur la ligne intertrochantérique.

Terminaison : sur la base de la patella par le tendon quadricipital qui se prolonge au-dessous de la patella par le tendon patellaire ce dernier se termine sur la tubérosité tibiale.

Action : extenseur de la jambe sur la cuisse, le muscle droit fémoral est fléchisseur de la cuisse sur le bassin.

Innervation : nerf fémoral (plexus lombaire)

1.1.2. Muscle articulaire du genou (sous crural)

Origine : sur la face antérieure du fémur au-dessous du vaste intermédiaire

Terminaison Sur la bourse séreuse supra-patellaire ou bourse séreuse sous quadricipitale.

Action : élève la bourse séreuse.

Innervation : le nerf fémoral (plexus lombaire).

1.2. Plan superficiel : muscle Sartorius (couturier) ; il a un rôle topographique important, il est satellite de l'artère fémorale, et il forme une des limites du trigone fémoral.

Origine : sur l'épine iliaque antéro-supérieure.

Terminaison : sur la partie supérieure de la face médiale du tibia, il forme avec les muscles gracile et semi-tendineux, les muscles de la patte d'oie.

Action : fléchisseur de la jambe sur la cuisse et la cuisse sur le bassin

Innervation : le nerf fémoral (plexus lombaire)

2. Groupe musculaire médial :

Il est constitué de cinq muscles disposés en trois plans :

- superficiel : avec les muscles ; pectiné, long adducteur et gracile
- moyen : le court adducteur
- Profond : le grand adducteur

2.1. Plan profond : muscle grand adducteur (3ème adducteur), il présente trois faisceaux supérieur, moyen et inférieur.

Origine : il s'insère sur la branche ischio-pubienne et la face postérieure de la tubérosité ischiatique.

Terminaison : par 3 faisceaux

- Le faisceau supérieur : il se termine sur la branche latérale de trifurcation de la ligne âpre (versant médial) et la partie supérieure de la lèvre latérale de la ligne âpre.
- Le faisceau moyen : il s'insère sur l'interstice de la ligne âpre.
- Le faisceau inférieur : il s'insère sur le tubercule de l'adducteur, également par des fibres récurrentes sur la branche médiale de bifurcation de la ligne âpre formant le hiatus de l'adducteur (anneau du troisième adducteur)

Action : adducteur et rotateur latéral de la cuisse.

Innervation : pour le faisceau supérieur et moyen : nerf obturateur (plexus lombaire), pour le faisceau inférieur : nerf sciatique (plexus sacré).

2.2. Plan moyen : court adducteur (1e adducteur) :

Origine : il s'insère sur la lame quadrilatère du pubis et la partie supérieure de la branche ischio-pubienne

Terminaison : il se termine en deux faisceaux.

- Le faisceau supérieur se termine sur la crête située en dehors de la branche moyenne de trifurcation de la ligne âpre.
- Le faisceau inférieur se termine sur l'interstice de la partie supérieure de la ligne âpre.

Action : adducteur et fléchisseur de la cuisse.

Innervation : le nerf obturateur (plexus lombaire)

2.3. Plan superficiel :

2.3.1. Muscle long adducteur (moyen adducteur ou 2ème adducteur)

Origine : sur l'angle du pubis et la face inférieure du tubercule du pubis.

Terminaison : sur l'interstice de la partie moyenne de la ligne âpre

Action : adducteur et fléchisseur de la cuisse

Innervation : nerf obturateur (plexus lombaire)

2.3.2. Muscle pectiné :

Origine : sur le pecten ou la crête pectinéale, la lèvre antérieure du sillon obturateur.

Terminaison : sur la ligne pectinée ou crête pectinéale.

Action : adducteur et fléchisseur de la cuisse.

Innervation : nerf fémoral.

2.3.3. Muscle gracile (droit interne)

Origine : il s'insère sur la lame quadrilatère du pubis et le long de la symphyse.

Terminaison : sur la partie supérieure de la face médiale du tibia (champ des muscles de la patte d'oie).

Action : fléchisseur et rotateur médial de la jambe et adducteur de la cuisse.

Innervation : nerf obturateur.

3. Groupe musculaire postérieur : ou muscles ischio-jambiers.

Ils sont tendus de la tubérosité ischiatique aux extrémités proximales des os de la jambe et sont innervés par le nerf sciatique.

3.1. Plan profond : muscle semi membraneux :

Origine : il s'insère sur la tubérosité ischiatique

Terminaison : son tendon terminal se divise en trois parties :

- Le tendon direct qui se termine sur la tubérosité médiale du tibia (face postérieure)
- Le tendon réfléchi qui se termine sur la tubérosité médiale du tibia (face antérieure)
- Le tendon poplité oblique ou récurrent qui se termine sur la coque condylienne latérale

Action : fléchisseur de la jambe sur la cuisse puis fléchisseur de la cuisse sur le bassin et rotateur interne de la jambe.

Innervation : nerf tibial (Plexus sacral).

3.2. Plan superficiel :

3.2.1. Muscle semi tendineux (demi-tendineux)

Origine : la tubérosité ischiatique, par un tendon commun avec le chef long du biceps.

Terminaison : par un tendon qui passe en arrière du condyle du fémur et se termine à la partie supérieure de la face médiale du tibia (insertion de la patte d'oie)

Action : fléchisseur de la jambe sur la cuisse puis fléchisseur de la cuisse sur le bassin et rotateur interne de la jambe.

Innervation : nerf tibial (plexus sacral)

3.2.3. Muscle biceps fémoral :

Il est constitué de deux chefs musculaires : long et court.

Origine :

- Le chef long naît de la tubérosité ischiatique.
- Le chef court naît de la lèvre latérale de la ligne âpre du fémur

Terminaison : par un tendon commun sur l'épiphyse proximale de la fibula.

Innervation :

- Chef long : branche du nerf sciatique.
- Chef court : branche du nerf fibulaire commun.

Action : extenseur de la hanche, fléchisseur du genou.

Références :

BRIZON J, CASTAING J. Les Feuilles d'Anatomie. Muscles du membre inférieur. Fascicule V. Librairie Maloine SA. Paris 1953.

HAMMOUDI SS. Le cours d'Anatomie, appareil locomoteur 2, membre inférieur. Auto édition.2004. p172- 185.




Figure 01 : muscle quadriceps fémoral




Figure 02 : les ischio-jambier




Figure 03 : le groupe musculaire médial