

Université de Constantine 3 Faculté de médecine Belkacem Bensmaine CHU de Constantine

Laboratoire d'anatomie humaine

Polycopié pour les étudiants de la 1ère année médecine

Dr. BOUZIDI Esma

L'ARTERE BRACHIALE

PLAN

- I. Introduction**
- II. Anatomie descriptive**
 - Origine
 - Trajet
 - Terminaison
- III. Rapports**
 - 1- Au niveau du bras
 - 2- Au niveau du pli du coude
- IV. Branches collatérales**
- V. Anatomie clinique**

Objectifs

- Connaitre l'origine, trajet et terminaison de l'artère
- Connaitre ses rapports avec les structures musculo-tendineuses de voisinage
- Connaitre ses rapports intimes avec les éléments vasculo-nerveux de la région.

I. INTRODUCTION

L'artère brachiale (humérale) est le deuxième segment artériel du membre supérieur. Elle est destinée à la région du bras.

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

Origine : Elle fait suite à l'artère axillaire au bord inférieur du tendon du grand pectoral

Trajet : Elle traverse la région antéro-médiale du bras dans le canal brachial de **Cruveilhier**, et le sillon bicipital médial.

Terminaison : Au niveau de la face antérieure du pli du coude, un peu au dessous de l'inter-ligne articulaire. Donnant 2 branches terminales: artère ulnaire et artère radiale.

III. RAPPORTS

L'artère brachiale (humérale), présente des rapports au niveau du bras et du pli du coude.

1. Rapports au niveau du bras :

Elle parcourt la région antéro-médiale du bras dans le canal brachial de **Cruveilhier**

a) Rapports avec les parois du canal brachial

En avant et en dehors : le muscle coraco-brachial en haut et le biceps en bas

En arrière : le septum intermusculaire médial

En dedans : le fascia brachial (aponévrose brachiale)

b) Rapports vasculo-nerveux

_ Elle est accompagnée par ses deux veines satellites

_ Le nerf médian : il est antéro-latéral en haut, et devient antéro-médial en bas

_ Le nerf ulnaire : il est antéro-médial en haut, puis il traverse le septum intermusculaire médial en bas pour se trouver dans la loge postérieure du bras.

_ Le nerf cutané médial de l'avant bras : il est médial en haut, puis il devient sus aponévrotique en bas.

2. Rapports au niveau du pli du coude :

Elle parcourt le sillon bicipital médial, où elle se termine un peu au dessous de l'interligne articulaire en ses deux branches terminales.

a. Rapports musculo-fasciaux

Se font avec les éléments qui délimitent le sillon bicipital médial:

En dedans : le tendon du muscle rond pronateur

En dehors : le tendon du muscle biceps brachial

En avant : l'expansion aponévrotique du tendon du biceps

En arrière : le muscle brachial

b. Rapports vasculo-nerveux

L'artère est accompagnée par ses deux veines satellites, et le nerf médian qui est en dedans .

IV. BRANCHES COLLATERALES

Dans son trajet, l'artère donne ces branches collatérales :

-Rameau Deltoïdien

-Artère Brachiale profonde : elle descend dans la loge postérieure du bras, irrigue le triceps et la région du coude; elle est accompagnée par le nerf radial(les deux passent dans le sillon du nerf radial)

-Artère Nourricière de l'humérus**- Artère Collatérale ulnaire supérieure****- Artère Collatérale ulnaire inférieure****-Branches musculaires** (pour muscles du bras)

V. ANATOMIE CLINIQUE

Le pouls brachial : Palpable sur le sillon qui sépare muscles biceps et triceps brachiaux

L'artère brachiale est aussi l'artère de choix pour la prise de la tension artérielle.

Références :

Descriptive, Topographique et Fonctionnelle. Tome 3. Membres. ed. masson 2002.

2) Himmoudi SS. Le cours d'anatomie. fasc. 1 appareil locomoteur. membre supérieur. ISBN 2004

1) Rouvière H. Anatomie Humaine

