
LES VEINES DU MEMBRE THORACIQUE

PLAN :

I-OBJECTIFS

II-INTRODUCTION.

III- RESEAU VEINEUX SUPERFICIEL.

IV-RESEAU PROFOND.

V-APPLICATIONS PRATIQUES

OBJECTIFS :

- la connaissance de l'anatomie des veines est indispensable pour la réalisation d'une cartographie veineuse.

I-INTRODUCTION :

Le système veineux du membre thoracique se compose de deux réseaux : profond et superficiel ; suivant qu'elles sont situées au-dessous ou au-dessus du fascia superficiel.

Ces deux réseaux communiquent par de nombreuses anastomoses.




Fig. 1 : réseau veineux du membre thoracique droit

II- RESEAU VEINEUX SUPERFICIEL :

Il est situé dans le tissu cellulaire sous-cutané et comprend :

- les veines superficielles des doigts et de la main ;
- les veines de l'avant-bras ;
- les veines du bras.




Fig. 2 : compartiments du réseau veineux

1-LES VEINES SUPERFICIELLES DES DOIGTS :

a-réseau dorsal :

- Réseau veineux sous-unguéal (lit unguéal) ;
- Réseau veineux péri-unguéal (racine de l'ongle) ;
- Veines digitales : au nombre de deux ou une seule médiane volumineuse ;
- Arcade digitale : reçoit les veines digitales et se draine dans les veines métacarpiennes.

b- Réseau palmaire des veines des doigts :

Il se draine dans le réseau dorsal par les veines latérales.

2- LES VEINES DE LA MAIN :




Fig. 3 : réseau veineux de la main

a- Réseau dorsal de la main :

- Veines métacarpiennes : cheminent sur la face dorsale des espaces métacarpiens correspondants.
- Arcade veineuse dorsale : résulte de l'anastomose entre les veines métacarpiennes. Dans cette arcade se jettent également la veine céphalique du pouce et la veine salvatelle du 5ème doigt.

Les veines palmaire de la main :

Elles rejoignent le réseau veineux dorsale de la main.

3-AU NIVEAU DE L'AVANT-BRAS :

Trois troncs veineux se projettent sur l'avant-bras et reçoivent de nombreuses collatérales :

Les veines du membre thoracique

-Veine céphalique anté-brachiale (veine radiale superficielle) :

Elle provient de la céphalique du pouce et de l'arcade veineuse dorsale ; elle monte sur le bord latéral de l'avant-bras jusqu'au coude.

-Veine basilique anté-brachiale (veine cubitale superficielle) :

Elle naît de l'union de la veine salvatelle du 5ème doigt et de l'extrémité distale de l'arcade veineuse dorsale ; elle monte sur le bord médial de l'avant-bras.

-Veine médiane antébrachiale (veine médiane de l'avant-bras):

Elle débute du réseau veineux palmaire de la main à la veine médiane du coude.




Fig. 4 : réseau veineux superficiel du membre thoracique

4-AU NIVEAU DU PLI DU COUDE :

Disposition classique en M veineux du pli du coude.

Constitution :

Veine médiane basilique en dedans

Veine médiane céphalique en dehors.




Fig. 5 : réseau veineux du pli du coude

5- AU NIVEAU DU BRAS :

-Veine céphalique brachiale :

Née de l'union de la veine médiane céphalique et de la veine céphalique antébrachiale ; chemine le long du bord latéral, dans le sillon delto-pectoral pour se jeter dans la veine axillaire.

-Veine basilique brachiale :

Née de l'union de la veine basilique antébrachiale et la veine médiane basilique pour se jeter dans la veine brachiale.

III-RESEAU VEINEUX PROFOND :

Le réseau veineux profond est satellite des artères, il existe toujours deux veines pour chaque artère et porte le même nom que l'artère correspondante ; sauf pour l'artère axillaire qui n'est accompagnée que par un seul tronc veineux.

Toutes ses veines ainsi que leurs collatérales sont munies de valvules.

Les deux veines d'une artère sont reliées par des anastomoses transversales.

Les veines profondes, satellites des artères ont la même direction, le même trajet, les mêmes rapports que les artères correspondantes ; sauf pour la veine axillaire.

1- Veine axillaire :

Large de 1cm, elle est formée par la réunion des deux veines satellites de l'artère brachiale et suit l'artère axillaire dans tout son trajet.

A sa partie inférieure, la veine axillaire est placée sur le côté interne de l'artère ; puis s'enroule sur l'artère et se porte sur le côté antéro-interne de l'artère à sa partie supérieure.

On rencontre souvent un canal collatéral de la veine axillaire placé en dehors de celle-ci et en avant de l'artère.




Fig. 6 : veine axillaire

APPLICATIONS PRATIQUES :

Applications pratiques pour les veines superficielles :

-injection intra-veineuse, prélèvement sanguin, perfusions intra-veineuse.

FIN

Références :

Paturet G: Traité d'anatomie humaine . G. Paturet. Paris: Masson et Cie; 1951.

Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome 3 membres, 15 édition, MASSON.

J.Brizon et J.Castaing, Les feuillets d'anatomie, ostéologie du membre supérieur. Fascicule I, Librairie Maloine S.A.

Si Salah Hammoudi.le cours d'anatomie.descriptive,topographique et fonctionnelle.appareil locomoteur 1 membre supérieur.Auto-édition.HS

OBJECTIVES:

- Knowledge of vein anatomy is essential for performing venous mapping.

I-INTRODUCTION:

The venous system of the thoracic limb consists of two networks: deep and superficial, depending on whether they are located below or above the superficial fascia.

These two networks are connected by numerous anastomoses.

II- SUPERFICIAL VENOUS NETWORK:

This is located in the subcutaneous tissue and includes:

- the superficial veins of the fingers and hand;
- the veins of the forearm;
- the veins of the arm.

1-SUPERFICIAL VEINS OF THE FINGERS:

a-dorsal network:

- Subungual venous network (ungual bed);
- Periungual venous network (nail root);
- Digital veins: two or a single large median vein;
- Digital arch: receives the digital veins and drains into the metacarpal veins.

b- Palmar network of finger veins:

Drains into the dorsal network via the lateral veins.

2- VEINS OF THE HAND:

a- Dorsal network of the hand:

- Metacarpal veins: run along the dorsal surface of the corresponding metacarpal spaces.

-Dorsal venous arch: results from the anastomosis between the metacarpal veins.

The cephalic vein of the thumb and the saphenous vein of the 5th finger also flow into this arch.

The palmar veins of the hand:

They join the dorsal venous network of the hand.

3-AT THE FOREARM LEVEL:

Three venous trunks project onto the forearm and receive numerous collaterals:

-Anterobrachial cephalic vein (superficial radial vein):

It originates from the cephalic vein of the thumb and the dorsal venous arch; it ascends along the lateral edge of the forearm to the elbow.

-Basilic antebrachial vein (superficial ulnar vein):

It originates from the union of the saphenous vein of the fifth finger and the distal end of the dorsal venous arch; it ascends along the medial edge of the forearm.

-Median antebrachial vein (median vein of the forearm):

It originates from the palmar venous network of the hand at the median vein of the elbow.

4-AT THE ELBOW FOLD:

Classic venous M-shaped arrangement of the elbow fold.

Composition:

Median basilic vein on the inside

Median cephalic vein on the outside.

5- AT THE ARM:

-Cephalic brachial vein:

Formed by the union of the median cephalic vein and the antebrachial cephalic vein; runs along the lateral edge, in the delto-pectoral groove, to join the axillary vein.

-Brachial basilic vein:

Formed by the union of the antebrachial basilic vein and the median basilic vein to join the brachial vein.

III-DEEP VENOUS NETWORK:

The deep venous network is satellite to the arteries; there are always two veins for each artery, and they bear the same name as the corresponding artery, except for the axillary artery, which is accompanied by only one venous trunk.

All of these veins and their collaterals are equipped with valves.

The two veins of an artery are connected by transverse anastomoses.

The deep veins, which are satellites of the arteries, have the same direction, the same path, and the same relationships as the corresponding arteries, except for the axillary vein.

1- Axillary vein:

1 cm wide, it is formed by the union of the two satellite veins of the brachial artery and follows the axillary artery throughout its course.

In its lower part, the axillary vein is located on the inner side of the artery; then it wraps around the artery and moves to the antero-internal side of the artery in its upper part.

A collateral channel of the axillary vein is often found outside the vein and in front of the artery.

PRACTICAL APPLICATIONS:

Practical applications for superficial veins:

-intravenous injection, blood sampling, intravenous infusions.