

Le système lymphatique du membre thoracique

The lymphatic system of the thoracic limb

PLAN :

I-INTRODUCTION :

II-COURANTS LYMPHATIQUES SUPERFICIELS :

III-LYMPHONOEUDS SUPERFICIELS SUPERFICIELS :

I-INTRODUCTION :

Il existe deux systèmes lymphatiques : superficiel et profond :

- Le système profond : sous-aponévrotique, il draine la lymphe des os, articulations et muscles ;
- Le système superficiel : sus-aponévrotique, draine la lymphe des plans de couverture sus-aponévrotiques ; il y a très peu d'anastomoses entre les territoires superficiels et profonds.

II-VAISSEAUX LYMPHATIQUES SUPERFICIELS :

Naissent des réseaux de capillaires lymphatiques de la peau du membre supérieur, ils sont sous-cutanés.

Ils se réunissent entre eux et forment les collecteurs lymphatiques qui se terminent dans les nœuds lymphatiques régionaux.

- Au niveau des doigts : la lymphe se draine vers les collecteurs latéraux de chaque doigt et gagnent la face dorsale de la main.
- Au niveau de la main : les collecteurs de la face dorsale et palmaire de la main se jettent dans les collecteurs de l'avant-bras.


Nœuds superficiels

- Nœuds postérieurs superficiels de l'épaule
- Nœuds du sillon delto-pectoral
- Nœuds sus-épitrochléens



NŒUDS PROFONDS :

- Au niveau de l'avant-bras:
 - Nœuds cubitaux, radiaux et interosseux
- Au niveau du bras:
 - Nœuds huméraux
- Au niveau axillaire:
 - Groupe huméral
 - Groupe sous-claviculaire
 - Groupe central
 - Groupe sous-scapulaire
 - Groupe thoracique latéral
- Au niveau de la fosse sus-épineuse:
 - Nœuds sus-scapulaires



The lymphatic system

OUTLINE:

I-INTRODUCTION:

II-SUPERFICIAL LYMPHATIC CURRENTS:

III-SUPERFICIAL LYMPH NODES:

I-INTRODUCTION:

There are two lymphatic systems: superficial and deep:

- The deep system: subfascial, it drains lymph from the bones, joints and muscles;*
- The superficial system: supra-fascial, drains lymph from the supra-fascial layers; there are very few anastomoses between the superficial and deep areas.*

II-SUPERFICIAL LYMPHATIC VESSELS:

These arise from the networks of lymphatic capillaries in the skin of the upper limbs and are subcutaneous.

They join together to form lymphatic collectors that terminate in the regional lymph nodes.

- In the fingers: lymph drains to the lateral collectors of each finger and reaches the dorsal surface of the hand.*
- In the hand: the collectors on the dorsal and palmar surfaces of the hand flow into the collectors of the forearm.*
- In the forearm:*
 - Radial stream;*
 - Ulnar stream;*
 - Median or anterior median stream.*
- At the arm level: they travel along the anteromedial side of the arm to the armpit, where they become deep and terminate in the lateral and central axillary nodes.*
 - Medial bicipital lymphatic stream*
 - Medial basilic lymphatic stream;*
 - Lateral cephalic lymphatic flow.*

III-DEEP LYMPHATIC VESSELS:

These are satellites of the deep blood vessels and nerves, forming deep collecting trunks: radial, ulnar, anterior and posterior interosseous, and humeral.

They drain into the axillary lymph nodes.

III-SUPERFICIAL LYMPH NODES:

- Medial supracondylar;*
- Lymph nodes of the delto-pectoral groove;*

- *Superficial dorsal lymph nodes of the shoulder.*

IV-DEEP LYMPH NODES:

Located near the vessels of the thoracic limb.

- Lymph nodes of the forearm:

- *Radial nodes;*
- *Ulnar nodes;*
- *Interosseous nodes.*
- *Lymph nodes of the elbow crease:*
- *Proximal ulnar node;*
- *Lateral bicipital groove node.*

LYMPH NODES OF THE ARM:

- *Humeral nodes.*

- THE AXILLARY LYMPHOCENTRE (AXILLARY FOSSA):

- *Central axillary node group: Drains the brachial lymphatics;*
- *Pectoral group: Drains the lateral wall of the thorax, the two lateral quadrants of the breast and the supraumbilical portion of the abdominal wall*
- *Subscapular group: Drains lymph from the dorsal wall of the thorax, shoulder and nape of the neck.*
- *Apical subclavian group: Drains lymph from the other nodal groups and the two cranial quadrants of the breast.*