

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3  
FACULTE DE MEDECINE  
DEPARTEMENT DE MEDECINE  
LABORATOIRE D'ANATOMIE  
MEDECIN CHEF : PR BOUKABACHE L.  
POLYCOPIE POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE MEDECINE  
FAIT PAR : PR BENDJELLOUL MAYA.

## **NERF CUTANE ANTEBRACHIAL MEDIAL**

### **PLAN :**

#### **I-ORIGINE**

#### **II-TRAJET ET RAPPORTS**

#### **III-DISTRIBUTION**


#### **I-ORIGINE :**

Nait du fascicule médial du plexus brachial, au-dessus de l'origine du nerf ulnaire. Ces fibres émanent du huitième nerf cervical et du premier nerf thoracique.

#### **II-TRAJET ET RAPPORTS :**

- Ce nerf descend en dedans de l'artère axillaire puis en avant. Il se place en avant puis en dedans du nerf ulnaire et en avant de la veine axillaire.
- Au bras il descend en avant de la veine brachiale, ensuite au milieu du bras, il traverse le fascia, devient superficiel et se divise en deux branches terminales.

## Nerf cutané antébrachial médial et nerf cutané brachial médial



*Fig.1 : plexus brachial*

### III-DISTRIBUTION


**1-BRANCHES COLLATERALES :** donne des rameaux cutanés pour les téguments de la région interne du bras.

**2-BRANCHES TERMINALE :** se divise au-dessus de l'épicondyle médial en deux branches terminales :

- branche antérieure : descend le long et en dehors de la veine basilique, et se subdivise en plusieurs rameaux qui croisent la veine brachiale, ensuite ces rameaux descendent jusqu'au poignet et innervent les téguments de la région antéro-interne de l'avant-bras.

- branche postérieure : pour les téguments de la région postéro-interne de l'avant bras.

## Nerf cutané antébrachial médial et nerf cutané brachial médial



*Fig. 2 : innervation sensitive du membre supérieur*

### FIN

#### Références :

Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15 édition, MASSON.

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3  
FACULTE DE MEDECINE  
DEPARTEMENT DE MEDECINE  
LABORATOIRE D'ANATOMIE  
MEDECIN CHEF : PR BOULACEL A.  
POLYCOPIE POUR LES ETUDIANTS DE PREMIERE ANNEE DE MEDECINE  
FAIT PAR : DR BENDJELLOUL MAYA.

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>NERF CUTANE BRACHIAL MEDIAL</b> |
|------------------------------------|

**PLAN :**

**I-ORIGINE**


**II-TRAJET ET RAPPORTS**

**III-DISTRIBUTION**

**I-ORIGINE :**

Ce nerf se sépare du fascicule médial du plexus brachial un peu au-dessus du nerf cutané antébrachial médial ; ces fibres proviennent de la première thoracique


# Plexus Brachial



*Fig. 1 : plexus brachial*

## II -TRAJET ET RAPPORTS :

Il est situé à son origine en arrière et en dedans de l'artère axillaire puis descend et traverse le fascia brachial à la partie supérieure du bras, devient superficiel et se termine à hauteur de l'épicondyle médial.



*Fig. 2 : trajet du nerf cutané brachial médial*

### **III -DISTRIBUTION :**

Le cutané brachial médial se ramifie dans les téguments de la base de l'aisselle et de la région interne du bras.

### **FIN**

### **Références :**

Henri Rouviere et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15 édition, MASSON

## **MEDIAL ANTERIOR FOREARM SKIN NERVE**

### **I-ORIGIN:**

arises from the medial fascicle of the brachial plexus, above the origin of the ulnar nerve. The fibres originate from the eighth cervical nerve and the first thoracic nerve.

### **II-TRAJECTORY AND RELATIONSHIPS:**

this nerve descends in front of the axillary artery. In the arm, it descends in front of the brachial vein, then in the middle of the arm, it crosses the fascia, becomes superficial and divides into two terminal branches.

### **III -COLLATERAL BRANCHES:**

gives cutaneous branches to the integument of the inner region of the arm.

### **IV - TERMINAL BRANCHES:**

divides above the medial epicondyle into two terminal branches:

- anterior branch: for the integument of the antero-internal region of the forearm.
- posterior branch: for the integument of the postero-internal region of the forearm.

## **MEDIAL BRACHIAL CUTANEOUS NERVE**

### **I-ORIGIN:**

this nerve separates from the medial fascicle of the brachial plexus slightly above the medial antebrachial cutaneous nerve; these fibres originate from the first thoracic nerve.

### **II - TRAJECTORY AND RELATIONSHIPS:**

it originates behind and inside the axillary artery, then descends and crosses the brachial fascia in the upper part of the arm, becoming superficial and ending at the level of the medial epicondyle.

### **III - DISTRIBUTION:**

The medial brachial cutaneous nerve branches out in the integument of the base of the armpit and the inner region of the arm.