







SEMINAR 05 OF CYTOLOGY

Exercice appliqué sur le rôle de l'adhérence cellulaire dans l'inflammation

Exercice :

La figure ci-dessous représente des cellules endothéliales vasculaires activées par une agression, ces cellules vont exprimer des molécules d'adhésion favorisant l'attachement du neutrophile à l'endothélium. Cette figure décrit également l'activation des molécules d'adhésion du neutrophile par divers médiateurs nécessaire à son adhésion ferme à l'endothélium, son extravasation et enfin sa migration dans le tissu.

En s'appuyant sur les prés requis étudiés en cours et le schéma ci-dessous, décrivez minutieusement les différentes étapes assurés par les neutrophiles du moment où ils quittent la circulation et migrent à travers le vaisseau sanguin jusqu'à leurs arrivés dans le tissu blessé, sans oublier de préciser les différentes molécules d'adhérences impliqués dans ce phénomène.



Sélectine et son ligand
 Chimioattractant et son récepteur
 Activation cellulaire (de l'endothélium et des macrophages)

Intégrine β_2 inactive
 Intégrines β_2 active
 ICAM-1

Interactions homotypiques (PECAM-1, CD99, JAM)
 Granules
 Intégrines β_1 et β_3
 Matrice extracellulaire