

COURS 7. TROISIEME SEMAINE DU DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

Au cours de la 3^{ème} semaine, plusieurs phénomènes se produisent :

- la gastrulation : mise en place des trois feuillets définitifs.
- Le début de deux grands phénomènes : neurulation et métamérisation.
- Le développement des annexes ; allantoïde et placenta avec la formation des ébauches vasculaires extra-embryonnaires et l'apparition des cellules souches germinales.

1. 1. GASTRULATION

La gastrulation, peut se définir comme le processus au cours duquel du matériel cellulaire issu de l'ectophylle, jusqu'alors superficiel s'enfonce en profondeur, se différenciant en un troisième feuillet embryonnaire : Le mésoblaste et le disque embryonnaire didermique devient tridermique. La gastrulation suit les étapes suivantes :

1.1.1. Formation de la ligne primitive

Au 16^{ème} jour, à la face supérieure du disque embryonnaire, dans sa moitié caudale, les cellules de l'ectophylle convergent pour former un sillon longitudinal et médian : c'est la ligne primitive (L^{IV}E).

1.1.2. Formation du nœud de Hensen

Au 17^{ème} jour, l'extrémité de la L^{IV}E, située à peu près au milieu de la plaque embryonnaire, se termine par un épaississement : le nœud de Hensen.




Figure 1. Invagination des cellules ectophylliques et formation de la ligne primitive

Ces deux structures sont le point de départ d'un important flux de migration cellulaire pour former un troisième feuillet moyen : le mésoblaste, les cellules de l'ectophylle s'insinuent

entre l'ectophylle pré-existant et l'entophylle pour constituer le mésoblaste. Dès la mise en place du troisième feuillet, ectophylle et entophylle deviennent ectoblaste et entoblaste.

La ligne primitive détermine l'orientation axiale cranio-caudale de l'embryon et sa symétrie bilatérale.

Le mésoblaste a deux composantes :

- le mésoblaste latéral qui provient de la ligne primitive
- le mésoblaste axial ou chordal provenant du nœud de Hensen.

Aux deux extrémités du grand axe du disque embryonnaire, l'ectoblaste et l'entoblaste restent jointifs, sans interposition de mésoblaste. ; ces deux zones, de forme circulaire, constituent la membrane pharyngienne en avant et la membrane cloacale en arrière.




Figure 2. Gastrulation et mouvements morphogénétiques

2. MISE EN PLACE DE LA CHORDE : PROCESSUS CHORDAL

La mise en place de la chorde suit plusieurs étapes :

2.1. Formation du prolongement céphalique et du canal chordal (18^{ème} et 19^{ème} jour)

- A partir du nœud de Hensen, les cellules migrent vers l'extrémité rostrale jusqu'à proximité de la plaque pro-chordale.
- Elles forment, entre l'ectoblaste et l'entoblaste, un diverticule axial en doigt de gant, le prolongement céphalique qui s'étend en canal : le canal chordal.

2.2. Formation de la gouttière chordale et de la plaque chordale (20^{ème} et 21^{ème} jour)

- Le plancher du canal chordal fusionne avec l'entoblaste et l'ensemble est fissuré en plusieurs points et disparaît. Le reste du canal apparaît alors comme une gouttière

renversée, c'est le stade gouttière chordale, qui, tout en progressant vers la partie caudale, s'aplatit pour former une plaque longitudinale, plaqu chordale, remplaçant l'entoblaste sur la partie axiale du toit du LII.

- La disparition du plancher chordal ouvre une communication entre la cavité amniotique et le lécithocèle secondaire au niveau du nœud de Hensen : canal de Lieberkhunn ou canal neurentérique. Cette communication est transitoire et se ferme rapidement.

2.3. Formation de la chorde dorsale (22^{ème} jour)

L'entoblaste définitif se referme, individualisant au sein du mésoblaste embryonnaire un cordon plein, la chorde dorsale.





Planche 1. Les étapes du processus chordal



**Figure 3. Coupe longitudinale au niveau d'un embryon
âgé de 22 jours stade chorde pleine**

3. APPARITION DE CERTAINES EBAUCHES ET DEVELOPPEMENT DES ANNEXES

Avant même que soit terminée leur mise en place définitive, les feuilletts commencent déjà à subir des modifications, qui se prolongeront lors de la 4^{ème} semaine.

3.1. Début de la neurulation

- L'ébauchage du système nerveux débute le 18^{ème} jour du développement embryonnaire.
- Ce phénomène est apprécié sur des coupes transversales et comporte les phases suivantes :

3.1.1. Formation de la plaque neurale (18^{ème} jour)

- L'ectoblaste donne deux ensembles cellulaires distincts, le neuréctoblaste (plaque neurale) et l'épiblaste (le reste de l'ectoblaste).
- Le neuréctoblaste s'épaissit en avant du nœud de Hensen et prend la forme d'une raquette renflée en avant. C'est la plaque neurale qui s'étend progressivement vers la partie caudale.

3.1.2. Formation de la gouttière neurale (19^{ème} jour)

- Les bords latéraux de la plaque neurale se relèvent transformant la plaque en gouttière neurale.

- Les zones de jonction entre les bords de la gouttière neurale et l'ectoblaste constituent alors deux crêtes longitudinales : Les crêtes neurales.

3.1.3. Formation du tube neural (21^{ème} jour)

- Les bords de la gouttière se rejoignent et fusionnent dans la partie centrale de la plaque embryonnaire.
- La fermeture s'étend vers les extrémités céphalique (plus rapide) et caudale.
- Au moment de la fusion des berges de la gouttière pour former un tube qui est le tube neural, les crêtes neurales s'isolent dans le mésenchyme sous-jacent, de part et d'autre du tube.
- L'épiblaste rétablit sa continuité en surface.




Figure 4. Les étapes de la neurulation

3.2. Début de la métamérisation

Le mésoblaste (issu de la ligne primitive) se développe de façon très active du 19^{ème} au 21^{ème} jour. Trois bandes longitudinales se densifient au sein d'un tissu mésenchymateux, de chaque côté de la corde dorsale : mésoblaste para-axial, mésoblaste intermédiaire, et mésoblaste latéral.

3.2.1. Mésoblaste para-axial

- Les cellules se groupent en amas volumineux qui s'isolent les uns des autres dans le sens longitudinal.
- Chaque amas s'appelle un somite.
- La segmentation commence à la partie rostrale de la plaque embryonnaire (future région occipitale) et progresse vers la région caudale de façon symétrique.

3.2.2. Mésoblaste intermédiaire

Il forme un cordon qui subit également une segmentation métamérique longitudinale, le cordon néphrogène et sera en particulier à l'origine de l'appareil urinaire.

3.2.3. Mésoblaste latéral

- Il se clive et donne 2 feuillets : la somatopleure intra-embryonnaire et la splanchnopleure intra-embryonnaire.
- Entre ces deux feuillets, l'espace est ouvert sur le coelome intra-embryonnaire : future cavité péritonéo-pleuro-péricardique (dont le cloisonnement donnera les cavités péritonéale, pleurale et péricardique).




Figure 5. Les étapes de la métamérisation

3.3. Apparition des ébauches cardiovasculaires

Les premières ébauches vasculaires apparaissent vers le 17^{ème} jour dans le mésenchyme extra-embryonnaire.

- Une partie du mésoblaste (issu de la ligne primitive) migre vers la partie antérieure du disque embryonnaire, au-delà de la membrane pharyngienne et conflue avec le mésenchyme extra-embryonnaire (zone cardiogène). Cette zone est l'emplacement de l'ébauche cardiaque, visible dès le 19^{ème} jour.
- Des îlots de cellules angiogènes apparaissent dans le mésenchyme extra-embryonnaire (zone angiogène) :

- dans la paroi du lécithocèle (splanchnopleure), ce sont les vrais îlots de Wolff et Pander qui seront à l'origine de la circulation vitelline et des premières cellules sanguines ;
- dans le pédicule embryonnaire, autour de l'allantoïde, ils seront à l'origine de la circulation allantoïdienne (ou ombilicale).
- dans le mésenchyme du chorion, ils seront à l'origine du réseau vasculaire du placenta, en continuité avec la circulation allantoïdienne.

3.4. Apparition des cellules germinales primitives

- Au 20^{ème} jour, de volumineuses cellules arrondies apparaissent dans le mésenchyme extra-embryonnaire autour de l'allantoïde.
- Ce sont les cellules souches des futurs gamètes (cellules germinales primordiales) ou gonocytes primordiaux.
- Ils commencent à se différencier au 18^{ème} jour à partir du mésoblaste (ligne primitive) dans la région allantoïdienne.
- Les gonocytes primordiaux migrent, à la 5^{ème} semaine (27-35 jours), pour aller coloniser les ébauches des gonades. Dans les gonades, ils seront à l'origine des spermatogonies et des ovogonies.

3.5. Formation de l'allantoïde

- Vers le 18^{ème} jour, le toit du lécithocèle II (entoblaste) émet un diverticule qui s'enfonce dans le pédicule embryonnaire : le diverticule allantoïdien ou allantoïde.

3.6. Formation du placenta

- Au cours de la 3^{ème} semaine, en même temps que s'opère la gastrulation, le trophoblaste va former des villosités placentaires à l'origine du placenta (ce chapitre sera abordé dans les annexes embryonnaires).