

L'ARTERE **FEMORALE**

PLAN

I- Introduction

II- Anatomie Descriptive

1-DEFINITION

2-SITUATION,TRAJET,TAERMINAISON

3-RAPPORTS

4 - BRANCHES COLLATERALES

Objectifs

- Connaitre la vascularisation du membre inférieur
- Connaitre les différents rapports qu'entretient chaque artère
- Connaitre les différentes branches collatérales de chaque artère

I. INTRODUCTION

L'aorte abdominale se termine en regard de L4 par bifurcation en artères iliaques communes : droite et gauche

-Ces iliaques communes se divisent chacune au niveau des articulations sacro-iliaques en : iliaque interne, et iliaque externe .

La vascularisation du membre inférieur est assurée d'une part par l'axe artériel qui fait suite à l'artère iliaque externe c à d l'artère fémorale, et d'autre part par les branches pariétales extra-pelviennes de l'artère iliaque interne (hyppogastrique) à savoir :

- L'artère obturatrice
- L'artère glutéale supérieure : gagne la région fessière par la grande incisure ischiatique ,dans l'espace supra pyramidal.
- L'artère glutéale inférieure: gagne la région fessière par la grande incisure ischiatique ,dans l'espace infra pyramidal
- L 'artère pudendale interne

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE

1) DEFINITION

C'est le gros tronc artériel de la cuisse

-Origine: Fait suite à l'artère iliaque externe au milieu du ligament inguinal (arcade crurale ou arcade fémorale)

2) Situation, trajet et terminaison

Située à la partie antéro-médiale de la cuisse, elle la traverse obliquement de dehors en dedans vers le condyle fémoral médial.

Elle se termine dans le hiatus du muscle grand adducteur (anneau du grand adducteur) où elle devient artère poplitée

Elle est croisée en X par le muscle sartorius

3) RAPPORTS

-Le canal fémoral

Situé dans la partie antero médiale de la cuisse, il s'étend du ligament inguinal au hiatus du grand adducteur .

Il est croisé en avant par le muscle sartorius .

Il a la forme d'un prisme triangulaire ,présentant à décrire, deux orifice : proximal et distal, et deux régions :Le trigone fémoral (triangle de Scarpa) ,et le canal des adducteurs (canal de Hunter)

a-Orifice proximal du canal fémoral ou lacune vasculaire ou anneau crural

En avant : le ligament inguinal (arcade crurale ou arcade fémorale)

En dehors : arcade ilio-pectinée (bandelette ilio-pectinée)

En dedans : le ligament lacunaire (ligament de GIMBERNAT)

En arrière : éminence ilio-pubienne (ilio-pectinée) et l'épaississement aponévrotique du muscle pectinée (ligament de Cooper)

L'artère fémorale est en dehors de la veine fémorale

Elle est accompagnée par le **nerf de schwalbe** (rameau du nerf fémoral)

b- Trigone fémoral ou triangle de Scarpa

Limites

*En haut : le ligament inguinal

*En dehors : le muscle sartorius (couturier)

*En dedans : le muscle long adducteur (moyen adducteur)

*En arrière : le muscle ilio-psoas et le muscle pectiné

*En avant : le fascia lata (aponévrose fémorale).

La veine fémorale qui est en dedans de l'artère fémorale reçoit la grande veine saphène

Le nerf fémoral est en dehors de l'artère ,et se divise en ses quatre branches terminales

c- Canal des adducteurs ou canal de Hunter

Limites :

- Paroi antéro-latérale : par le septum intermusculaire médial et le muscle vaste médial.

- Paroi postérieure : par les muscles ; long et grand adducteur

- Paroi médiale : par l'aponévrose du canal de Hunter qui est une lame fibreuse tendue entre le muscle vaste médial et le bord médial du 3ème faisceau du grand adducteur.

La veine fémorale est en arrière de l'artère

Les nerfs saphène et saphène accessoire accompagnent l'artère.

D- Orifice distal du canal fémoral ou hiatus du grand adducteur

Le canal est circonscrit par le faisceau moyen et le faisceau inférieur du muscle grand adducteur.

L'artère est en rapport avec la veine fémorale et les lymphatiques profonds.

4) BRANCHES COLLATERALES

-Circonflexe iliaque superficielle

-Epigastrique superficielle

-Pudendales externes : supérieure et inférieure

-Femorale profonde

-Descendante du genou

Objectives

- To understand the arterial supply of the lower limb
- To identify the anatomical relations of each artery
- To describe the collateral branches of each artery

I. Introduction

The abdominal aorta terminates at the level of the fourth lumbar vertebra (L4) by bifurcating into the right and left common iliac arteries.

Each common iliac artery divides at the level of the sacroiliac joint into:

- the internal iliac artery
- the external iliac artery

The arterial supply of the lower limb is provided:

- primarily by the main arterial axis, which is the continuation of the external iliac artery, namely the femoral artery
- and secondarily by extra-pelvic parietal branches of the internal iliac (hypogastric) artery, including:
 - the obturator artery
 - the superior gluteal artery (passing through the greater sciatic foramen above the piriformis muscle)
 - the inferior gluteal artery (passing below the piriformis muscle)
 - the internal pudendal artery

II. Descriptive Anatomy

1. Definition

The femoral artery is the main arterial trunk of the thigh.

Origin:

It is the continuation of the external iliac artery at the midpoint of the inguinal ligament (femoral arch).

2. Situation, Course, and Termination

The femoral artery is located in the anteromedial aspect of the thigh.

It descends obliquely from lateral to medial toward the medial femoral condyle.

It terminates at the adductor hiatus (opening in the adductor magnus muscle), where it becomes the popliteal artery.

It is crossed anteriorly in an oblique manner by the sartorius muscle.

3. Relations

Femoral Canal (Femoral Sheath Region)

Located in the anteromedial thigh, extending from the inguinal ligament to the adductor hiatus.

It is crossed anteriorly by the sartorius muscle.

It has a triangular prism shape and includes:

- a proximal opening

- a distal opening
- two regions: the femoral triangle and the adductor canal

a. Proximal opening (Femoral ring / vascular lacuna)

- Anterior: inguinal ligament
- Lateral: iliopectineal arch
- Medial: lacunar ligament (Gimbernat's ligament)
- Posterior: pectineal ligament (Cooper's ligament) and iliopubic eminence

The femoral artery lies lateral to the femoral vein.

It is accompanied by a branch of the femoral nerve.

b. Femoral triangle (Scarpa's triangle)

Boundaries:

- Superior: inguinal ligament
- Lateral: sartorius muscle
- Medial: adductor longus muscle
- Posterior: iliopsoas and pectineus muscles
- Anterior (roof): fascia lata

Relations:

- The femoral vein lies medial to the artery and receives the great saphenous vein
- The femoral nerve lies lateral to the artery and divides into its terminal branches

c. Adductor canal (Hunter's canal)

Boundaries:

- Anterolateral wall: vastus medialis muscle
- Posterior wall: adductor longus and adductor magnus muscles
- Medial wall (roof): fibrous lamina between vastus medialis and adductor magnus

Relations:

- The femoral vein lies posterior to the artery
- The saphenous nerve and accessory saphenous nerve accompany the artery

d. Distal opening (Adductor hiatus)

Formed by the tendinous fibers of the adductor magnus muscle.

The artery is related to the femoral vein and deep lymphatic vessels.


4. Collateral Branches

- Superficial circumflex iliac artery
- Superficial epigastric artery
- External pudendal arteries (superior and inferior)
- Deep femoral artery (profunda femoris)
- Descending genicular artery

V- Références

- 1- HAMMOUDI SS. Le cours d'Anatomie, appareil locomoteur 2, membre inférieur. Auto édition.2004.
- 2- ROUVIERE H. Anatomie Humaine. Descriptive, topographique et fonctionnelle. Tome troisième. Appareil locomoteur. Membres. 13ème Ed. Masson éd. Paris 2002:

ARTERES DU MEMBRE INFERIEUR



VUE ANTÉRIEURE DU CANAL INGUINAL DROIT

