

Les lymphatiques du membre pelvien

I-Introduction

Le drainage lymphatique du membre pelvien s'effectue grâce à des vaisseaux superficiels et profonds qui aboutissent à des nœuds lymphatiques.

Il tire son intérêt du territoire drainé qui touche outre le membre pelvien, toute la zone infra-ombilicale de la paroi abdominale.

Il se répartit en deux grands réseaux superficiel et profond qui convergent vers la région proximale et ventrale du trigone fémoral ou de la région glutéale.

II- Les Nœuds lymphatiques

1- Nœuds lymphatiques superficiels

- Nœuds lymphatiques superficiels poplités : 1-2 petits nœuds sous-cutanés situés près de la crosse de la petite veine saphène ils drainent la peau de la face dorsale de la jambe.

- Nœuds lymphatiques superficiels inguinaux : 8-10 nœuds, de situation sus-aponévrotique dans le trigone fémoral, autour de la terminaison de la grande veine saphène.

Quatre groupes nodaux de lymphocentres

Supéro-latéral : Draine la paroi infra-ombilical

Supéro-médial : Draine les organes génitaux externes

Inféro-latéral : Draine le membre pelvien

Inféro-médial : Draine les organes génitaux externes et le canal anal

III-Nœuds lymphatiques profonds

-Nœuds lymphatiques tibiaux antérieurs profonds : Plusieurs nœuds le long des vaisseaux tibiaux antérieurs. Le nœud lymphatique tibial antérieur est le plus fréquent situé à la partie proximale de la jambe .

- Nœuds lymphatiques tibiaux dorsaux : Plusieurs nœuds ; lymphonœud tibial dorsal (milieu de la jambe), lymphonœud fibulaire (partie distale de la jambe) et lymphonœud tibio-fibulaire (à l'origine de l'artère fibulaire)

- Nœuds lymphatiques poplités profonds : 3-6 nœuds, sont petits, sous le fascia poplité, le long des vaisseaux et de l'abouchement de la petite veine saphène. Ils draine la jambe, le pied et le genou .

- Nœuds lymphatiques inguinaux profonds : 2-3 nœuds dans le trigone fémoral sous le fascia criblé , le lymphonœud lacunaire (ilio-fémoral profond - de Cloquet) est dans la lacune vasculaire entre la veine fémorale et le ligament lacunaire (Gimbernat).

Ils drainent les nœuds lymphatiques superficiels, des régions profondes du membre pelvien et des organes génitaux externes (voie afférente). La voie efférente se rend vers les lymphonœuds de l'artère iliaque externe.


IV- Vaisseaux lymphatiques superficiels

Sont calqué sur la disposition veineuse comprend des :

-Collecteurs lymphatiques satellites de la petite saphène : Suivent le trajet la petite veine saphène et se terminent dans le nœud lymphatique poplité superficiel qui se draine lui-même dans les nœuds collecteurs dorsaux satellites des veines saphènes.


-Collecteurs lymphatiques satellites de la grande veine saphène : Ils recueillent la lymphe superficielle de tout le reste du membre pelvien sauf celle de la région glutéale (fessière).

-Collecteurs lymphatiques glutéaux. Contournent latéralement la hanche, se terminent dans les nœuds lymphatiques superficiels inguinaux.



3

**Lymphonœuds
inguinaux profonds**



2

**Lymphonœuds
poplités profonds**

