

PLEXUS LOMBAIRE

NERF FEMORAL ET NERF OBTURATEUR

PLAN

- I. INTRODUCTION**
- II. ANATOMIE DESCRIPTIVE**
 - 1. CONSTITUTION**
 - 2. FORME, SITUATION**
- III. BRANCHES COLLATERALES**
- IV. BRANCHES TERMINALES**

I. INTRODUCTION :

L'innervation du membre inférieur est assurée par deux plexus : lombaire et sacré. Ces deux plexus sont anastomosés par le tronc lombo-sacré. L'ensemble des deux plexus est désigné sous le nom de plexus lombo-sacral.

Le plexus lombaire est un réseau anastomotique de fibres nerveuses provenant des centres médullaires lombaires allant de L1 à L4.

II. ANATOMIE DESCRIPTIVE :

1. CONSTITUTION :

- Le plexus lombal est constitué par l'union des rameaux antérieurs des nerfs lombaires L1, L2, L3, L4. Chacun de ces rameaux s'anastomose avec le rameau sus et sous-jacent.
- Le rameau antérieur de L1 reçoit une anastomose du 12^{ème} nerf intercostal et se divise en trois branches : le nerf ilio hypogastrique, le nerf ilio inguinal et une branche pour le nerf génito fémoral.
- Le rameau antérieur de L2 se divise en quatre branches pour la constitution du nerf génito fémoral, du nerf cutané latéral de la cuisse, du nerf obturateur et du nerf fémoral.
- Le rameau antérieur de L3 se divise en trois branches pour la constitution du nerf cutané latéral de la cuisse, du nerf obturateur et du nerf fémoral.
- Le rameau antérieur de L4 se divise en trois branches pour la constitution du nerf fémoral, du nerf obturateur et du tronc lombo-sacral.

2. FORME ET SITUATION :

Le plexus lombal est triangulaire. Il est situé entre les faisceaux du muscle grand psoas, longeant les faces latérales des corps vertébraux, en avant des apophyses costiformes.

III. BRANCHES COLLATERALES :

Il donne des rameaux musculaires pour les muscles : carré des lombes, petit psoas, grand psoas et des nerfs : le nerf ilio-hypogastrique, le nerf ilio-inguinal, le nerf génito-fémoral et le nerf cutané latéral de la cuisse.

1. Nerf ilio hypogastrique :

C'est un nerf mixte nait de la branche antérieure du 1^{er} nerf spinal lombaire L1.

Il se dirige en bas et en dehors croisant la face antérieure du muscle carré des lombes puis chemine entre le muscles transverse de l'abdomen et le muscle petit oblique.

A hauteur de l'épine iliaque antéro-supérieure il se divise en deux branches terminales : abdominale et génitale.

Il Innerve : les téguments de la partie inférieure de la paroi abdominale, la région génitale et la partie supéro médiale de la cuisse, les muscles de la partie inférieure de la paroi abdominale

2. Nerf ilio inguinal :

Nerf sensitif situé au-dessous du nerf ilio hypogastrique, son origine, trajet, sa terminaison et ses branches terminales sont identique au nerf ilio hypogastrique.

3. Nerf génito fémoral :

Nerf mixte nait des branches antérieures des 1^{er} et 2^{ème} nerfs spinaux lombaires L1 et L2.

Il traverse le muscle psoas, descend sur sa face antérieure et se termine à une distance variable du ligament inguinal en se divisant en deux branches terminales : latérale fémorale et médiale génitale.

Il innerve : la région génitale, les téguments du trigone fémoral et les muscles de l'abdomen.

4. Nerf cutané latéral de la cuisse :

Nerf exclusivement sensitif, il nait des branches antérieures des 2^{ème} et 3^{ème} nerfs spinaux lombaires L2 et L3. Il se dirige en bas et en dehors entre les deux faisceaux du muscle grand psoas, il continue son trajet vers l'épine iliaque antéro supérieure et le ligament inguinal, il chemine ensuite sous le ligament inguinal croise le muscle sartorius, dans la région antéro médiale de la cuisse il traverse le fascia lata et devient superficiel. Il se divise en deux branches terminales :

- Une branche glutéale : destinée aux téguments de la région latérale de la fesse
- Une branche fémorale : destinée aux téguments de la région antéro –latérale de la cuisse.

IV. BRANCHES TERMINALES

1. Nerf obturateur :

- Origine : nerf mixte nait par 03 racines issues des branches antérieures des 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} nerfs spinaux lombaires L2, L3, L4.
- Trajet : Il croise l'articulation sacro-iliaque, passe dans la cavité pelvienne puis il s'engage dans le canal obturateur où il se termine en se divisant en deux branches terminales.
- Branches terminales :
 - Branche antérieure : superficielle pénètre dans la loge musculaire médiale de la cuisse, donne trois rameaux destinés aux muscles gracile, long adducteur et court adducteur, ainsi qu'un rameau cutané.
 - Branche postérieure : profonde, pénètre aussi dans la loge musculaire médiale, puis il se place en arrière du muscle court adducteur et en avant du muscle grand adducteur, elle descend jusqu'au hiatus tendineux du grand adducteur qu'elle traverse pour rejoindre la fosse poplitée. Elle donne des rameaux musculaires pour les faisceaux supérieur et moyen du grand adducteur et pour l'obturateur externe et un rameau articulaire pour l'articulation du genou.
- Fonction
 - Motrice : adduction et rotation latérale de la cuisse, il innerve les muscles : obturateur externe, pectiné, court adducteur, long adducteur, grand adducteur et gracile.
 - Sensitive : il assure la sensibilité des téguments de la face médiale de la cuisse.

2. Nerf fémoral :

- Origine : nerf mixte, naît par 3 racines issues des branches antérieures des 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} nerfs spinaux lombaires L2, L3 et L4 entre les deux plans du muscle grand psoas .
- Trajet et rapport : le nerf fémoral se place en avant du muscle ilio psoas, passe sous le ligament inguinal pour se terminer dans le trigone fémoral en se divisant en 04 branches terminales.
- Branches terminales :
 - Nerf musculo cutané latéral : nerf mixte, il se divise en rameaux musculaires et cutanés
 - Rameaux musculaires : destinés au muscle sartorius.
 - Rameaux cutanés : innervent les téguments de la région antérieure de la cuisse.
 - Nerf musculo cutané médial : il se divise en rameaux musculaires et rameaux cutanés.
 - Rameaux musculaires : se distribue aux muscles pectiné et long adducteur.
 - Rameaux cutanés : innervent les téguments de la face antéro médiale de la cuisse.
 - Nerf du quadriceps fémoral : il est exclusivement moteur donne quatre branches pour les quatre chefs du muscle quadriceps fémoral : nerf du vaste intermédiaire, nerf du vaste médial, nerf du vaste latéral, et nerf du droit fémoral.
 - Nerf saphène : il est exclusivement sensitif, descend le long de l'artère fémorale, traverse le canal des adducteurs et arrive au niveau de l'interligne articulaire du genou où il se divise en deux branches terminales l'une patellaire, l'autre jambière.
- Territoires d'innervation :
 - Motrice : le nerf fémoral est fléchisseur de la cuisse et extenseur de la jambe, il est moteur pour les muscles suivants : ilio psoas, pectiné, long adducteur, quadriceps fémoral et sartorius.
 - Sensitive : il assure la sensibilité des téguments des régions suivantes : La face antérieure de la cuisse, les faces antéro médiales du genou, de la jambe et du cou du pied.

Références :

- Hammoudi SS. Le cours d'anatomie. Fasc.2 appareil locomoteur.membre inférieur, ISBN 2008
- Rouviere H. Anatomie Humaine Descriptive, Topographique et Fonctionnelle. Tome3.Membres. ed.masson 2002.



