

Ministère de l'enseignement supérieure et de la recherche scientifique
Université 3 Constantine Salah Boubnider .
Faculté de médecine CHU Constantine.
Laboratoire d'Anatomie humaine.
Cours pour étudiants de la deuxième année de médecine
. 2024/2025 DR Bousba

La glande thyroïde et les glandes parathyroïdes

1-La glande thyroïde

I-Introduction :

La glande ou corps thyroïde est une glande à sécrétion interne impaire et médiane, située dans le cou .

Sécrète 3 hormones :le tri-iodo-thyronine (T3) , thyroxine (T4) et la calcitonine (CT) .

le volume de la glande est un peu plus grand chez la femme que chez l'homme .

II-Anatomie descriptive :

Situation : située sur les faces antérieure et latérales du cou, dans la région infra-hyoïdienne ,entre les deux régions carotidiennes et enserre en fer à cheval **le larynx et la trachée**.

En regard des vertèbres cervicales C5,C6 et C7 .

Dimension –couleur :mesure 6cm de largeur , 6cm de hauteur ,Son poids est de 30g.

De couleur brun rougeâtre et de consistance molle.

Forme - constitution et rapports :

la thyroïde a la forme d'un papillon ou d'un H, c'est une masse glandulaire à surface légèrement lobulée entourée d'une capsule adhérente.

Elle est constituée de deux parties latérales volumineuses :**les lobes latéraux** droit et gauche unis par une partie moyenne étroite appelée **isthme**.

1-L'isthme thyroïdien :est une lame aplatie d'avant en arrière ,mesurant en moyenne 1cm de largeur et 1 à 2cm de hauteur, Présente deux faces antérieure et postérieure et deux bords supérieur et inférieur .

La face antérieure :convexe et répond à :

-L'aponévrose cervicale superficielle (lame superficielle)

-L'aponévrose cervicale moyenne ou lame pré trachéale) du fascia cervical ,

-Les muscles sterno-thyroïdien et sterno hyoïdien.

La face postérieure : concave ,répond aux 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} cartilages de la trachée .

Le bord supérieur :donne naissance à un prolongement c'est la pyramide de la langue ou le lobe pyramidal de la glande qui naît généralement à gauche de la ligne médiane , d'une hauteur variable , rarement il fait défaut.

Ce bord répond :à la pyramide de la langue et aux vaisseaux sus isthmiques.

Le bord inférieur :donne naissance aux veines thyroïdiennes inférieures,

-distant du sternum de 3cm.

L'isthme du corps thyroïde répond à la voie d'abord de la trachéotomie, il laisse libre le premier anneau trachéal et permet la trachéotomie sus-isthmique.

2-Les lobes :deux lobes droit et gauche , chaque lobe a la forme d'une pyramide triangulaire ,présente trois faces (antérolatérale ,médiale et postérieure) ,trois

bords(antérieur ,postéro-médial et postéro-latéral) , une base ou extrémité inférieure et un sommet ou extrémité supérieure.

A-Les faces :

A-1 –La face antéro-latérale : fait suite à la face antérieure de l'isthme ,elle est recouverte par les aponévroses cervicales superficielle(lame superficielle) et moyenne (la lame pré trachéale) du fascia cervical et par les muscles sterno-thyroïdien et sterno hyoïdien.

A-2-La face médiale est en continuité avec la face postérieure de l'isthme .

Elle répond de bas en haut à :

- La face latérale des 5 ou 6 premiers anneaux de la trachée ,
- La face latérale du cartilage cricoïde
- La partie inférieure du cartilage thyroïde du larynx

En arrière elle répond au pharynx ,à l'œsophage et les nerfs récurrents .

A-3- La face postérieure est déprimée en gouttière par le paquet vasculo-nerveux jugulo-carotidien répond aux :

glandes parathyroïdes, l'artère carotide primitive, la veine jugulaire interne et le nerf vague.

B-L'extrémité supérieure ou sommet ; reçoit les vaisseaux thyroïdiens supérieurs.

C-L'extrémité inférieure ou base est distante du sternum de 1à 2cm , en rapport avec les vaisseaux Thyroïdiens inférieurs.

III-Moyens de fixité : solidarisent la thyroïde à l'axe laryngo-trachéal, elle suit ses mouvements lors de la déglutition, ce sont :

- 1-La gaine viscérale du cou solidarise le corps thyroïdien aux autres viscères cervicaux
- 2-Le ligament thyro-trachéal médian de Gruber : fixe l'isthme à la trachée
- 3-les ligaments thyro-trachéaux latéraux internes de Gruber, fixent les lobes latéraux à la trachée
- 3-Les pédicules vasculaires de la glande,
- 4-Le tissu conjonctif qui entoure les veines thyroïdiennes moyennes

IV-Vaisseaux et nerfs :

A-Les artères :proviennent de deux artères thyroïdiennes supérieures ,branches des artères carotides externe droite et gauche, et de deux artères thyroïdiennes inférieures branches des artères sub clavières. Accessoirement de l'artère thyroïdienne moyenne branche de la crosse aortique.

1-L'artère thyroïdienne supérieure : elle donne au contact du sommet du lobe thyroïde trois branches :

- *Une branche interne : longe le bord supérieur de l'isthme et s'anastomose avec son homologue formant la communicante sus isthmique,
- *Une branche postérieure : suit la face postérieure du lobe latéral et va s'anastomoser avec une branche postérieure de l'artère thyroïdienne inférieure formant la communicante postérieure
- *Une branche externe : se ramifie à la face superficielle du corps thyroïde.

2-L'artère thyroïdienne inférieure : naît de l'artère sub-clavière.

Elle se divise en trois branches terminales :

- *La branche inférieure : qui forme avec son homologue une arcade sous-isthmique ;la communicante sous- isthmique.
- *La branche profonde,

*La branche postérieure : va s'anastomoser avec la branche postérieure de la thyroïdienne supérieure formant la communicante postérieure.

3-L'artère thyroïdienne moyenne (de Neubauer) : inconstante naît de la crosse aortique.

B-Les veines : les veines forment à la surface de la glande un riche réseau thyroïdien, de ce réseau naissent:

les veines thyroïdiennes supérieures qui se jettent soit dans le tronc thyro-lingo facial, soit directement dans la veine jugulaire interne.

Les veines thyroïdiennes moyennes se jette dans la veine jugulaire interne,

les veines thyroïdiennes inférieures qui se drainent dans les deux troncs veineux brachio-céphaliques.


C-Les vaisseaux lymphatiques ;

supérieurs vont aux nœuds jugulaires interne et retro-pharyngiens latéraux.


les lymphatiques inférieurs ; vont aux nœuds récurrente et jugulaire interne.

D-Les nerfs proviennent du plexus sympathique cervical et du parasympathique (nerfs vagues).


schémas



Situation de la glande thyroïde



Glande thyroïde vue postérieure



Vue antérieure du cou






FIG. 24.3. Rapports de la thyroïde. Coupe horizontale au niveau de C7 (partie antérieure)

- | | |
|--|---|
| 1. lame superficielle du fascia cervical | 15. œsophage |
| 2. vv. thyroïdiennes inf. | 16. n. laryngé récurrent |
| 3. m. sterno-hyôïdien | 17. parathyroïde inf. |
| 4. m. sterno-thyroïdien | 18. rr. cardiaques sup. |
| 5. v. jugulaire ant. | 19. ganglion cervical moyen, a. thyroïdienne inf. |
| 6. lig. thyro-trachéal lat. | 20. n. phrénique et lame prévertébrale |
| 7. m. sterno-cléido-mastoïdien | 21. lame prétrachéale musculaire |
| 8. platysma | 22. trachée |
| 9. m. omo-hyôïdien | 23. a. et v. thyroïdiennes inf. |
| 10. lymphonœuds jugulaires lat. | 24. racine sup. de l'anse cervicale |
| 11. m. scalène ant. | 25. a. carotide commune |
| 12. a. vertébrale | 26. v. jugulaire int. |
| 13. m. long du cou | 27. n. vague |
| 14. espace rétro-œsophagien | |



Vaisseaux de la thyroïde (vue postérieure)



veines de la thyroïde

2- Glandes parathyroïdes

Sont de petites glandes à sécrétion interne situées sur la face postérieure de la glande thyroïde. Au nombre de quatre :deux supérieures et deux inférieures .

Elles secrètent la parathormone PTH,

Elles sont ovoïdes et aplaties de couleur rouge-jaunâtre ou brune.

8mm de long,4mm de large et 2mm d'épaisseur

Le poids : 40mg .


Les supérieures sont situées à la face postérieure de la capsule fibreuse de la glande thyroïde contre l'apex .

les inférieures contre la base des lobes thyroïdiens.

vascularisation :--les artères naissent des artères thyroïdiennes inférieures, de la communicante postérieure.

-Les lymphatiques sont indépendants de la thyroïde se jettent dans le nœuds récurrentiels ou jugulaire interne.

-Les nerfs accompagnent les artères : sympathiques et parasympathiques.



Références :

Alain Bouchet tête et cou

-H Rouvière , A Delmas tome 1 Tête et cou

-P Kamina tête et cou



