

Voies spermatiques extra testiculaires et prostate

Voies spermatiques extra testiculaires

1. Introduction :

Ce sont les voies d'excrétion du sperme produit par le testicule s'étendent de l'épididyme jusqu'à l'urètre. Elles comportent successivement : l'épididyme, le canal déférent, la vésicule séminale, le canal éjaculateur et l'urètre. Leur obstruction engendre une stérilité masculine excrétoire.

2. Epididyme :

Définition : C'est un organe pair, allongé d'avant en arrière, placé sur le bord postérosupérieur et débordant sur la face latérale du testicule.

Il fait suite en avant et en haut aux canalicules efférents et se continue en arrière par le canal déférent

Configuration : Il a la forme d'un bourrelet de 05cm de long, On lui décrit trois portions :

- la tête : c'est la partie antérieure dilatée, elle porte les cônes efférents, parfois il existe sur l'extrémité antérieure de la tête de l'épididyme l'appendice épидидymaire (hydatide pédiculée : vestige embryonnaire).
- le corps : cylindrique recouvert partiellement par la vaginale.
- la queue : se continue avec le conduit déférent.

La tête et la queue de l'épididyme sont accolés au testicule tandis que le corps est séparé du testicule par un prolongement de la vaginale appelé cul-de-sac inter-épididymo-testiculaire.

Constitution : L'épididyme contient le conduit épидидymaire pelotonné long de 6 mètres, enveloppé par une capsule conjonctive en continuité avec l'albuginée du testicule.

3. Canal déférent :

Définition : Il fait suite à l'épididyme au niveau de la jonction épидидymo-déférentielle (angle aigu : anse épидидymo-déférentielle), et se termine au point de jonction de la vésicule séminale et du canal éjaculateur.

Au nombre de deux, sa longueur est environ de 40 cm et son diamètre : 2 mm, sa consistance est très ferme.

Trajet : Il présente 05 segments correspondant aux régions traversées :

- Épидидymo-testiculaire (scrotal) : Il monte sur le versant médial du bord postérieur du testicule et la face médiale du corps de l'épididyme.
- Funiculaire : il est situé dans le cordon spermatique.
- Inguinal : traverse le canal inguinal (point faible de la paroi abdominal antérieure)
- Iliaque : il se dirige en bas et en arrière dans l'espace sous péritonéal jusqu'au détroit supérieur.
- Pelvien : il comporte 02 segment :
 - * Segment latéro-vésical.
 - * Segment rétro-vésical : ce segment est augmenté de volume et présente des bosselures, il est appelé l'ampoule du canal déférent.

4. vésicule séminale :

Au nombre de deux, situés au niveau de la face dorsale de la vessie, au-dessus de la prostate.

Elles interviennent dans la production du liquide séminal, et constituent également un réservoir de spermatozoïde entre les éjaculations.

La vésicule séminale est formée d'un conduit coudé à surface bosselée.

La réunion de chaque vésicule séminale avec le canal déférent correspondant permet la formation du canal éjaculateur.

Déroulée la vésicule séminale mesure en moyenne 5 à 6 cm de long, 5 mm d'épaisseur.

5. canal éjaculateur :

Au nombre de deux, de 2 à 3 cm de long, formé chacun par la réunion de la vésicule séminale et du conduit déférent correspondant. Il chemine dans la prostate, il se termine dans l'urètre prostatique au niveau du colliculus séminal (ou veru montanum).




Figure 01 : voies spermatiques




Figure 02 : vue postérieure de la vésicule séminale, ampoule déférentielle et prostate

Prostate

1. Introduction :

La prostate est une glande génitale masculine annexe, elle participe à la formation du plasma séminal qui constitue avec les spermatozoïdes le sperme.

Elle est située au carrefour des voies urinaires qui la traversent et des voies spermatiques qui s'y terminent.

Sa pathologie particulièrement riche, relève de processus infectieux (prostatites), dystrophiques (adénomes) ou malins (cancers). Son atteinte compromet la fertilité, l'éjaculation et la miction.

2. Anatomie descriptive :

2.1. Situation :

Elle est située :

- Au-dessous de la vessie
- Au-dessus du plancher périnéal
- En avant du rectum entre les muscles élévateurs de l'anus de chaque côté.
 - *Peut être examinée à l'aide de l'index par un toucher rectal.*
- En arrière de la symphyse pubienne.

2.2. Configuration externe :

Elle a la forme d'un cône aplati d'avant en arrière, à sommet inférieur.

Son axe est oblique en bas et en avant.

On lui décrit 4 faces, une base et un sommet.

- Les faces : se distinguent en :

- Antérieure : plane et verticale.
- Postérieure : plus oblique, plus convexe avec une dépression médiane verticale la divisant en 2 lobes latéraux.
- 2 faces latérales : larges et arrondies.
 - La base ou face supérieure : divisée par un bourrelet saillant, transversal en :
 - Versant antérieur uréthro-vésical.
 - Versant postérieur, génital : présente une gorge transversale dans laquelle s'enfoncent les vésicules séminales et les canaux déférents qui convergent pour former les canaux éjaculateurs.
 - Le sommet ou bec de la prostate : regardant en bas et en avant, répond à l'émergence de l'urètre.

2.3. Dimensions et poids : elle mesure en moyenne chez l'adulte, 30 mm de hauteur, 40 mm de large à sa base et 25 mm d'épaisseur. Poids : 20g.

2.4. Couleur : blanchâtre ou gris blanchâtre ou rose pâle voir rouge.

2.5. Consistance : est ferme, élastique et régulière, plus endurée chez les sujets âgés.

Facile à apprécier par le toucher rectal.

2.6. Structure :

La prostate est entièrement enveloppée d'une capsule conjonctive, mince et adhérente qui envoie en profondeur de nombreuses cloisons entre les lobules qui se rassemblent en un certain nombre de masses glandulaires formant « les lobes prostatiques ».

Plusieurs canaux la traversent : l'urètre, les canaux éjaculateurs et l'utricule.

3. Systématisation de la glande prostatique :

Du point de vue topographique la prostate présente 04 parties :

- L'isthme : partie de la glande en avant de l'urètre.

- Lobe moyen (prostate crâniale ou prostate centrale) :

C'est la portion de la glande comprise entre l'urètre et les conduits éjaculateurs.

Elle ne contient que 25% de parenchyme glandulaire, et elle est sous la dépendance des œstrogènes.

C'est la zone des hypertrophies bénignes de la prostate (adénomes).

- Lobes latéraux droit et gauche (prostate caudale ou périphérique)

En arrière des conduits éjaculateurs, et en dessous du lobe moyen.

Ils contiennent 70% des glandes prostatiques.

Sensibles aux androgènes.

Ils sont le siège habituel des cancers de prostate.

4. **Moyens de fixité** : La prostate est un organe fixe, maintenue en place par :

- Son adhérence avec la base de la vessie.
- La traversée de l'urètre et des voies spermatiques.
- Ses connexions avec la paroi de la loge prostatique.

5. Rapports :

La prostate est contenue dans une loge appelée la loge prostatique.

5.1. **La loge prostatique** : formée par.

- **En avant** : le fascia pré-prostatique qui se termine en haut dans les ligaments pubo-vésicaux et en bas le ligament transverse de périnée.
- **En arrière** : l'aponévrose recto-vésicale (prostato-péritonéale) la sépare du rectum et se soude latéralement aux lames sacro pubiennes.
- **Latéralement** : la partie basse des lames sacro-pubiennes qui descendent jusqu'à l'aponévrose moyenne du périnée et remonte en haut sur les flancs de la vessie.
- **En haut** : la vessie et par le tissu conjonctif fibreux qui unit cet organe à la base de la prostate.
- **En bas** : le plan moyen du périnée.

5.2. **Rapports de la prostate à l'intérieur de la loge prostatique** :

La portion prostatique de l'urètre.

Les canaux éjaculateurs.

Le muscle sphincter lisse de l'urètre.

La partie supérieure périprostatique du muscle sphincter strié de l'urètre.

Les éléments veineux périprostatiques.

5.3. **Rapports par l'intermédiaire de la loge prostatique** :

- En avant : le plexus de Santorini.
- En arrière : le rectum, les vésicules séminales, la terminaison des canaux déférents et les pédicules vasculo-nerveux.
- En haut : la vessie, la terminaison des voies spermatiques (vésicules séminales et ampoules déférentielles).
- En bas : le diaphragme uro-génital.

6. Vascularisation :

6.1. **Artères** : Elle est sous la dépendance de l'artère hypogastrique et assurée par les artères suivantes :

L'artère vésicale inférieure, l'artère vésico-prostatique, l'artère pudendale interne, l'artère rectale moyenne qui participe accessoirement à la vascularisation de la prostate.

6.2. **Veines** : Les veines se jettent

En avant et latéralement dans le plexus veineux prostatique.

En arrière dans le plexus séminal

Tout le sang de ces plexus est conduit par les veines vésicales à la veine iliaque interne.

6.3. **Lymphatiques** : forment un réseau périprostatique qui se draine dans les nœuds :

Iliaque interne, Iliaque externe et sacraux (et du promontoire).

7. Innervation :

Les nerfs de la prostate viennent du plexus hypogastrique.




Figure 01 : configuration de la prostate (vue latérale)




Figure 02 : Systématisation de la prostate




Figure 03 : Coupe sagittale du pelvis chez l'homme