

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
 Université de Constantine 3 Salah Boubnider
 Faculté de médecine CHU de Constantine
 Laboratoire d'Anatomie Générale

La verge

Cours pour étudiants de deuxième année de médecine

I- INTRODUCTION :

La verge ou pénis est l'organe de la copulation et de la miction chez l'homme. Il est fixé devant la symphyse pubienne, pendant devant les bourses à l'état de repos. Il est constitué de formations érectiles entourées d'une enveloppe cutanée commune, le fourreau de la verge.

II- ANATOMIE DESCRIPTIVE

La verge présente deux segments :

- un segment postérieur fixe : la racine
- un segment antérieur pendant : le corps

1-DIMENSIONS : En moyenne, selon l'état de flaccidité ou d'érection, Au repos, sa longueur est de 10 à 12 cm et sa circonférence de 8 à 9 cm. En érection, sa longueur passe à 16 à 18 cm et sa circonférence à 11 à 12 cm.

2- LES ORGANES ERECTILES

Deux corps caverneux et un corps spongieux formés par un tissu aréolaire qui, lorsqu'il se remplit de sang, entraîne l'érection.

a- corps caverneux,

Latéraux, pairs et symétriques, ils sont plaqués en arrière contre les branches ischio-pubiennes. Recouvert par les muscles ischio-caverneux qui les fixent.

Ils sont d'abord séparés à leur origine, ils se rejoignent pour former une gouttière ventrale où se loge le corps spongieux.

b- corps spongieux :

- Il est médian présentant à sa partie postérieure une portion renflée en massue : le bulbe
- entouré à son origine par la sangle musculaire du muscle bulbo-spongieux, puis engainant l'urètre antérieur, il se termine en formant le gland.


3- Le Gland

Il est séparé du corps de la verge par un sillon : le sillon coronal ou balano-préputial qui forme tout autour du gland, une gouttière interrompue à la partie médiane de la face inférieure par un repli cutané, le frein.

Le sillon coronal renferme des glandes sébacées dont la sécrétion constitue le smegma qui peut s'accumuler dans le sillon balano-préputial (manque d'hygiène, entraînant les adhérences préputiales).


Les enveloppes du pénis forment autour du gland un repli cylindrique, le prépuce, qui se dispose en manchon autour du gland (c'est ce prépuce qui est entièrement coupé lors d'une circoncision).

La verge



4) LES ENVELOPPES DU PENIS :


- une albuginée épaisse qui entoure chacun des corps érectiles
- le fascia pénis qui entoure un espace celluleux important qui explique les possibilités de « glissement » du fourreau sur les formations érectiles.
- le dartos
- la peau ou fourreau de la verge.



III-VASCULARISATION :

1-Artères

- **Profondes**, toutes provenant de l'artère Pudendale (honteuse) interne, branche de l'iliaque interne qui donne les artères caverneuses, l'artère bulbo-urétrale, artère dorsale de la verge.
- **Superficielles**, provenant de l'artère Pudendale (honteuse) externe, branche de l'artère fémorale, destinées au fourreau de la verge.




2- Veines

- la veine dorsale profonde du pénis, draine les formations érectiles, puis se jette dans les plexus pré et latéraux vésicaux enfin dans les veines iliaques
- la veine dorsale superficielle du pénis, draine le fourreau et le prépuce, s'ouvre dans la veine pudendale externe, qui constitue un affluent de la grande veine saphène.

3- Lymphatiques

Ils se drainent vers les nœuds inguinaux superficiels et profonds, qui se drainent vers les ganglions pelviens : iliaques externes, hypogastriques puis iliaques primitifs.



4- Nerfs

Ils proviennent :

- du système organo-végétatif, c'est à dire du plexus hypogastrique inférieur, ils accompagnent essentiellement l'artère caverneuse. C'est eux qui rendent possible l'érection.

La verge

- du système cérébro-spinal : rameau génital du nerf génito-fémoral, nerf dorsal du pénis et rameau périnéal superficiel, branche du nerf pudendal interne.

PATHOLOGIE

- **Phimosis** : prépuce trop serré à son extrémité : traitement : circoncision

- **Adhérences balano-préputiales** : ce sont des accolements entre la partie interne du prépuce et la surface du gland causés par :

- ✓ Mauvaise hygiène prolongée (smegma).
- ✓ Balanite.
- ✓ Phimosis.

- **Brièveté du frein de la verge** : peut être à l'origine d'une bascule du gland responsable de douleurs lors des érections et des rapports sexuels.

- **Hypospadias** : malformation congénitale qui se manifeste par l'ouverture de l'urètre dans la face inférieure du pénis.

L'hypospadias peut être antérieur (balanique ou coronal), moyen, ou postérieur

- **Epispadias** : malformation congénitale qui se manifeste par l'ouverture de l'urètre dans la face supérieure du pénis





Image d'hypospadias (antérieur, moyen et postérieur)



Référence

Kamina P. Anatomie clinique système endocrine, organes urinaires et génitaux, pelvis, coupes du tronc. 2^{ème} édition Maloine tome 4