

The background features a series of horizontal, wavy lines in shades of light green and pale yellow, creating a sense of depth and movement. Scattered across the image are numerous water droplets of varying sizes, rendered with realistic shading and highlights to give them a three-dimensional appearance. The droplets are concentrated more towards the top and bottom edges, leaving the central area where the text is located relatively clear.

LES VACCINS VIRAUX

The background features a series of horizontal, wavy bands in shades of light green, pale yellow, and soft pink. Scattered across the image are numerous bubbles of varying sizes, rendered with realistic shading and highlights to give them a three-dimensional appearance. Some bubbles are clustered together, while others are isolated.

INTRODUCTION

- LA VACCINATION EST L'UN DES MOYENS LES PLUS RENTABLES D'AMÉLIORER LA SANTÉ EN ÉVITANT CHAQUE ANNÉE DES MILLIONS DE DÉCÈS ET EN RÉDUISANT LE NOMBRE D'HANDICAPS DUS AUX INFECTIONS.
- POUR L'HISTOIRE IL FAUT SAVOIR QUE 100 ANS SONT ÉCOULÉES ENTRE JENNER QUI EN 1798 PAR VOIE INTRADERMIQUE INJECTE LE VIRUS DE LA VACCINE QUI PROTÈGE CONTRE LA VARIOLE ET PASTEUR QUI EN 1885 APPLIQUE POUR LA PREMIÈRE FOIS AVEC SUCCÈS EN FRANCE UN TRAITEMENT CONTRE LA RAGE EN POST-EXPOSITION À L'AIDE D'UN VACCIN CULTIVÉ SUR MOELLE DE LAPIN ET INACTIVÉ
- LA VARIOLE A ÉTÉ ÉRADICUÉE EN 1979 GRÂCE À UN VACCIN VIVANT D'EXCELLENTE QUALITÉ, LA VACCINE.
- LA POLIOMYÉLITE EST SUR LE POINT D'ÊTRE ÉRADICUÉE ET 2/3 DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT ONT ÉLIMINÉ LE TÉTANOS NÉONATAL.

The background of the slide features a series of horizontal, wavy bands in shades of light green and pale yellow. Scattered across this background are numerous water droplets of varying sizes, rendered with realistic highlights and shadows to give them a three-dimensional appearance. Some droplets are clustered together, while others are isolated.

A) VACCINS VIVANTS ATTÉNUÉS :

1) VACCIN ANTIVARIOLIQUE

- NON COMMERCIALISÉE DU FAIT DE L'ÉRADICATION DE LA MALADIE EN 1980. IL EST À BASE DE VIRUS DE LA VACCINE, VIRUS APPARENTÉ À CELUI DE LA VARIOLE PATHOGÈNE CHEZ LES BOVIDÉS.
- L'ADMINISTRATION SE FAIT PAR SCARIFICATION

2) VACCIN ANTIPOLIOMYELITIQUE ORAL :

- IL EXISTE UN VACCIN VIVANT ATTÉNUÉ ADMINISTRÉ PER OS (**VPO = SABIN**) : COMPORTE LES 2 SÉROTYPES : **1 ET 3**, ET UN VACCIN TUÉ INJECTABLE (**VPI= SALK**) : UN SEUL **SÉROTYPE 2**.
 - **LE VPO** : MULTIPLICATION DU VIRUS ATTÉNUÉ DANS L'INTESTIN DONC IL EMPÊCHE L'INFECTION INTESTINALE PAR LE VIRUS SAUVAGE ET BLOQUE SA DIFFUSION.
 - LES ANTICORPS MATERNELS PEUVENT DIMINUER SON EFFICACITÉ.
 - LA PRIMO VACCINATION (CALENDRIER ALGÉRIEN) : 1ÈRE PRISE À LA NAISSANCE. RAPPEL À 2, 4, 12 MOIS, PUIS 6, 11-13 ANS.
 - LE VACCIN ATTÉNUÉ EST CONTRINDIQUÉ CHEZ : L'IMMUNODÉPRIMÉ, LA FEMME ENCEINTE ET LES MALADIES MALIGNES.
 - L'INCONVÉNIENT PRINCIPAL DU VPO : LES SOUCHES PEUVENT REDEVENIR VIRULENTES ET ENTRAINER UNE POLIOMYÉLITE VACCINALE CHEZ LES SUJETS CONTACTS DES VACCINÉS.

3) VACCIN CONTRE LA ROUGEOLE

- LA ROUGEOLE EST UNE MALADIE QUI PEUT ENTRAINER DES COMPLICATIONS TRÈS GRAVES.
- LE VACCIN EST DE TYPE VIVANT ATTÉNUÉ ET IL EXISTE SOUS 2 FORMES :
 - **FORME SIMPLE (ROUVAX)** : SOUCHE SCHWARTZ
 - **FORME COMBINÉE (ROR)** : MÊME SOUCHE OU SOUCHE EDMONSTON
- LES POPULATIONS CIBLES : SONT LES ENFANTS DE 9MOIS ET 18MOIS (RATTRAPAGE), ET LES ADULTES NON VACCINÉS OU N'AYANT PAS FAITS DE ROUGEOLE
- VACCIN FRAGILE, DES ÉCHECS DUS AUX NON RÉPONDEURS OU À DES ACS MATERNELS, EN FAIT 5 % DES SUJETS VACCINÉS N'ÉLABORENT PAS D'AC (INTERFÉRENCE AVEC LES AC MATERNEL OU MAUVAISE CONSERVATION DU VACCIN). CE QUI NÉCESSITE UN RAPPEL (POUR RATTRAPER LES NON VACCINÉS ET MIEUX PROTÉGER LES VACCINÉS).
- EFFETS INDÉSIRABLES : ENCÉPHALITE, CONVULSIONS, THROMBOPÉNIE...ETC.
- CONTRES INDICATIONS : ALLERGIE AUX PROTÉINES DE L'ŒUF ET À LA NÉOMYCINE.

4) VACCIN CONTRE LA RUBEOLE :

- VACCIN ASSOCIÉ À CELUI DE LA ROUGEOLE, OREILLONS : **ROR** (RUBÉOLE OREILLON ROUGEOLE)
- VACCIN ASSOCIÉ À LA ROUGEOLE.
- VACCIN MONOVALENT : **RUDIVAX**.
- POPULATION CIBLE :
 - *LES ENFANTS DES DEUX SEXES : 2 INJECTIONS À L'ÂGE DE 11 ET 18 MOIS.
 - * LES FEMMES EN ÂGE DE PROCRÉER SÉRONÉGATIVE : (CONTRACEPTION 2 MOIS AVANT ET 2 MOIS APRÈS LA VACCINATION)
- CONTRE-INDIQUÉ CHEZ LA FEMME ENCEINTE, L'IMMUNODÉPRIMÉ, EN CAS D'ALLERGIE À LA NÉOMYCINE.
- EFFETS INDÉSIRABLES : FIÈVRE, THROMBOPÉNIE, ADÉNOPATHIES ET EXANTHÈME.

5) VACCIN CONTRE LES OREILLONS :


- ADMINISTRÉ EN S/C OU IM.
- APPLICATION COMME LE ROR.
- CONTRES INDICATIONS : IMMUNODÉPRESSION, GROSSESSE, ALLERGIE AUX PROTÉINES DE L'ŒUF ET LA NÉOMYCINE.
- EFFETS INDÉSIRABLES : FIÈVRE, PAROTIDITE, MÉNINGITE POST VACCINALE, ÉRYTHÈME.

6) VACCIN ANTI VARICELLE :

- ADMINISTRÉ EN S/C OU IM.
- SOUCHE OKA.
- 2 INJECTIONS À 3 MOIS D'INTERVALLE.
- CONTRES INDICATIONS : FEMME ENCEINTE, IL NE FAUT PAS AVOIR DE CONTACT AVEC LES SUJETS AYANT REÇUS LE VACCIN DANS LES 20J PRÉCÉDENTS

7) FIEVRE JAUNE :

- VACCINATION SYSTÉMATIQUE DES POPULATIONS EXPOSÉES À L'AIDE DU VACCIN **17D ROCKFELLER** EN UNE SEULE INJECTION, VACCIN VIVANT ATTÉNUÉ PRÉPARÉ SUR ŒUFS DE POULE EMBRYONÉS, TRÈS BIEN TOLÉRÉ (PEUT ÊTRE ADMINISTRÉ DÈS L'ÂGE DE 9 MOIS)
- PROTECTION QUI DURE 10 ANS ET MÊME BIEN PLUS, IL N'EST PAS CONTRE INDIQUÉ CHEZ LA FEMME ENCEINTE ET LES IMMUNODÉPRIMÉS.
- TOUTE PERSONNE SE RENDANT EN ZONE D'ENDÉMIE (AFRIQUE OU AMÉRIQUE DU SUD) DOIT ÊTRE VACCINÉE

The background of the slide features a series of horizontal, wavy lines in shades of light green and pale yellow, creating a textured, water-like effect. Scattered across the top and bottom edges are several realistic water droplets of varying sizes, each with a highlight and a shadow, giving them a three-dimensional appearance.

B) VACCINS INACTIVES OU TUÉS :

(1) VACCIN POLIO INACTIVÉ (VPI = VACCIN SALK):

- LE VPI EST INOFFENSIF (NÉCESSITÉ DES RAPPELS) MAIS PAS D'IMMUNITÉ INTESTINALE DONC NE BLOQUE PAS LA CIRCULATION DU VIRUS SAUVAGE.
- ADMINISTRÉ EN S/C OU IM
- NÉCESSITE PLUSIEURS RAPPELS.
- N'EMPÊCHE PAS L'IMPLANTATION D'UN VIRUS SAUVAGE DANS L'INTESTIN
- EN ALGÉRIE : 1 DOSE À 3 MOIS

2) VACCIN ANTIGRIPPAL :

-**VACCIN TRIVALENT** : CONTIENT 3 SOUCHES **A/H3N2**, **A/H1N1** ET **B** ET SA COMPOSITION EST RÉÉVALUÉE CHAQUE ANNÉE EN FONCTION DES SOUCHES AYANT CIRCULÉES L'ANNÉE PRÉCÉDENTE.

-ADMINISTRÉ PAR VOIE S/C OU IM : EN 1 INJECTION POUR L'ADULTE ET 2 INJECTIONS À 1 MOIS D'INTERVALLE POUR L'ENFANT < 10 ANS.

-RECOMMANDÉ POUR LES SUJETS ÂGÉS, FEMMES ENCEINTES, DRÉPANOCYTAIRES, PERSONNELS DE SANTÉ.

-ASSURE UNE PROTECTION D'1 ANNÉE

-EFFICACITÉ ENTRE 60 ET 90%.

-CI : ALLERGIE AUX PROTÉINES DE L'ŒUF.

3) VACCIN ANTIRABIQUE :

A)VACCIN APRÈS EXPOSITION : 02 TYPES DE VACCINS SONT COMMERCIALISÉS EN ALGÉRIE :

-VACCIN PRODUIT PAR L'IPA, **SUR CERVEAUX DE SOURICEAUX NOUVEAU-NÉS** : SCHÉMA VACCINAL : 7 INJECTIONS EN SOUS CUTANÉ DE J1- J7 PUIS 2 INJECTIONS DE RAPPEL À J11 ET À J15 ET 2 INJECTIONS DE RAPPEL À J30 ET À J90

-VACCIN PRODUIT SUR **CULTURE CELLULAIRE** : AVEC UN SCHÉMA : J0, J3, J7, ET J28 OU J0, J7, J21

SÉROTHÉRAPIE : RECOMMANDÉE POUR LE TRAITEMENT DES CONTAMINATIONS DITES DE 3ÈME CATÉGORIE, C'EST À DIRE DES MORSURES, GRIFFURES, LÉCHAGES SUR PEAU EXCORIÉE OU SUR MUQUEUSE ET ÉGALEMENT DES MORSURES GRAVES DÉLABRANTES ET/OU AU NIVEAU DES RÉGIONS RICHEMENT INNERVÉES : **IG HUMAINES ET HÉTÉROLOGUES.**

B)VACCIN PRÉVENTIF : POUR LES POPULATIONS À RISQUE ; 2 INJ À 1 MOIS D'INTERVALLE, RAPPEL APRÈS 1 ANS PUIS TOUS LES 3 ANS PAR VOIE S/C OU IM.

C) VACCINS SOUS-UNITAIRES :

- CE SONT DES FRACTIONS ANTIGÉNIQUES OU SOUS UNITÉS VACCINANTES. ILS SONT STABLES ET INOFFENSIFS.
- ☐ VACCIN CONTRE L'HÉPATITE B.
- ☐ VACCIN CONTRE L'HÉPATITE A.
- ☐ VACCIN CONTRE L'ENCÉPHALITE JAPONAISE.
- ☐ VACCIN DE L'ENCÉPHALITE À TIQUES.

1) VACCIN ANTI HEPATITE « B » :

- L'HÉPATITE B CONSTITUE UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE AVEC 350 MILLIONS DE PORTEURS CHRONIQUES ET 2 MILLIONS DE MORTS PAR AN DANS LE MONDE. LA VACCINATION PRÉVIENT LES COMPLICATIONS GRAVES COMME LE CANCER ET RÉDUIT LE PORTAGE D'AG HBS. 60 À 75% DES CARCINOMES HÉPATOCELLULAIRES SONT AINSI ÉVITÉS.
- **POPULATION CIBLE :**
 - NOUVEAU-NÉS : NAISSANCE, 2MOIS, 4 MOIS, 1 2MOIS
 - ENTOURAGE DES PORTEURS DE VIRUS.
 - PATIENTS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR DES TRANSFUSIONS. HÉMOPHILES, DIALYSÉS, INSUFFISANTS RÉNAUX.
 - OBLIGATOIRE POUR LE PERSONNEL DE SANTÉ.
 - LE VACCIN PROTÈGE DURANT 5 ANS (VOIR PLUS).

- **NATURE DU VACCIN :** A BASE D'AG HBS RECOMBINANT : IL COMPREND L'AG HBS PURIFIÉ OBTENU PAR CLONAGE ET EXPRESSION DU GÈNE VIRAL DANS DES CELLULES COMME CHO (CELLULES OVARIENNES DE HAMSTER CHINOIS) OU SACCHAROMYCES (LEVURE DE BIÈRE). LE VACCIN CONTIENT LES PROTÉINES S ET PRÉ S.
- VACCIN ADMINISTRÉ PAR VOIE IM / SC
- **EFFETS INDÉSIRABLES :** DES ATTEINTES NEUROLOGIQUES DE TYPE SCLÉROSE EN PLAQUE ONT ÉTÉ SIGNALÉES DANS LES SEMAINES SUIVANT LA VACCINATION SANS QU'AUCUN LIEN DE CAUSALITÉ N'AIT PU ÊTRE ÉTABLI.
- **ECHECS VACCINAUX :**
 - MAUVAIS RÉPONDEURS 15% : INSUFFISANTS RÉNAUX, ALCOOLIQUES OU FACTEURS GÉNÉTIQUE.
 - VIRUS MUTANTS : (MUTATION DANS LE DÉTERMINANT A DU GÈNE S). LES SUJETS S'INFECTENT MALGRÉ LA PRÉSENCE D'AC ANTI HBS CE QUI POSERAIT UN PROBLÈME DE COUVERTURE VACCINALE.

2) VACCIN CONTRE L'HEPATITE A (HAVRIX)

- 2 INJECTIONS À 6 OU 12 MOIS D'INTERVALLE (ADULTE), CONFÈRE UNE PROTECTION DE 20 ANS.
- 2 INJECTIONS À L'ÂGE D'UN AN À 1 MOIS D'INTERVALLE (ENFANT), RAPPEL APRÈS 6 À 12 MOIS.
- INDIQUÉ À PARTIR DE L'ÂGE DE 1 AN (VOYAGE EN ZONE D'ENDÉMIE, INSTITUTIONS, HÉMOPHILES, HANDICAPÉS, PROFESSIONNELS EXPOSÉS (CRÈCHES, INTERNAT, ÉGOUTIERS) ET HÉPATHOPATHIES CHRONIQUES)
- CONTRES INDICATIONS : ALLERGIE À L'ALBUMINE.

3) VACCIN DE L'ENCEPHALITE JAPONAISE :

- 3 DOSES À J1, J7 ET J30. ENTRE 1 ET 3 ANS.
- CONTRES INDICATIONS : FEMME ENCEINTE, HYPERSENSIBILITÉ AUX PROTÉINES MURINES.
- EFFETS SECONDAIRES : RÉACTIONS D'HYPERSENSIBILITÉ.