


Multiplication des virus

PR. L .BECHIR

Faculté de Médecine de
CONSTANTINE







INTRODUCTION


- L'étude des étapes de la multiplication virale est indispensable pour :
- • comprendre la pathogenèse des infections virales
- • mettre au point de nouveaux médicaments antiviraux
- L'étude de la X virale intérêt en sciences fondamentales

1-CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA MULTIPLICATION D'UN VIRUS :

- Leur simplicité extrême empêche les virus de se multiplier, du moins par eux-mêmes.
- Se multiplier pour un être vivant est reproduire un édifice fait d'un enchevêtrement de macromolécules qui est à la fois très complexe et très précis, très organisé. Pour réussir un tel édifice, il faut quatre sortes d'éléments.
- 1) Un plan de travail : c'est l'information génétique. Le virus a cette information dans son génome : c'est la séquence des bases de son génome, DNA ou RNA.


- 
- 2) La matière première : en biologie, de petites molécules, acides aminés, acides gras, molécules organiques simples, sels minéraux. Le virus qui doit se multiplier n'a pas de réserves de petites molécules. Pas de vacuoles, pas de système digestif, même primitif, qui lui permettrait de puiser ces composants dans le milieu extérieur

- 
- 3) Autre élément manquant au virus : des sources d'énergie. Toute édification consomme de l'énergie. En biologie, c'est très souvent l'énergie libérée par hydrolyse de composés tels que l'ATP. Le virus n'a pas de réserve d'ATP ni les moyens d'en constituer ; il n'a aucune source d'énergie propre.
 - 4) Enfin, un élément manque encore au virus : l'assemblage des petites molécules en macromolécules exige des enzymes. Sans enzymes, les assemblages ne se feraient pas.

- 
- Donc, la multiplication d'un virus consiste en l'introduction du génome viral dans une cellule et c'est elle qui va fabriquer de nouveaux virus, selon un procédé de biosynthèse que l'on appelle réplication.

- Le virus apporte seulement l'information génétique nécessaire à la fabrication de nouveaux virus et détourne les voies métaboliques de la cellule à son profit.
- Pour qu'il se multiplie le virus doit infecter une cellule (Le spectre d'hôte est défini par l'espèce et le tissu cellulaire infecté)

Le spectre d'hôte



Hôte non suceptible


Hôtes suceptibles

Les cellules peuvent être:

- Résistantes.
- Non permissive.
- Permissives: Infection aigue, latentes, persistante ou transformante.
- Cellules résistantes:
Cellule dépourvue de récepteurs nécessaires a la fixation du virus

Interactions virus/cellules

Définitions :



Cellule résistante


- Cellules non permissives : Le virus pénètre dans la cellule mais quelques gènes seulement s'expriment sans aboutir à un cycle complet (infection abortive)

La cellule peut:

- Soit survivre à l'infection sans montrer de trace d'infection.
- Soit mourir sans produire de virions

Interactions virus/cellules

Définitions :



Cellule non permissive
Infection abortive

Cellule redevient normale


- Cellule permissive :

L'infection cellulaire aboutie a la formation de nouveaux virus. dans ce cas on peut avoir :

- Une infection aigue.

Interactions virus/cellules

Définitions :



Cellule permissive
Infection productive de
virions

- Des infections latentes :


La primo-infection guérit et le virus reste cache, il se réactive lors d'un stimulus. Exp : Herpes virus

- Des infection persistante ou transformantes:

Lorsque la cellule n'est que transitoirement permissive, ceci abouti à une persistance virale: présence continue du génome viral, avec expression de quelques gènes viraux. Exp: **HBV, HBC.**

Interactions virus/cellules

Définitions :






Cycle de multiplication

Le cycle de réplication virale se décompose

en 6 étapes:

1. **Attachement:** du virus sur des récepteurs de la membrane cellulaire
2. **pénétration:** endocytose, fusion
3. **Décapsidation:** et **libération du génome** viral
4. **réplication:** transcription et traduction des protéines précoces de régulation; synthèse des acides nucléiques viraux; production des protéines virales tardives structurales
5. **assemblage** et **maturation** des nouveaux virus
6. **Libération:** des virions néoformés

Les différentes étapes du cycle de réplication



A) ATTACHEMENT: Adsorption


Ø passif (énergie non nécessaire)

- Nécessite l'interaction entre :

Un **ligand viral** et un **récepteur** spécifique de la membrane cellulaire.

- Si récepteur absent  cellule résistante à l'infection.

Le ligand des virus nu :
conformation
particulière des protéines de capside.
Pour les virus enveloppe :
Glycoprotéines d'enveloppe.
Les structures d'attachement de
certains virus sont bien caractérisées:
Hémagglutinine du virus grippal.

- 
- Récepteurs de virus spécifiques
 - • molécules CD4 lymphocytes T/gp120 (HIV)
 - acide sialique (virus influenza)

Attachement réversible au début puis devient irréversible, il est indépendant de la température.

B)-PENETRATION :

Ø actif (nécessite l'énergie)

Il diffère selon les virus

● → Virus nu:


a)- Passage a travers la membrane cellulaire (translocation). ou

b)- Endocytose avec accumulation du virus a l'intérieur de vacuoles cytoplasmiques, une libération de la capside virale dans le cytoplasme de la cellule.

Pénétration et décapsidation

1- Translocation


2- Endocytose / pinocytose



Virus non enveloppés

- Virus enveloppé :
- Fusion de la membrane cellulaire et de l'enveloppe virale le virus pénètre sous forme de nucléocapside.
- Soit par Endocytose. (Une acidification du virus au sein de l'endosome est induite par une pompe à protons (ex : protéine M2 pour le virus influenza type A).


Pénétration et décapsidation




PENETRATION

Virus nu

Translocation




Endocytose




Virus enveloppé

antirécepteur


protéine de fusion




Fusion/Lyse



Endocytose



Fusion/Lyse




cytoplasme

C)-LA DECAPSIDATION :

généralement cytoplasmique

Désagrégation de la capside virale (totale ou partielle) grâce à des enzymes cellulaires ou virales

Libération de l'acide nucléique dans le cytoplasme.



D)- LA REPLICATION :

Le virus doit:


- **Transcrire** (fabriquer un ARNm à partir de son génome).
- **Traduire son information génétique** (fabriquer des protéines virales par la machinerie cellulaire)
- **Répliquer** (fabriquer des copies de son génome par la cellule)

Transcription


ADN génomique


Transcriptase

ARNm



Traduction





Le mécanisme de la réplication varie selon qu'il s'agit d'un virus à **ADN** ou **ARN**.

Seuls les virus à ADN dont la réplication est intranucléaire peuvent utiliser les enzymes cellulaires pour la transcription.

Les autres virus doivent posséder leurs propres enzymes (ex : poxvirus qui ont une réplication cytoplasmique, virus à ADN).

VIRUS A ADN

1/- Les virus à ADN double brin suivent des mécanismes de multiplication qui se rapprochent de ceux observés pour les gènes cellulaires (selon un mode semi-conservatif)

HERPES VIRUS


L'**ADN** viral migre vers le noyau ou la répllication se déroule en **3 phases**

1- Phase précoce: une petite partie du génome est transcrite grâce à une ARN polymérase-ADN dépendante cellulaire en ARNm précoce qui migre dans le cytoplasme pour être traduits en protéines précoces non structurales (**régulatrices ou en enzymes impliquées dans la synthèse de l'ADN**)


2- Réplication: l'**ADN** viral est dupliqué grâce à une **ADN polymérase** en un grand nombre de copies selon un mode semi-conservatif.

3- Phase tardive: Les **ADN** néoformés servent de matrice pour une 2ème transcription synthèse d'**ARNm** tardifs traduits en protéines de structure.

Réplication de l'HSV



CYCLE REPLICATIF DE L'HBV




VIRUS A ARN

La réplication a lieu dans le cytoplasme, on a 3 groupes :

- Virus dont l'ARN viral est de polarité (+) (5' - 3'):

C-à-d même sens que l'ARNm peut être lu directement par les ribosomes cellulaires.


ARN (+)  Traduction

- 
- Le RNA purifié est directement infectieux
 - Exemples : poliovirus, VHC,...

Réplication des virus à ARN +

ARN +

Ribosomes




Protéines virales

- Le génome de polarité (+) est traduit directement en une grande polyprotéine qui est ensuite clivée pour donner naissance à trois protéines P1, P2 et P3.
- Maturation de ces protéines virales.
 - ✓ La protéine P1 (donne les protéines de capsid).

✓ Les régions **P2** et **P3** (donne les protéines non structurales dont l'ARN polymérase-ARN dépendante ou réplicase).

- La réplicase va synthétiser un brin (-).
- Le brin (-) va servir à la synthèse de nouveaux brins (+) toujours grâce à la réplicase.
- Ces nouveaux brins (+) vont être encapsidés afin de former de nouveaux virions.

- **Virus à ARN de polarité (-) :** Le virus possède une transcriptase virale qui permet la synthèse d'un **ARN (+)** seul capable d'être lu par la cellule.

ARN (-) transcriptase 
ARN (+)  Traduction.

Réplication des virus à ARN -

ARN génomique (-)


(-)




(+)

ARN complémentaire (+)


Transcriptase




Polyribosomes




Protéines virales

- 
- Le RNA purifié est non infectieux
 - • Le virion doit contenir une transcriptase (RNA polymérase RNA dépendante)
 - • Exemples : virus de la grippe, ..


MULTIPLICATION DE VIRUS DE LA GRIPPE




CYCLE DE MULTIPLICATION DES RHABDOVIRIDAE



- Virus à ARN doit être préalablement transcrit en une copie d'ADN proviral grâce à une transcriptase inverse, pour se répliquer.



Réplication du VIH



**Le cycle
du VIH**



- ✓ L'**ARN** viral est **rétrotranscrit** dans le cytoplasme en **ADN** par la **transcriptase inverse virale (TI)**.
- ✓ La **TI** **dégrade** l'**ARN** viral puis copie l'**ADN** viral monocaténaire en **ADN double brin** qui **s'intègre** dans le **noyau cellulaire**, grâce à **l'intégrase virale**, (**ADN proviral**)

- √S'il y a activation de la cellule, l'ADN proviral est transcrit en **ARN messagers** et en **ARN génomique** par l'appareillage de transcription de la cellule.
- √La traduction d'ARNm donne naissance à des **polyprotéines virales**.
- √Assemblage des **protéines virales** et de **molécules d'ARN viral**

VIRUS A ARN BICATENAIRE (Riovirus)

- La transcription est asymétrique, un seul des ARN génomique est copié.
- Il ya production de protéines virales qui vont s'associer en particule et à partir de ce brin est copié le 2^e brin.

La réplication du génome des virus à ARN est beaucoup moins fidèle que celle du génome des virus à ADN (les ARN polymérases n'ayant pas les mécanismes de détection et correction d'erreurs qu'ont les ADN polymérases des virus à ADN).


Les virus à ARN sont donc sujets à des variations génétiques (HIV, virus de l'hépatite C).

D)- ASSEMBLAGE DES VIRUS :


- Correspond à l'assemblage des protéines de structure, l'incorporation du génome dans la pro capside, la maturation des protéines par clivage protéolytique ou modification de conformation, exemples :
 - clivage de l'hémagglutinine du virus grippal par protéases cellulaires
 - clivage de la poly protéine du poliovirus par des protéases virales ou cellulaires
 - clivage des protéines gag et pol du HIV par protéases virales

Auto assemblage des composés
fabriqués :

Protéines de capsid + A.nucléique
= nucléocapside



Maturation

- 
- Maturation des proteines gag et pol du HIV
 - Les protéases virales sont la cible d'antiviraux = les antiprotéases (ex : Ritonavir,..)
 - La protéase du VHC est la cible d'antiviraux: boceprevir, telaprevir,..

Génome viral

Nucléocapside

Enveloppe

Maturation

Libération

Bourgeonnement


Protéines
cellulaires

Glycoprotéines


Membrane
cellulaire

Nucléoprotéines

Génome viral




ASSEMBLAGE ET MATURATION DES VIRUS




E)-LIBERATION DES VIRUS :

- Virus nu: Par **éclatement** de la cellule.
- Virus enveloppé: Par **bourgeonnement** à travers la membrane cellulaire.
- Certains virus s'entourent d'une enveloppe provenant de la **membrane nucléaire** de la cellule infectée (**Herpesvirus**), d'autres s'entourent d'une enveloppe provenant de la **membrane cytoplasmique** de la cellule (**Rétrovirus**)

- 
- Bourgeonnement à partir: • de la membrane plasmique (HIV, virus de la grippe) • de la membrane de l'appareil de Golgi (coronavirus,..) • de la membrane interne du noyau (HSV,..)
 - Lyse cellulaire : virus nus
 - Libération / v. grippal : Action des antiviraux

LIBERATION DES VIRUS


Lyse cellulaire



Action toxique
de composants
structuraux


cytoplasme

Bourgeonnement cytoplasmique




Interaction des
protéines de capside
avec les protéines
virales d'enveloppe,
effet cytolitique
variable

Bourgeonnement nucléaire (ex : les Herpes Virus)



noyau

- **Virus complets**: Une fois à l'extérieur de la cellule, peuvent à leur tours infecter d'autres cellules.
- Une cellule produit **100 à 1000 virus**.




LES INTERACTIONS VIRUS-CELLULES

- 1/- Infection lytique productive: La multiplication virale dans la cellule entraîne une perturbation des synthèses cellulaires ce qui aboutit à **sa mort** ou à une **altération de ses structures** (effet cytopatique = ECP)


- 2/- Infection tempérée: La cellule **peut tolérer l'infection**, le génome viral et celui de la cellule se partagent le potentiel de synthèse.

CULTURES CELLULAIRES


Cellules épithéliales




Cellules
fibroblastiques



ECP: SYNCYCIUM (virus de la rougeole)



Effet Cytopatique = **SYNCYCIUM**



3/- Infection transformante:

- Intégration du génome viral dans le génome de cellule parasitée
- Modification de la cellule peut se transformer en cellule maligne.

Le temps du cycle de multiplication varie de: 8 h (poliovirus) à 50 h (herpes virus)



MERCI POUR VOTRE
ATTENTION