

Madame L. A âgée de 44 ans 1.50 m 67 Kg est diabétique sous insuline semi lente (Monotar M.C Novo) depuis 17 ans sans antécédent atopique familial connu mais => allergie aux sulfamides hypoglycémiants lors du 1^{er} traitement de son diabète.

L'apparition d'un furoncle à l'index droit le 02/02/2021, → oxacilline 2 gélules à 500 mg. deux fois par jour pendant 10 jours.

Le 15/02/2021, trois jours après l'arrêt de l'oxacilline, elle passe à une insuline semi-lente humaine biogénique protaminée (Insuline NPH Lilly).

6 heures après chaque administration de cette insuline, il y'a apparition au niveau de chaque point d'injection de lésions d'angioœdème avec induration locale et prurit.

Régression partielle / trt par la prométhazine.

- Patient âgé de 45 ans;
- Qui prend en automédication du Brexin® (piroxicam 20 mg) 1cp/j pour des lombalgies
- À J10 du traitement le patient présente des douleurs épigastriques violentes avec des hématomèses de faible abondance;
- Fibroscopie OGD, montre une pangastrite
- Biopsie : Helicobacter Pylori +++



Conduite à tenir :

- Arrêt du Brexin
- Omeprazole 20 mg/j pdt 15 j
- Amox + Metronidazole pdt 07 j puis Clarithromycine pdt 07 j

Évolution clinique favorable

Fibroscopie après 6 semaines : muqueuse gast sans anomalies

Description de la réaction indésirable

Traitement de la réaction :

Date et durée de l'effet	Gravité	Evolution	Gradation
Date de survenue : / /	☐ Hospitalisation ou prolongation d'hospitalisation	☐ Guérison sans séquelle	Type de grade :
Durée de l'effet :	☐ Incapacité ou invalidité permanente	☐ Guérison avec séquelle	Précisez l'échelle utilisée :
	☐ Mise en jeu du pronostic vital	☐ Décès dû à l'effet	
	☐ Décès	☐ Décès sans rapport avec l'effet	
		☐ Sujet non rétabli	
		☐ Inconnue	

Un ou des produits ont -ils été arrêtés ?

Non ☐ oui ☐ le(s)quel(s) :

Un ou des produits ont - ils été réintroduits ?

Non ☐ oui ☐ le(s)quel(s) :

Service d'Oncologie Médicale

Pr FILLALI

FICHE DE DÉCLARATION DES EFFETS
INDÉSIRABLES

Patient

Nom : Prénom : Sexe : F ☐ M ☐	Age : Poids : Taille :	N° dossier : Adresse : N° Tel :	Localisation /type de protocole
Antécédents /comorbidité :			

Notificateur

Nom et prénom : Médecin ☐ Pharmacien ☐ Infirmier ☐ Service :	Email : Cachet et signature : Date de déclaration :
---	---

Médicament

Nom commercial ou DCI	Posologie et voie d'administration	Date de début de prise	Date de fin de prise	Nom du fabricant et N° lot	Indication

Imputabilité intrinsèque

```
graph TD; A[Imputabilité intrinsèque] --> B[Chronologique]; A --> C[Sémiologique];
```

Chronologique

- Délai d'apparition
- Évolution de l'effet
- Notion de Ré administration

Sémiologique

ADMINISTRATION DU MEDICAMENT	Délai d'apparition de l'effet					
	Très suggestif ou Suggestif			Compatible		Incompatible
	Ré administration					
Évolution de l'effet	R(+)	R(0)	R(-)	R(+)	R(0)	R(-)
« suggestive » : régression de l'effet à l'arrêt du médicament avec ou sans traitement symptomatique (avec un recul suffisant et en prenant en compte les caractéristiques pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques du médicament) ou lors de la diminution de posologie pour un effet dose-dépendant.	C3	C3	C1	C3	C2	C1
« non concluante » : - lésions irréversibles ou décès - évolution inconnue - recul insuffisant après l'arrêt du médicament - persistance de l'effet et médicament non arrêté - persistance de l'effet après administration unique	C3	C2	C1	C3	C1	C1
« non suggestive » : - absence de régression de manifestations de type réversible malgré l'arrêt avec un recul suffisant - régression complète malgré la poursuite du médicament	C1	C1	C1	C1	C1	C1

C0

Imputabilité intrinsèque

```
graph TD; A[Imputabilité intrinsèque] --> B[Chronologique]; A --> C[Sémiologique];
```

Chronologique

Sémiologique

- Symptomatologie clinique et paraclinique évocatrice

- Autres causes non médicamenteuses

- Examens spécifiques

Sémiologie clinique et paraclinique

**Evocatrice* du rôle de
ce médicament
ET
facteur favorisant bien
validé du couple
effet indésirable/
médicament**

**Evocatrice* du rôle de
ce médicament
ET/OU
facteur favorisant bien
validé du couple
effet indésirable/
médicament**

**Ni sémiologie
évocatrice* du rôle de
ce médicament ni
facteur favorisant
bien validé**

* évocatrice en raison :

des propriétés pharmacologiques du médicament,
de signes évocateurs d'un syndrome de sevrage,
~~de la localisation des effets observés~~

Examens complémentaires

indésirable/médicament ou réponse à un antidote spécifique

**Autres causes
mon
médicamenteuse
s**

**Absente après bilan
approprié**

**Non recherchée
(ou bilan incomplet)**

Présente

L(+)	L(0)	L(-)	L(+)	L(0)	L(-)	L(+)	L(0)	L(-)
S3	S3	S2	S3	S3	S1	S3	S2	S1
S3	S3	S1	S3	S2	S1	S3	S1	S1
S2	S2	S1	S2	S1	S1	S1	S1	S0

Imputabilité intrinsèque

COMBINAISON DES SCORES CHRONOLOGIQUE ET SÉMIOLOGIQUE	SCORE D'IMPUTABILITÉ INTRINSÈQUE
C0 ou S0	I 0
C1S1	I 1
C1S2	I 2
C2S1	I 2
C2S2	I 3
C1S3	I 4
C3S1	I 4
C2S3	I 5
C3S2	I 5
C3S3	I 6