




Les bases du raisonnement clinique (1)

Pr HLNS DEBBACHE

« Medicine is a science of uncertainty and an art of probability » Sir W.Osler

« Clinical Reasoning (CR) helps minimize and manage uncertainty in the context of medical practice. Croskerry.P

Objectifs pédagogiques

1. Analyser les données de l'anamnèse et de l'examen physique
2. Regrouper les données de l'anamnèse et de l'examen physique en syndrome(s) afin de dégager des hypothèses diagnostiques

Table des matières

I. Définition du concept	2
II.Raisonnement clinique : un pilier de la formation et de la pratique médicale	2
III. Types de raisonnement en sciences de la santé	2
A.Non Analytique : automatique .Intuitif. Spontané : Tableau typique-Image.....	2
B.Analytique : « réflexif », ou encore, « rationnel ».	3
IV. Les étapes du processus de raisonnement clinique	3
V. Conclusion : Points essentiels	7
Références bibliographiques	7

I. Définition du concept

Le raisonnement clinique est un processus de pensée et de prise de décision qui interpelle les connaissances acquises afin d'effectuer l'action jugée la plus appropriée dans un contexte spécifique de résolution de problème de santé.

Le raisonnement clinique est une compétence. La compétence est un savoir agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficaces d'une variété de ressources pour résoudre des problèmes. Le raisonnement clinique est présent partout tout au long de la démarche clinique. Il sert à prendre des décisions éclairées et à résoudre des problèmes dans un contexte de pratique clinique. Le raisonnement clinique est au cœur de l'expertise professionnelle. Reasonner efficacement permet en particulier de réduire les erreurs, dans un environnement de soins de plus en plus complexe et exigeant. Un raisonnement efficace est ainsi nécessaire pour identifier les problèmes des patients et intervenir de façon appropriée.

II. Raisonnement clinique : un pilier de la formation et de la pratique médicale

La connaissance médicale est la base d'un raisonnement clinique solide, mais la connaissance seule n'est pas suffisante!

- Le diagnostic est erroné 10 à 15% du temps. 85% des erreurs de diagnostic sont considérées comme évitables.
- Une erreur de diagnostic est plus susceptible d'entraîner des dégâts que les autres types d'erreur.
- Les deux tiers (2/3) des causes des erreurs de diagnostic impliquent des erreurs de raisonnement : Soit les données disponibles n'ont pas été collectées de manière adéquate, soit le plus souvent disponibles mais pas correctement synthétisées.
- L'enseignement du raisonnement clinique est un défi de taille qui est d'une grande actualité pour les cliniciens enseignants et 10% des étudiants en médecine rencontrent des difficultés majeures de raisonnement clinique dans leur cursus académique.
- The Shock of Practice : The Effects on Clinical Reasoning : transition de l'apprentissage théorique à l'apprentissage pratique aux stages.
- L'utilisation de stratégies et de méthodes innovantes efficaces est cruciale pour l'enseignement et le développement du raisonnement clinique.

III. Types de raisonnement en sciences de la santé

Il existe 2 systèmes utilisés pour raisonner: théorie du double processus : les systèmes analytique et non analytique intuitif sont conjointement impliqués dans la plupart de nos activités cognitives.

En fonction de la situation clinique, les différentes démarches de raisonnements utilisées sont:

A. Non Analytique : automatique. Intuitif. Spontané : Tableau typique-Image

Le raisonnement non analytique se base sur les connaissances expérientielles (expériences) du praticien : ça permet un regard global.

Ce type de raisonnement est mobilisé très précocement lors de la rencontre avec le patient, sans effort conscient de la part du soignant. Ce type repose sur la reconnaissance d'une forme typique, il permet de poser un diagnostic d'emblée en fonction d'un tableau type reconnu par le médecin. Il ne s'applique que dans une proportion très limitée de consultations et pour des tableaux cliniques évidents. Il recouvre la reconnaissance d'une image connue, comme un psoriasis ou une varicelle, ou celle d'un tableau type de grippe ou de colique néphrétique, des exemples concrets, qui désignent des situations cliniques vécues et restées gravées, stockées dans la mémoire à long terme. Il repose sur l'identification de ressemblances pour donner le diagnostic

intuitivement en quelques secondes sans réfléchir, il se voit chez les cliniciens d'expérience qui ont une base de données plus vaste : c'est le raisonnement par analogie. Cette démarche intuitive spontanée est souvent insuffisante en elle-même, elle peut être le point de départ de la démarche hypothético-déductive, à l'origine des hypothèses formulées par le médecin.

B. Analytique : « réflexif », ou encore, « rationnel »

Ce type de raisonnement est particulièrement exigeant sur le plan cognitif. Il repose sur l'analyse rigoureuse de la relation entre les données de l'anamnèse, les signes et symptômes en utilisant par exemple les scores cliniques (Score de Wells, score de Glasgow, score d'Apgar etc.).

Il existe 04 approches de type analytique :

1. Démarche analytique hypothético-déductive

Le praticien va évoquer toutes les hypothèses possibles puis au fur et à mesure et en suivant plusieurs étapes, il va en garder une. Dans le domaine du raisonnement clinique, l'approche analytique la plus courante, fortement utilisée en pratique et efficace est dénommée « processus hypothético-déductif ». Il s'agit de vérifier systématiquement des hypothèses (diagnostiques, d'évolution de l'état clinique, d'anomalies lors de la réalisation des soins, etc.) qui ont souvent été générées intuitivement, et de les faire évoluer en fonction de l'évaluation analytique de la situation. Le praticien cherche à confirmer ou redresser les hypothèses diagnostiques envisagées à travers les données récoltées à l'examen. La méthode hypothético-déductive est privilégiée et fondamentale dans la démarche diagnostique du médecin.

2. Démarche Internistique

L'approche est de réaliser un dossier d'évaluation exhaustif, de type internistique, nécessaire sans doute dans des situations d'exception, en ratissant large pour être sûr de ne rien manquer. Cette technique efficace, coûteuse en temps et en examens techniques complémentaires se veut, par définition, aussi peu intuitive que possible de manière à ne négliger aucune hypothèse. Elle offre la garantie de déboucher sur un diagnostic précis par élimination successive de toutes les causes possibles.

3. Utilisation d'algorithmes-Arbres décisionnels- Scores

Cette approche fait appel à un arbre de décision, ou algorithme, utilisant un cheminement de type binaire qui amène le médecin à poser un diagnostic par éliminations successives. Elle ne se révèle d'aucune utilité dans la prise en charge d'une situation complexe, car elle nécessiterait la mise en parallèle d'une dizaine d'arbres décisionnels indépendants les uns des autres. Cette démarche utilise aussi les scores, son but est d'optimiser le raisonnement clinique par une approche probabiliste. Suivant cette évolution, de plus en plus de scores cliniques (SC) ont été développés. (« EBM », evidence-based medicine).

4. Démarche inductive : déconseillée : explore toutes les hypothèses possibles même les plus rares, c'est l'approche typique du médecin débutant demandant de très nombreux examens complémentaires sans prioriser les hypothèses, il faut l'éviter, elle est coûteuse et dangereuse car vous allez peut être retenir des diagnostics erronés et vous tromper à cause des faux positifs.

IV. Les étapes du processus de raisonnement clinique

Le raisonnement clinique et ses processus constituent un phénomène hautement complexe. Il nécessite différentes compétences : connaissances, habiletés de communication pour le recueil des données, maîtrise de l'examen physique, capacité de prioriser, de gérer la consultation, etc. Il se fait dans un contexte clinique spécifique avec un patient, son histoire, sa façon d'être et de présenter ses symptômes, etc, dans un environnement spécifique avec ses caractéristiques et ses contraintes, chez un clinicien avec sa personnalité, son état d'esprit, son expérience personnelle et professionnelle.

Le processus de raisonnement clinique privilégié de base est un processus analytique hypothético-déductif qui implique l'activation des hypothèses : « Activer une hypothèse, c'est avoir accès aux connaissances qui y sont reliées ».

Les étapes :

1- Présentation du problème clinique par le patient :

§ La représentation initiale du problème est le point de départ du processus de raisonnement clinique

§ Dès les premiers instants, le clinicien procède à la caractérisation / la clarification de la plainte du patient

2- Génération d'hypothèse(s) diagnostiques. Hypothèses générées très tôt, 3 à 5 hypothèses à partir de la plainte du patient « symptôme »: anamnèse, de quelques signes à l'examen physique, et du contexte perçu. Il faut hiérarchiser les hypothèses par probabilité et fréquence. Il faut prioriser les hypothèses en évoquant « le scénario du pire ». Consultez des collègues et relisez la littérature médicale pertinente pour éclaircir les incertitudes.

3-Vérification d'hypothèses :

3a - Acquisition de données supplémentaires

3b - Interprétation des données

4 - Diagnostic final de présomption

5- Plan d'intervention.

A. Analyser les données de l'anamnèse et de l'examen physique

"Ecoutez attentivement le malade, il vous dit le diagnostic !" William Osler (1849-1919).

"Ne touchez pas le malade, notez d'abord ce que vous voyez ; développez votre sens de l'observation. "Sir William Osler (1849-1919).

Le diagnostic médical est l'art de reconnaître les maladies par leurs symptômes et par leurs signes et de les distinguer les unes des autres. L'anamnèse est une étape essentielle dans l'apprentissage au raisonnement clinique (ARC) que doit acquérir tout étudiant en médecine. Les signes, détectés objectivement par le médecin, sont essentiellement récoltés lors de l'examen clinique qui suit l'anamnèse. Ces deux approches, anamnèse et examen clinique, complémentaires, représentent les étapes de la séméiologie médicale et constituent les fondements de la démarche médicale globale. La première étape d'un diagnostic repose sur une anamnèse médicale performante. En effet, on estime qu'au cours de sa consultation, le praticien pose environ 50 % des diagnostics par l'anamnèse, 30 % par l'examen clinique et 20 % seulement grâce aux examens complémentaires. Un diagnostic précis permet de se faire une idée sur le pronostic et d'instaurer un traitement étiologique plutôt que simplement symptomatique. L'absence de temps consacré à l'anamnèse entraîne bien souvent des examens inutiles, coûteux et parfois dangereux. Une bonne anamnèse concrétise trois qualités essentielles attendues d'un médecin, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.

Au cours de l'anamnèse , il est important de :

1) Indiquer quels éléments anamnestiques vous paraissent particulièrement importants à pointer dans les antécédents du patient :

L'anamnèse systématique doit envisager successivement les antécédents familiaux et les antécédents personnels. Les antécédents familiaux sont surtout intéressants dans le cadre de maladies héréditaires, y compris complexes polygéniques. Les antécédents personnels (chirurgicaux, médicaux, gynécologiques, psychiatriques) constituent le socle médical sur lequel vient se greffer l'histoire récente. En première intention, le médecin doit faire l'hypothèse que la plainte actuelle pourrait être en relation avec un des antécédents du patient. Une fois cette éventualité rejetée, d'autres hypothèses diagnostiques doivent alors être évoquées. La recherche des antécédents peut s'organiser de façon différente selon le contexte, l'urgence, l'attitude du malade, etc. Quel que soit le point de départ, l'interrogatoire doit être aussi complet que possible, tout en ciblant bien l'objectif, a fortiori dans un contexte évoquant l'urgence (exemple : douleur thoracique).

2) Indiquer quels éléments anamnestiques vous paraissent particulièrement importants à faire préciser concernant la plainte principale du patient :

Le questionnement doit se faire avec une suite logique et, dans un premier temps, se focaliser sur la plainte principale du patient : caractériser la plainte principale. Chaque question doit être sous-tendue par une arrière-pensée diagnostique. En posant la question, le praticien anticipe une réponse qui doit amener une autre question complémentaire sur le même sujet.

Il faut éviter de changer de thématique tant que l'on n'a pas le sentiment d'avoir épuisé le sujet (même si on peut toujours revenir plus tard sur ce symptôme s'il s'avère intéressant). Lors de l'interrogatoire, il faut éviter de passer sans cesse «du coq à l'âne», une erreur souvent rencontrée chez les étudiants en médecine débutant dans cet exercice difficile. En effet, cette absence de ligne de conduite risque d'égarer le praticien dans un dédale diagnostique, véritable labyrinthe duquel il aura toutes les difficultés de sortir avec une hypothèse valable dans un temps raisonnable. Exemple : La douleur est une des plaintes principales motivant la consultation médicale d'un malade. Il est indispensable d'en faire préciser toutes les caractéristiques sémiologiques pour orienter au mieux le diagnostic. Le tableau I résume les points essentiels à relever à l'anamnèse devant toute douleur, en particulier thoracique. Ainsi, il est important de faire préciser :

TABLEAU I. ÉLÉMENTS IMPORTANTS À RECUEILLIR À L'ANAMNÈSE
POUR CARACTÉRISER UNE DOULEUR

- Siège principal, irradiations éventuelles
- Type, genre
- Intensité, durée
- Moment d'apparition, horaire et évolution dans le temps
- Facteurs/positions qui favorisent ou soulagent
- Historique (douleur inaugurale ou récidive)
- Résolution, mode de terminaison
- Symptômes d'accompagnement

La simple caractérisation sémiologique précise de la douleur permet souvent au médecin de faire le diagnostic différentiel entre une douleur d'origine cardiaque, pleuropulmonaire, œsophagienne ou pariétale. La méthodologie d'interrogatoire minutieux, rappelée ici pour la caractérisation d'une douleur, peut être appliquée à d'autres plaintes, sources fréquentes de consultation médicale comme la fatigue, la fièvre, ...

3) Indiquer quels éléments connexes accompagnant éventuellement la douleur sont importants à rechercher à l'anamnèse :


Un symptôme est rarement isolé et le patient rapportera souvent des plaintes multiples. Une anamnèse performante devra faire le tri entre celles a priori banales, qui risquent de faire égarer le praticien dans son interprétation des faits, et celles qui, au contraire, sont particulièrement intéressantes pour faire progresser le diagnostic, parfois de façon déterminante. Les symptômes d'accompagnement peuvent précéder la plainte (exemple de plainte : la douleur), être concomitants ou survenir secondairement. Ils peuvent être très variés, mais souvent ils sont très instructifs pour l'orientation diagnostique. Par ailleurs, ils sont extrêmement utiles pour déterminer le caractère d'urgence à accorder à cette plainte (exemple : douleur), caractère qui sera généralement conforté par l'examen clinique (présence de signes évocateurs d'un état de choc, par exemple).

B. Regrouper les données de l'anamnèse et de l'examen physique en syndrome afin de dégager des hypothèses diagnostiques

1) Indiquer comment interpréter correctement la survenue simultanée ou séquentielle de deux événements : Lorsque deux événements surviennent de façon simultanée, il peut certes s'agir d'une pure coïncidence qui doit toujours être considérée comme possible (Figure 1). Cependant, la démarche diagnostique doit, en première intention et selon toute logique, évoquer une relation possible entre deux symptômes ou deux

événements survenant de façon quasi concomitante. De façon schématique, s'il existe bien une relation entre deux événements A et B (ce qui doit, bien entendu, encore être prouvé), celle-ci peut prendre trois orientations différentes :

L'événement A peut être responsable de la survenue de l'événement B ou l'événement B peut être à l'origine de l'événement A ou encore un autre événement C détermine la survenue quasi simultanée des événements A et B (Figure 1). Tout l'art de la démarche médicale consistera à relier les événements entre eux pour parvenir, aussi rapidement que possible, à un diagnostic de présomption, aussi précis et fiable que possible.



Méconnaître l'événement déclenchant, ou omettre d'évoquer la relation possible entre celui-ci et les plaintes ultérieures, risque d'exposer à la prescription d'un nombre, parfois important, d'examen complémentaires à la recherche, le plus souvent vaine, d'une cause.

Exemple : présence simultanée d'une ascite (événement A) et splénomégalie (événement B) chez un patient, peut s'expliquer par un syndrome d'hypertension portale (événement C).

2) Décrire ce qu'on appelle, dans l'anamnèse médicale, et l'examen physique une approche analytique et une approche syndromique :

L'anamnèse analytique est la technique de recueil des symptômes élémentaires selon une approche systématique. Elle peut être générale, recherchant tous les symptômes traduisant un dysfonctionnement de chacun des grands systèmes (cardiovasculaire, respiratoire, digestif, nerveux, ostéo-articulaire, endocrinien, ...) ou orientée, c'est-à-dire ciblée sur l'organe ou le système a priori impliqué dans la plainte principale. Pour gagner en efficacité, il est important de «contextualiser» l'approche (par exemple, orienter l'anamnèse en fonction de l'âge, du sexe, de circonstances particulières, ...).

L'examen physique rigoureux appareil par appareil ➡ Regrouper les symptômes et signes en éventuels syndromes: exemples:

- ✓ syndrome général, syndrome anémique,
- ✓ syndromes neurologiques,
- ✓ syndrome méningé,
- ✓ syndrome infectieux,
- ✓ syndrome hémorragique,
- ✓ syndrome tumoral,
- ✓ syndromes pleuraux,
- ✓ syndromes pulmonaires,

- ✓ syndromes bronchiques, syndromes médiastinaux, etc...

L'anamnèse et l'examen physique syndromiques est la stratégie visant à rassembler et intégrer les symptômes (et éventuellement les signes cliniques) pour aboutir à un syndrome qui finalement caractérisera une maladie plus ou moins complexe. Dans certains cas, l'orientation diagnostique restera hypothétique mais, dans d'autres, l'approche syndromique aboutira à une description caricaturale qui sera pathognomonique et donnera le diagnostic. L'approche syndromique, contrairement à l'approche analytique, est donc déjà un exercice d'interprétation des données recueillies. Elle réclame à la fois savoir et savoir-faire.

Le processus de raisonnement clinique doit les faire évoluer, plus ou moins rapidement, d'une approche analytique stricte vers une approche syndromique, la seule véritablement performante sur le plan diagnostique. Une anamnèse performante, et un examen physique progressant d'une démarche analytique vers une approche syndromique, allient savoir, savoir-faire et savoir-être.

C. La présomption diagnostique : se fonde, d'une part, sur des données épidémiologiques (en privilégiant les diagnostics les plus fréquents en première intention), d'autre part, sur l'histoire clinique du patient (en analysant les symptômes par regroupement évocateur). A partir de l'anamnèse l'approche est analytique, puis rapidement devient syndromique pour aboutir à une proposition diagnostique.

V. Conclusion : Points essentiels

- Le raisonnement clinique constitue un élément fondamentalement important de la pratique médicale : c'est une compétence majeure.
- Le raisonnement clinique désigne l'habileté du soignant à évaluer les problèmes ou les besoins d'un patient, et à analyser les données afin d'identifier avec justesse ces problèmes et de les cerner dans l'environnement du patient. L'approche analytique la plus courante, fortement utilisée en pratique et efficace est le « processus hypothético-déductif ».
- L'enseignement du raisonnement clinique est un défi nécessitant l'utilisation de stratégies et méthodes innovantes par les enseignants.
- Raisonner implique la mobilisation de processus intuitifs et analytiques (des connaissances).
- Selon que les cas cliniques sont habituels ou non, simples ou complexes, le clinicien active et emploie différentes stratégies pour résoudre le problème.
- L'analyse des données de l'anamnèse et de l'examen physique est une étape capitale dans le raisonnement clinique visant à pointer les éléments importants pour avancer dans les hypothèses diagnostiques.
- La démarche purement analytique doit se muer en une démarche syndromique, associant plusieurs symptômes, beaucoup plus enrichissante pour faire progresser le diagnostic : c'est une étape fondamentale dans la démarche diagnostique.

Références bibliographiques

1. Dominique Pestiaux, Carl Vanwelde, Suzanne Laurin et Marie-Claude Audétat. Raisonnement clinique et décision médicale. Le Médecin du Québec, volume 45, numéro 5, mai 2010
2. Charlin B., Tardif J., Boshuizen H.P. Scripts and medical diagnostic knowledge: Theory and applications for clinical reasoning instruction and research. Acad Med 2000 ;75 : 182-190.
3. Higgs J., Jones M.A. Clinical decision making and multiple problem spaces. In : Higgs J., Jones M.A., Loftus S. et al., Eds. Clinical reasoning in the health professions. Oxford, Butterworth-Heinemann 2008 : 3-18.

4. Debbache, H. S. L. N., Roula, D., & Audetat, M.-C. (2025). Qualitative Descriptive Analysis of Clinical Case Presentations: A Pilot Study on the Importance of Moving from Intuition to Educational Action in Supervision. *Creative Education*, 16(02), 180–197. <https://doi.org/10.4236/ce.2025.162011>
5. Debbache, H. S. L. N. .Les bases du raisonnement clinique.<https://facmed.univ-constantine3.dz/wp-content/uploads/2023/10/LES-BASES-DU-RAISONNEMENT-CLINIQUE-Octobre2023.pdf>
6. Schwartz A., Elstein A.S. Clinical reasoning in medicine. In : Higgs J., Jones M.A., Loftus S. et al., Eds. Clinical reasoning in the health professions. Oxford, Butterworth-Heinemann 2008 : 223-234.
7. Pelaccia T., Tardif J, Tribby E. et al. An analysis of clinical reasoning through a recentand comprehensive approach: The dual-process theory. Med Educ Online 2011.
8. Croskerry P. A universal model of diagnostic reasoning. Acad Med 2009;84:1022-8.
9. Barbara Bates .Guide de l'examen clinique .Editions Arnette.John Libbey Eurotext,Paris ,2014,7^{ème} édition française.

