




Troubles de la Conscience


Dr M.S. Djebaili
Maître Assistant Médecine Interne

Introduction

- Le système nerveux est le système le plus complexe du corps humain : il permet à la fois la réception, l'analyse et le traitement des informations sensorielles, ainsi que l'élaboration des réactions à ces stimulations. Enfin, il coordonne les activités des autres systèmes du corps. Une personne pleinement consciente est donc éveillée, attentive et consciente de son environnement.
- Le sommeil est un état normal de diminution de la conscience, réversible à tout moment.
- En cas d'inconscience, une personne peut perdre tout contrôle musculaire et, si elle est allongée sur le dos, s'étouffer suite à l'obstruction de ses voies respiratoires par sa propre langue


A - LES PERTES DE CONNAISSANCE BRÈVES :

- Deux mécanismes peuvent être en cause :
 1. Une anoxie cérébrale : qui entraîne une paralysie neuronale, d'où perte de connaissance.
 2. Une décharge neuronale hypersynchrone : qui a pour conséquence une perte de connaissance épileptique



Les différents types de pertes de connaissance brèves :

1. Les syncopes : la syncope est une perte complète de la conscience brusque et passagère, liée à une anoxie cérébrale.
- Etude sémiologique : la syncope est un accident subit, qui s'accompagne d'une chute sur le sol ; elle est parfois précédée de prodromes : malaise avec pâleur, sueur, nausée, troubles sensoriels.
- Causes:
 - a) Causes cardiaques: la syncope d'Adams-Stokes, le rétrécissement aortique
 - b) Causes extra-cardiaques: la syncope peut être due à une hypotension orthostatique

- 
2. Les lipothymies : la lipothymie est une perte incomplète de la conscience : il s'agit d'une simple obnubilation en rapport avec une hypoxie cérébrale
- Etude sémiologique : le mode de début de la lipothymie est progressif, il est marqué par une angoisse, des sueurs froides et des troubles sensoriels : bourdonnements d'oreille, impression de voile blanc devant les yeux, sensation d'éblouissement ou d'étourdissement.
3. L'épilepsie .

B / Coma

- Un coma traduit une **défaillance de la formation réticulée activatrice ascendante (FRAA) du tronc cérébral qui constitue le support neurophysiologique de la vigilance**. Il peut apparaître d'emblée ou faire suite à une obnubilation ou à une stupeur.

Suppression du comportement de veille et des activités conscientes « Absence d'ouverture des yeux (spontanée et provoquée), absence de communication par le langage, absence de réponse aux ordres quelle que soit la stimulation en jeu »

Différent types de troubles de la conscience

Conscience normale



Eveil, vigilance, vie de relation, activité mentale sont non perturbés. C'est à dire que **l'orientation spatiale**, **l'attention**, les fonctions supérieures, la **mémoire ancienne et récente**, la structuration de la **pensée** et du **langage** sont non perturbées

L'obnubilation




C'est un état ressemblant à celui du sujet **en train de s'endormir**. Les stimulations auditives fortes et nociceptives éveillent très transitoirement et incomplètement le sujet obnubilé qui peut exécuter quelques consignes simples.

La confusion



C'est une démence passagère, avec **des troubles de la mémoire**, de **l'orientation temporospatiale**

A faint, stylized outline of a human brain is visible in the background. Two light blue arrows point from text boxes to specific areas of the brain. The first arrow points to the upper frontal region, and the second arrow points to the lower frontal region.


Le délire

Confusion associée à un **trouble du langage et de la pensée** avec état oppositionnel et craintif

La stupeur

Etat d'indifférence psychomotrice. Les réponses verbales font défaut mais le patient peut encore exécuter quelques consignes verbales élémentaires.
Etat de sommeil apparent

Le coma




Absence d'éveil ,
Absence de vie de relation
Absence de réaction adaptée à des stimuli externes
Absence de réaction adaptée à des besoins, Possible troubles neurovégétatifs (temps :cardiocirculatoire ,respiratoire ...)

Etat végétatif



Destruction des structures corticales
Absence de vie de relation et d'activité mentale
Persistance de l'éveil ,Persistance de l'activité du tronc cérébral
Possibilité de réagir à la douleur



Mort cérébrale

Destruction des structures du tronc cérébral

Abolition définitive de toutes les fonctions
végétatives

Nécessité d'une assistance respiratoire et
cardiocirculatoire

Objectifs pratiques

Connaissances requises

- Connaître la classification des comas selon les stades de gravité
- Citer les principales causes de coma non traumatique, leurs caractéristiques cliniques et les examens complémentaires permettant de les identifier
- Connaître les dispositions médico-légales concernant la mort cérébrale

Chez un malade réel ou simulé présentant un coma non traumatique

Evaluer la profondeur du coma en utilisant l'échelle de Glasgow

Conduire l'examen neurologique d'un malade comateux

Définir une stratégie des examens complémentaires

Définir une attitude thérapeutique de base

Anamnèse

- Interrogatoire de l'entourage
 - Antécédents
 - Mode de vie
 - Médicaments pris
 - Historique du coma
 - circonstances de découverte
 - mode d'installation
 - signes précédents le coma

Examen neurologique

- Réalisé lorsque les fonctions vitales sont stabilisées afin de déterminer la cause du coma et de définir son pronostic.
- **Plan d'examen d'un malade avec troubles de vigilance**
 - 1/ Relation verbale (langage, exécution des gestes)
 - 2/ Réactions d'éveil (ouverture des yeux selon les stimuli)
 - 3/ Tonus musculaire (membres, nuque, paupières)
 - 4/ Mimique ou grimace à la douleur
 - 5 / Réactivité motrice (aspect, répartition)
 - 6/ Réflexes tendineux et cutanés plantaires
 - 7 /Clignement à la menace et réflexe de clignement (cornéen, fronto-orbiculaire)
 - 7/ Diamètre des pupilles, réflexe photo moteur
 - 8/ Position et mouvements des globes oculaires, réflexes oculomoteurs
 - 9/ Respiration (fréquence, amplitude, rythme), réflexe de toux

EXAMEN CLINIQUE NEUROLOGIQUE

Vigilance

Réaction d'éveil

Comportement visuel

Motricité (membres et tête)

Spontanée

Calme

Agitation

Convulsions

Myoclonies

...

■ Réactivité motrice

- Appropriée

- Inappropriée

- Nulle

■ Tonus musculaire

■ ROT

■ Cutané plantaire

- (Syndrome méningé)

◆ Yeux

- ✓ Occlusion des yeux

- ✓ Clignements

 - menace

 - cornéen

 - fronto-orbculaire
photopalpébral

- Pupilles

 - ✓ taille ?

 - ✓ égales ?

- ✓ Photomoteur

- ✓ Mouvements oculaires

 - globes oculaires au repos

 - mouvements spontanés

 - mouvements réflexes

 - oculocéphaliques

PROFONDEUR DU COMA


Stade du coma:

éliminer +++ hypothermie, hypoglycémie, intoxication aux sédatifs

Stade	conscience	stimulus douloureux	Réflexe cornéen	autre
I = coma vigile	obnubilation	Réaction adaptée	normal	-
II = coma modéré	inconscient	Réaction adaptée	Diminué	-
III = coma profond	inconscient	Réaction inadaptée	aboli	Rigidité de décérébration
IV = coma dépassé	inconscient	Pas de réaction	aboli	Mort cérébrale, EEG plat, arrêt respiratoire, pas de fonction végétative

AUTRES SIGNES CLINIQUES A RECHERCHER

**Recherche de
convulsions**



Des mouvements de tout le corps anarchique
une perte d'urine ,une morsure de langue latéral ,
une grande fatigue après un malaise

**Recherche d'une
agitation**



Qui peut évoquer : une intoxication ,un AVC , une
hypoglycémie ,une douleur associée au coma, une
épilepsie non convulsivante

**Existe-t-il un syndrome
méningé**



Une nuque raide ,des vomissements , une
photophobie, des céphalées ,une fièvre , une attitude
en chien de fusil

**Signes de
focalisation**

Une perte du tonus , de la motricité volontaire d'un réflexe, de la sensibilité; recherche d' un signe de Babinski - une paralysie.

**engagement
cérébral**

- Mydriase unilatérale
- Myosis bilatéral
- Hypertonie du corps
- Troubles de la PA de la fréquence cardiaque

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- **Mutisme akinétique :**

Tableau identique à l'état végétatif

Aucune réactivité à la douleur

Atteinte probablement frontale bilatérale

- **Looked-in syndrome :**

Conscience normale

Paralysie membres inférieurs et supérieurs

Ouvre les yeux et les ferme


Atteinte anatomique au niveau du tronc cérébral
(protubérance)

- **Coma psychogène**

- **Hypersomnie**

EXAMENS COMPLEMENTAIRES

- **Biologiques**
 - **Systématiques**
 - **Glycémie +++**
 - Ionogramme, calcémie, phosphorémie, numération formule sanguine, plaquettes, CPK
 - Bilan hépatique et rénal
 - Hémostase, gaz du sang
 - **Selon le contexte**
 - Toxiques : HbCO ; opiacés ; alcool ; benzodiazépines ; ...
 - Osmolalité
 - Goutte épaisse
 - Hémocultures
- **Fond d'œil**
- **Ponction lombaire**
 - CI : HIC et signes de focalisation
 - méningite
 - (hémorragie méningée)




◆ Scanner +/- IRM

- HIC
- signes focaux
- coma inexpliqué
- traumatisme crânien
- hémorragie méningée
- AVC

◆ Électroencéphalogramme

CLASSIFICATION - ÉCHELLES

- Stades du coma
- Glasgow
- Glasgow-Liège
- RLS 85
- ...



	Quotation réponse motrice	Réponse verbale	Réponse oculaire
6	Sur ordre	-	-
5	Écarte stimulus douloureux	Réponse adaptée	-
4	Fuit stimulus douloureux	Réponse confuse	Ouverture spontanée
3	Réaction en décortication (Flexion lente des bras et extension des jambes)	Réponse inadaptée	Ouverture à la demande
2	Réaction en décérébration (Extension et rotation interne des bras)	Réponse incompréhensible	Ouverture à la douleur
1	Pas de réaction au stimulus	Aucune réponse verbale	Aucune ouverture

Interprétation

Total sur 15

13

8 à 10

≤ 7

stade

confusion

obnubilation stupeur

coma

Le COMA selon l'échelle de glasgow

Ouverture es yeux :
4= Spontané.
3=A la demande.
2=A la douleur.
1= Pas du tout.

Réponse Motrice:
6= Obéit.
5=Localise dl.
4=Evitement.
3=Décortication.
2=Décérébration.
1=Aucune.

Réponse verbale:
5=Claire, adapté.
4=Confuse.
3=Incohérente.
2=Incompréhens.
1= Pas du tout.

Coma si Glasgow = 3 à 7



Intubation


SCORE DE GLASGOW

SCORE DE LIEGE


OUVERTURE DES YEUX (4)	Spontanée	4
	Sur ordre	3
	A la douleur	2
	Aucune	1
REPONSE MOTRICE (6)	Sur ordre	6
	Chasse la douleur	5
	Retrait à la douleur	4
	Flexion stéréotypée à la douleur	3
	Extension stéréotypée à la douleur	2
	Aucune	1
REPONSE VERBALE (5)	Orientée	5
	Réponses confuses	4
	Mots inappropriés	3
	Mots incompréhensibles	2
	Aucune	1

Fronto-orbitaire	5
Oculo-céphalique vertical et Oculo-vestibulaire vertical	4
Photomoteur	3
Oculo-céphalique horizontal et Oculo-vestibulaire horizontal	2
Oculo-cardiaque	1
Rien	0

Causes des troubles de conscience



Causes des troubles de conscience



**MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION**

