

LES MUSCLES PEACIERS

I-INTRODUCTION

Les muscles peauciers possèdent un certain nombre de caractères communs:

- Tous les muscles peauciers sont innervés par le nerf facial.
- Ils présentent dans leur forme typique, une insertion fixe souvent osseuse et une insertion cutanée mobile sur la face profonde de la peau, qu'ils mobilisent.
- Ce sont les muscles de la mimique, responsables de l'expression du visage.

II- CLASSIFICATION

Les muscles peauciers de la face et du cou se répartissent en six groupes :

- Les muscles annexés au scalp
- Les muscles annexés à l'auricule
- Les muscles annexés à l'orifice orbitaire
- Les muscles annexés au nez et aux sourcils
- Les muscles annexés aux lèvres
- Le muscle annexé au cou

1- LES MUSCLES ANNEXES AU SCALP

a-Le muscle occipito-frontal

C'est un muscle digastrique dont la partie intermédiaire est constitué par la galéa. Il est médian et formé de deux ventres frontal et occipital séparés par la galéa aponévrotique. **Action :** Mobilise le cuir chevelu dans le sens antéro-postérieur, élévation des sourcils, plissement du front. Est un muscle de l'attention, et la surprise.

2-LES MUSCLES ANNEXES A L'AURICULE

En fait, chez l'homme, ces muscles sont très peu actifs. Chez l'animal, leur action permet de fermer, d'ouvrir ou d'orienter l'auricule.

Ce groupe est constitué de trois muscles pairs et symétriques:

- Le muscle auriculaire antérieur.
- Le muscle auriculaire postérieur.
- Le muscle auriculaire supérieur.

3-LES MUSCLES ANNEXES A L'ORIFICE ORBITAIRE

a-Orbiculaire de l'œil

C'est un muscle plat, disposé en ellipse à grand axe transversal autour de la fente palpébrale.

On distingue dans chaque orbiculaire trois portion fonctionnellement bien différente:

- La portion palpébrale : dans les paupières.
- La portion orbitaire : entoure l'arcade orbitaire en dehors des paupières.
- La portion lacrymale, elle a pour origine la crête lacrymale postérieure de l'os lacrymal.

Action : Il est responsable de la fermeture de l'œil. La portion lacrymale se contracte vidant le sac lacrymal et favorise l'écoulement des larmes.

4-LES MUSCLES ANNEXES AU NEZ ET AUX SOURCILS

Certains des muscles annexés au nez et aux sourcils participent aussi à la protection du globe oculaire comme les corrugateur, l'abaisseur du sourcil et le procerus. Les autres agissent sur l'orifice narinaire.

a-Corrugateur du sourcil

Ce muscle s'insère en bas sur l'extrémité médiale de l'arcade sourcilière, Il se termine sur la face profonde de la peau de la moitié interne du sourcil.

Action : Il fronce les sourcils en les rapprochant et en déterminant des rides verticales inter sourcilières. Expression caractéristique de la douleur, de l'impatience et de la colère.


b- Procerus

Les muscles peauciers. Pr Benleghib N

L'insertion fixe se réalise sur le cartilage latéral du nez et sur les os nasaux dans leurs extrémités inférieures et internes. L'insertion mobile concerne les téguments en regard de la glabella.

Action : Il abaisse la région intersourciliaire. Provoque une mimique menaçante.

- 1- Ventre Frontale du M. Occipito-frontal
- 2- M. Corrugateur
- 3- M. Procerus
- 4- M.Orbiculaire de l'œil (partie palpébrale)
- 5- M.Orbiculaire de l'œil (partie orbitaire)



Corrugateur du sourcil, procerus et orbiculaire de l'œil

d-Nasal

Ce muscle est constitué de deux portions :

- La portion transverse : est placée transversalement sur la partie moyenne du nez.
- La portion alaire : occupe l'aile du nez

Action : Dilatation de la narine.

e-Abaisseur du septum nasal

Il se fixe en bas au niveau des saillies alvéolaires de l'apex de l'incisive latérale et de la canine. De là les fibres divergent pour se terminer à la face profonde de la peau, du septum nasal, et du bord postérieur de la narine.

Action : Il est essentiellement abaisseur de l'aile du nez.

5-LES MUSCLES ANNEXES AUX LEVRES

Les muscles annexés aux lèvres sont dilatateurs ou constricteurs de la fente orale.

a- Orbiculaire de la bouche

Est constitué de deux portions de fonction opposée et d'organisation différente :

- L'orbiculaire interne
- L'orbiculaire externe

Action : occlusion des lèvres

b- Abaisseur de l'angle de la bouche

il s'étend de la ligne oblique de la mandibule et se termine sur la peau de la commissure et de la lèvre supérieure.

Action : Attire la commissure labiale en bas et en dehors. Exprime la tristesse.

c- Risorius

Est situé à la partie moyenne de la joue.

Action : Attire la commissure labiale en dehors et en arrière. Le muscle du sourire.

d- Petit zygomatique

Les muscles peauciers. Pr Benleghib N

Se fixe en haut sur la face latérale de l'os zygomatique, il se termine en bas sur la face profonde de la peau de la lèvre supérieure.

Action : il élève vers le haut et en dehors la lèvre supérieure déterminant une expression joyeuse.

e- Grand zygomatique

Il se fixe en haut sur la face latérale du zygomatique, il se termine en bas sur la face profonde de la peau de la lèvre supérieure.

Action : il élève vers le haut et en dehors la lèvre supérieure. Exprime une expression joyeuse.

f- Elévateur de la lèvre supérieure et de l'aile du nez

Occupe le sillon naso-labial.

Action : Il est élévateur de l'aile du nez et de la lèvre supérieure. Exprime la tristesse.

g- Abaisseur de la lèvre inférieure

Il s'étend de la mandibule au niveau du tiers antérieur de la ligne oblique. Il se termine sur la peau de la lèvre inférieure.

Action : Abaisse la lèvre inférieure. Exprime le dégoût.

h-Elévateur angle de la bouche

Il se fixe en haut sur le maxillaire sous le foramen infra-orbitaire, il se termine à la peau de la commissure et de la lèvre inférieure.

Action : Elève la commissure et la lèvre supérieure.

i-Buccinateur

Ce muscle occupe la partie profonde de la joue dont il constitue l'armature.

Action : Attire l'angle de la bouche en arrière et en latéral. Permet de souffler (muscle du trompettiste) et de siffler.

j-Mentonnier

Occupe la région mentonnière.


Action : Ce muscle élève le menton.

6- LE MUSCLE ANNEXE AU COU

a-Platysma

S'étend de la peau des régions claviculaire et acromiale au bord inférieur de la mandibule.

Action : tend la peau du cou, abaisse la commissure labiale. Responsable des rides du cou.



Les muscles peauciers

FIN

LES MUSCLES DU COU

I-INTRODUCTION

On sépare la musculature du cou en partie antérieure et postérieure, relativement au rachis.

Pour la partie antérieure, on a de la superficie vers la profondeur quatre groupes musculaires :

- Groupe antéro-latéral superficiel
- Groupe antérieur supra-hyoïdien
- Groupe antérieur infra-hyoïdien
- Groupe profond latéral
- Groupe profond médian ou prévertébral

Pour la partie postérieure ou la nuque, on a de la superficie vers la profondeur quatre plans musculaires :

- Le plan superficiel: partie supérieure du Trapèze
- Le plan du splénius et de l'angulaire
- Le plan des complexus
- Le plan profond

II-MUSCLES DE LA REGION ANTERIEURE DU COU

A-Groupe antéro-latéral superficiel

1-Muscle sterno-cléido-mastoïdien

Origine :

- Chef sternal : face antérieure du manubrium. .
- Chef claviculaire : face supérieure du 1/3 médial de la clavicule.

Terminaison : face latérale du processus mastoïde.

B-Groupe antérieur supra-hyoïdien

1-Muscle génio-hyoïdien

Origine : processus géni inférieur de la mandibule.

Terminaison : face antérieure du corps de l'hyoïde.

2-Muscle stylo-hyoïdien

Origine : base du processus styloïde.

Terminaison : face anté-latérale de l'hyoïde.

3-Muscle mylo-hyoïdien

Origine : mandibule.

Terminaison : face antérieure du corps de l'hyoïde.

4-Muscle digastrique

Origine :

- Ventre antérieur : dans la fossette digastrique qui se trouve sur la face interne de la mandibule.
- Ventre postérieur : sur la face médiale du processus mastoïdien de l'os temporal.

Terminaison : tendon intermédiaire sur l'os hyoïde.

C-Groupe antérieur infra-hyoïdien

1- Muscle omo-hyoïdien

Origine : bord supérieur de la scapula.

Terminaison : bord inférieur du corps de l'hyoïde.

2-Muscle thyro-hyoïdien

Origine : face antéro-latérale du cartilage thyroïde.

Terminaison : partie postéro-inférieure de l'hyoïde

3- Muscle sterno-thyroïdien


Origine : face postérieure du manubrium sternal.

Terminaison : face antéro-latérale du cartilage thyroïde.

4-Muscle sterno-hyoïdien

Origine : versant postérieur de l'articulation sterno-claviculaire, et manubrium sternal.

Terminaison : corps de l'hyoïde médialement à la terminaison de l'omo-hyoïdien.



Groupe antérieur supra et infra-hyoïdien

D- Groupe profond latéral

1- Muscles scalènes

a-Muscle scalène antérieur

Origine: tubercules antérieurs des apophyses transverses de C3, C4, C5, C6.

Terminaison: tubercule de Lisfranc (face supérieure de la première côte).

b-Muscle scalène moyen


Origine: tubercules antérieurs des apophyses transverses de C2, C3, C4, C5, C6, C7.

Terminaison: face supérieure de la première côte, en arrière et en dehors du tubercule de Lisfranc.

c-Muscle scalène postérieur

Origine: tubercules postérieurs des apophyses transverses de C4, C5, C6.

Terminaison: bord supérieur de la face externe de la 2^{ème} côte.



Muscles scalènes

2-Muscle droit latéral de la tête

Origine: processus jugulaire de l'occipital

Terminaison: racine antérieure de l'apophyse transverse de C1.

Les muscles du cou. Pr Benleghib N.

E- Groupe des muscles prévertébraux

1-Muscle droit antérieur de la tête

Origine: processus basilaire de l'occipital

Terminaison: racine antérieure de l'apophyse transverse de l'atlas

2-Muscle long du cou


3 portions:

1. Portion longitudinale médiale
2. Portion supéro-latérale
3. Portion inféro-latérale

3-Muscle long de la tête

4-Muscles inter- transversaires

Relient les apophyses transverses de 2 vertèbres voisines, uniquement au niveau du rachis cervical.



Les muscles prévertébraux


III- MUSCLES DE LA REGION POSTERIEURE DU COU OU LA NUQUE

A-Le plan superficiel

1-Trapeze : 3faisceaux:

Insertion : ligne nuchale supérieure et processus épineux de C7 à T10.

Terminaison:1/3 externe de la clavicule,et la scapula.



Muscle trapèze

B-Le plan des splénius et de l'élévateur de la scapula

1-Splénus :

Origine : ligament nuchal et processus épineux de C7 à T5.

Terminaison : 2 parties :

-**Splénus de la tête** (capitis): Se termine sur la ligne nuchale supérieure et processus mastoïde

-**Splénus du cou** (colli) : Se termine sur les processus transverses de C1 à C3.

2-Élévateur de la scapula (angulaire de l'omoplate)

De l'angle de la scapula aux processus transverse de C1 à C5.

C-Le plan des muscles semi-épineux et longissimus de la tête

1-Le Semi-épineux de la tête ou grand complexe

Origine :

- 1 - le processus transverse C4 à C7
- 2 - processus transverse T1 à T6

Terminaison : entre les 2 lignes nuchales supérieure et inférieure de l'occipital.

2-Le longissimus de la tête ou petit complexe

Origine : processus transverse des 4 dernières cervicales et 1ère thoracique

Terminaison : processus mastoïde

3-Le longissimus du cou


Origine: sommet des processus transverses des 5 premières vertèbres thoraciques,

Terminaison: au tubercules postérieurs des processus transverses des 5 dernières vertèbres cervicales.

4-L'ilio-costal du cou

Origine : Bord supérieur de 1^{re} et 6^e côtes

Terminaison : tuberc



Les muscles de la nuque : Le plan des muscles semi-épineux et longissimus de la tête

Les muscles du cou. Pr Benleghib N.

A-Le plan profond

1-Le petit droit postérieur

Unit tubercule post de l'atlas et ligne nuchale inférieure de l'occipital.

2-Le grand droit postérieur

Unit le processus épineux de l'axis à la ligne nuchale inférieure de l'occipital.

3-L'oblique supérieur

Unit le processus transverse de l'atlas et ligne nuchale de l'occipital


4-L'oblique inférieur

Unit le processus épineux de l'axis au processus transverse de l'atlas.

5-Les inter épineux du cou

Ils relient une apophyse épineuse à une autre apophyse épineuse.

- 1- M. Petit droit
- 2- M. Grand droit
- 3- M. Oblique sup
- 4- M. Oblique inf
- 5- M. inter-épineux



Les muscles de la nuque : plan profond