
Registered predictors of finite activation effects
vit_b16 · zero · heads
vit_b16 · zero · routing_value
vit_b16 · zero · residual_branches
vit_b16 · blur_rgb · heads
vit_b16 · blur_rgb · routing_value
vit_b16 · blur_rgb · residual_branches
deit_s16 · zero · heads
deit_s16 · zero · routing_value
deit_s16 · zero · residual_branches
deit_s16 · blur_rgb · heads
deit_s16 · blur_rgb · routing_value
deit_s16 · blur_rgb · residual_branches
0.29 0.72 0.47 0.25 0.05 0.00
0.10 0.40 0.21 0.28 -0.24 -0.00
0.18 0.48 0.31 0.50 -0.06 0.01
0.31 0.72 0.33 0.26 -0.02 0.00
0.16 0.43 0.19 0.17 -0.11 0.00
0.21 0.34 0.22 0.38 -0.03 -0.00
0.19 0.69 0.39 0.07 0.15 -0.00
0.11 0.41 0.15 0.15 -0.09 -0.00
0.14 0.38 0.26 0.19 0.29 -0.00
0.18 0.70 0.31 0.14 0.12 -0.00
0.16 0.48 0.14 0.16 -0.11 0.00
0.23 0.40 0.25 0.20 0.21 0.00
endpoint mass
p ref absolute
gradient activation
output norm
gradient norm
random 20
Median per-image Spearman
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
Descriptive predictors are reported alongside Endpoint mass; they are not part of the C4a omnibus gate.