

 物品服药频率与用量明细表

药品 / 物品名称	爸爸用量及频率	妈妈用量及频率	最佳服用 / 使用时机	重点注意事项
仲景 归脾丸	一日 3 次 每次 8~10 丸	-	空腹吃： 1. 早饭前半小时 2. 下午 3-4 点 3. 睡前半小时	偏温补，如连吃几天出现口干、大便干燥，可减为一日 2 次或停吃两天，多喝水。
银善存 50+	一日 1 次 每次 1 粒	一日 1 次 每次 1 粒	饭后吃： 早饭后 或 午饭后半小时	饭后吃不伤胃，且利于维生素吸收。爸爸必须和早晨空腹吃的归脾丸错开至少 1 小时。
复方消化酶胶囊 (达喜)	消化不良时吃 (每次 1 粒)	吃荤菜/防腹胀时吃 (每次 1 粒)	餐前 15 分钟 用水送服	极其重要： 必须在饭前吃！用水整粒吞服。如果实在吞不下，可以打开胶囊壳，但绝对不能嚼碎里面的小丸。
两只老虎 止痛膏	按需使用	按需使用	关节、肌肉酸痛时贴敷	每次贴敷不超过 8-12 小时，避免皮肤捂发红或过敏。
999 感冒灵颗粒	按需使用	按需使用	刚受凉、打喷嚏流鼻涕时	喝完会犯困，正好睡觉。绝对不要和其他感冒药混吃。
碘伏棉签	按需使用	按需使用	皮肤有轻微擦破、划伤时	掰断彩环那一头，碘伏会自动流到另一头。先用它给伤口消毒。
红霉素软膏	按需使用	按需使用	伤口消毒后 / 嘴角上火起 泡	碘伏消毒晾干以后，涂一点软膏消炎防止感染。

 爸妈每日作息跟进表

一日时间轴	爸爸的日常安排	妈妈的日常安排
早晨 (起床后，空腹)	吃 8~10 丸 【归脾丸】	-
【按需】 正餐前 15 分钟	若觉得肚子发胀不消化： 吃 1 粒 【复方消化酶】	若这顿有肉菜/为了防腹胀： 吃 1 粒 【复方消化酶】

一日时间轴	爸爸的日常安排	妈妈的日常安排
早 / 午餐后 (每天必吃)	吃 1 粒 【银善存】	吃 1 粒 【银善存】
下午 (3-4 点左右, 空腹)	吃 8~10 丸 【归脾丸】	喝温开水, 多休息
晚上 (临睡前半小时)	吃 8~10 丸 【归脾丸】	-