

Genen	Functie	Bron
CXCL1(groa)	Trekt neutrofielen aan, stimuleert fibroblastgroei en fibrose, stimuleert angiogenese en de productie stijgt door IL-1 en TNF.	(Szekanecz et al., 2003), (Elemam et al., 2020)
CXCL2	Neutrofielen in het ontstoken weefsel produceren CXCL2, wat meer neutrofielen aantrekt.	(Miyabe et al., 2020)
CXCL5 (ENA-78)	Trekt neutrofielen aan, stimuleert angiogenese, wordt veel gevonden in RA synovium, en synoviaal vocht productie neemt toe door TNF- α .	(Szekanecz et al., 2003), (Elemam et al., 2020)
CXCL6	Aanwezig en hoge concentraties in serum en synovium van RA-patienten, stimuleert synoviale fibroblasten, bevordert bindweefselgroei en bevordert angiogenese.	(Szekanecz et al., 2003), (Elemam et al., 2020)
CXCL8	Aantrekken van neutrofielen, stimuleren van ontsteking en is verhoogd aanwezig in synoviaal vocht van RA-patiënten.	(Szekanecz et al., 2003), (Elemam et al., 2020)
CXCL9	Lokt Th-1 cellen en geactiveerde T-cellen naar gewrichten.	(Szekanecz et al., 2003), (Elemam et al., 2020)
CXCL13	Trekt B-cellen aan, hogere CXCL13 spiegels hangen samen met ernstigere ziekte, voorgesteld als biomarker voor vroege RA detectie	(Elemam et al., 2020)
IL-6	Wordt beschouwd als een van de belangrijkste cytokines in RA. Speelt een rol bij ontsteking van het synovium, activatie van B-cellen en T-cellen, botafbraak via osteoclasten en gewrichtsschade.	(Srirangan & Choy, 2010) (Favalli, 2020)
IL1A en IL1B	IL1A en IL1B activeren ontstekingsignalen via IL-1-receptoren en verschillende signaalroutes, waaronder MAPK- en Akt-siginaaltransductie. IL1B is	(Wang et al., 2025) (Mori et al., 2011)

	een belangrijke veroorzaker van ontsteking van het synovium, activatie van imuuncellen en boterosie en botafbraak via activatie van het NLRP3 inflammasoom. IL-1B versterkt productie IL-6 waardoor ontstekingsreactie nog meer worden versterkt.	
--	--	--