

# Einführung in die Kosmologie

Martin Michael Müller

14. Januar 2020

**E-Mail-Adresse:**

**Martin-Michael.Mueller@univ-lorraine.fr**  
**mueller5@univ-lorraine.fr**

Termine:

- Dienstags 10:15 Uhr - 11:45 Uhr Vorlesung
- Dienstags 13:00 Uhr - 15:00 Uhr 30 min Vorlesung + Rest Übung

„Engagement in den Übungen ist notwendig um die Klausur schreiben zu dürfen“

Es gibt eine Klausur

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Übersicht</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Astronomische Grundlagen</b>	<b>4</b>
2.1	Das elektrische Strahlungsfeld . . . . .	6
2.2	Strahlungstransport . . . . .	7
2.3	Schwarzkörperstrahlung . . . . .	8
2.4	Das Magnitudensystem . . . . .	10
2.5	Farben & absolute Helligkeit . . . . .	11
2.6	Eigenschaften von Sternen . . . . .	13
2.7	Sternentwicklung . . . . .	15
2.8	Enternungsbestimmungen . . . . .	17
2.8.1	Trigonometrische Parallaxe . . . . .	17
2.8.2	Eigenbewegungen . . . . .	18
2.8.3	Sternstromparallaxe . . . . .	18
2.8.4	Photometrische Entfernung . . . . .	20
2.8.5	Visuelle Doppelsterne . . . . .	22
2.8.6	Entfernung pulsierender Sterne . . . . .	22
<b>3</b>	<b>Unsere Galaxis</b>	<b>25</b>
3.1	Struktur der Galaxis . . . . .	25
3.2	Kinematik der Galaxis . . . . .	27
3.3	Die Rotationskurve der Galaxis . . . . .	30
3.4	Die Welt der Galaxien . . . . .	34
3.4.1	Elliptische Galaxien Allgemein . . . . .	36
3.4.2	Spiralgalaxien . . . . .	37
3.4.3	Skalengesetze . . . . .	38
3.4.4	Schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien . . . . .	39
3.5	Extragalaktische Entfernungsbestimmungen . . . . .	40
<b>4</b>	<b>Homogene Iostrope Weltmodelle</b>	<b>40</b>
4.1	Grundlegende Beobachtungen auf kosmologischen Skalen . . . .	41
4.2	Ist das Universum unendlich, euklidisch und statisch? . . . .	42
4.3	Ein expandierendes Universum . . . . .	45
4.3.1	Newtonsche Kosmologie . . . . .	45
4.3.2	Relativitätstheorie . . . . .	46
4.3.3	Gekrümmte Räume . . . . .	47

4.3.4	Modifikation der Newtonschen Kosmologie . . . . .	49
4.3.5	Die Materiekomponenten des Universums . . . . .	50
4.3.6	Heuristische Herleitung der Friedmann-Lemaître-Expansionsgleichungen	50
4.3.7	Diskussion der Expansionsgleichungen . . . . .	52
4.4	Das Hubble'sche Gesetz . . . . .	56
4.5	Thermische Geschichte des Universums . . . . .	60
4.5.1	Expansion in strahlungsdominierter Phase . . . . .	60
4.5.2	Entkopplung der Neutrinos . . . . .	61
4.5.3	Paarvernichtung . . . . .	63
4.5.4	Primordiale Nukleosynthese . . . . .	63

## Literatur

1. P. Schneider, “Extragalaktische Astronomie & Kosmologie“, Springer (2008)
2. T.-P. Cheng, “Relativity, Gravitation and Cosmology“, Oxford Univ. Press (2008)

# 1 Übersicht

Kosmologie=gr. *κοσμολογία*=Lehre von der Welt als Ganzes

- Ursprung, Entwicklung, Struktur des Universums (=der wahrnehmbaren Welt)
- Grenzbereich der Physik/Astronomie + Einfüsse von Religion und Philosophie
- Beispiele historischer Ideen zur Schöpfung:
  - (a) Sumerer ~ 1800 v. Chr. “Atraharis-Epos“
  - (b) griechische Tradition: Hesiod - “Werke und Tage“ ~ 700 v. Chr., “Gaia“
  - (c) nord-germanische Mythen: Edda
  - (d) altes Testament - Genesis 1, 1-9

Bei aller Verschiedenheit, zwei Gemeinsamkeiten:

1. Die Welt entsteht aus dem Chaos/Nichts/Ungeformten
2. Es gibt einen definierten Anfang

→ Frage: Wie alt ist die Welt?

laut griechischer Mythologie: Prometheus ~ 1600 v. Chr.

traditionelle christliche Antwort:

Erschaffung der Welt am Sonntag den 23. Oktober 4004 v. Chr. um 9:00 Uhr morgens (Chronologie des irischen Bischofs Ussher (1581-1656))

⇒  $\simeq$  6000 Jahre!?

- Schwierigkeiten: viele geologische + paläontologische + archäologische Befunde weisen klar auf ein höheres Alter hin!
  - \* älteste bekannte Schrift ~ 3000 v. Chr. = 5000 BP (=“before present“)
  - \* Beginn des Ackerbaus ~ 7000 BP
  - \* Ende der letzten Kaltzeit 10000 BP
  - \* erster moderner Homo sapiens 160000 BP
  - \* erste Homininen ~ 7-9 Mil Jahre
  - \* Erdalter ~ 4.5 Mrd Jahre

- \* älteste Sterne  $\sim 12\text{-}13$  Mrd Jahre
- \* heutige Schätzung für Weltalter  $\sim 13.7$  Mrd Jahre
- große Bedeutung der radiometrische Altersbestimmung!
- ⇒ Notwendigkeit einer auf verifizierbaren physikalischen Argumenten aufgebauten Kosmologie!
- Einige historische Daten:
- 2. Jhd. n. Chr. ptolemäisches geozentrisches Weltbild (C. Ptolemäus  $\sim 100\text{-}180$ )
- 1543 Kopernikus “De revolutionibus orbitum celestium”
- 1609/10 Erfindung des Teleskops (Galilei) → Milchstraße besteht aus Einzelsternen
- 1785 Herschel: erstes Bild vom Aufbau der Milchstraße (in Wahrheit zwei der Spiralarme)
- 1837 Bessel (Struve): erste direkte Entfernungsbestimmung eines Sterns
- 1916 ART
- 1923 erste exagalaktische Entfernungen
- 1927 erste Urknalltheorie (Lemaître)
- 1929 Hubble: Rotverschiebung der Galaxie
- 1932/33 erste Hinweise auf dunkle Materie (Oort/Zwicky) → lange Zeit ignoriert
- 1948 Urknall + Elemententstehung (Alpher, Gamov, Herman) → Vorhersage der Kosmischen Hintergrundstrahlung
- 1964 Penzias & Wilson: Entdeckung der Kosmischen Hintergrundstrahlung im Mikrowellenbereich (schwarze Strahlung,  $T \sim 3\text{ K}$ )
- 1981 Inflationsszenario (Guth)
- 1986 blasenartige Anordnung von Galaxienhaufen (inhomogen!)
- 1989-93 : genaue Vermessung des Mikrowellenhintergrundes
- 1998 Hinweise auf beschleunigte Expansion → “Dunkle Energie”
- 2001-10 : Satelliten COBE + WMAP
- Energieinhalt des Universums:
- 4.6 % baryonische Materie

23 % dunkle Materie  
72 % dunkle Energie

⇒ Wir kennen nur wenige Prozente des Energieinhaltes des Universums

## 2 Astronomische Grundlagen

Ziel: Einführung in einige simple Fakten und Grundlagen der Astronomie und Astrophysik

→ Eigenschaften der Sterne werden typischerweise mithilfe der Werte für die Sonne ausgedrückt:

- ⇒ Luminosität:  $L_* \sim 10^{-4} - 10^4 L_\odot$
- ⇒ Massen:  $M_* \sim 0.05 - 100 M_\odot$
- ⇒ Temperaturen  $T_* \sim 10^3 - 5 \cdot 10^4 \text{ K}$

⇒ sehr heiße Gaskugeln

→ Sonne:

- Radius:  $R_\odot = 6.96 \times 10^8 \text{ m} = 6.96 \times 10^{10} \text{ cm}$   
nahezu Kugelförmig (Abplattung  $\sim 5 \times 10^{-5}$ )
- Energiefluss:  $L_\odot \text{ tot} \simeq 3.9 \times 10^{26} \text{ J s}^{-1} = 3.9 \times 10^{33} \text{ erg/s}$   
im sichtbaren Spektrum:  $L_\odot \text{ vis} \sim 0.5 L_\odot \text{ tot}$   
der Rest wird hauptsächlich im IR und UV abgestrahlt
- Masse  $M_\odot \sim 1.99 \times 10^{30} \text{ kg} = 1.99 \times 10^{33} \text{ g}$
- sichtbare Teile der Sonne:
  - (a) Photosphäre: unterste Schicht der Sonnenatmosphäre emittiert das sichtbare Licht der Sonne
  - (b) Chromosphäre: Gasschicht zwischen Photosphäre und Korona, Dicke  $\sim 10 \times 10^3 - 13 \times 10^3 \text{ km}$   
während einer totalen Sonnenfinsternis sichtbar
  - (c) Korona: erstreckt sich über mehrere  $R_\odot$ ,  $T \sim 1.5 \times 10^6 \text{ K}$
  - (d) Sonnenflecken: auf der Photosphäre (kühler, recht statisch)




- Rotationsperiode der Sonne wurde so nachgemessen: ca. 25.5 d
- Sonnenfleckenzyklus  $\sim 2 \cdot 11 \text{ a}$   
(zw. 0.0 % und 0.4 % der gesamten Oberfläche)
- Sterne finden sich oft im Paar, Sternhaufen und (auf noch größerer Skala) in Galaxien
- Galaxien enthalten zusätzlich Gas und (Sternen)staub

## 2.1 Das elektrische Strahlungsfeld

→ experimentelle Beobachtungen: Licht/elektromagnetische Strahlung ausgesandt von Sternen

→ während 1000-en von Jahren die einzige Informationsquelle



$dA \cos(\theta) \hat{=}$  in Richtung der einfallenden Strahlung projizierte Fläche

→ spezifische Intensität  $I_\nu$  (=spektrale Strahlungsdichte):

$$dE = I_\nu dA \cos(\theta) dt d\omega d\nu$$

$\nu$  = Frequenz der Strahlung

$E$  = emittierte Energie

$I_\nu$  entspricht der Flächenhelligkeit einer (kosmischen) Quelle

$$[I_\nu] = \frac{\text{erg}}{\text{cm}^2 \text{Hz ster s}} \quad (1 \text{ erg} = 10^{-7} \text{ J})$$

→ spezifischer Nettofluss:

$$F_\nu = \int_{\Omega} d\omega I_\nu \cos(\theta) \quad , [F_\nu] = \frac{\text{erg}}{\text{cm}^2 \text{Hz s}}$$

der durch das Flächenelement strömt. Typischerweise (kosmologische Quellen)  $\Omega \ll 1 \Rightarrow \cos(\theta) \approx 1$  (in diesem Zusammenhang wird  $F_\nu$  mit  $S_\nu$  bezeichnet)

→ mittlere spezifische Intensität

$$J_\nu = \frac{1}{4\pi} \int d\omega I_\nu \quad , \text{Mittelwert von } I_\nu \text{ über alle Winkel}$$

bei isotropem Strahlungsfeld:  $J_\nu = I_\nu$

→ spezifische Energiedichte:

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} J_\nu \quad [u_\nu] = \frac{\text{erg}}{\text{cm}^3 \text{Hz}}$$

Energie des Strahlungsfeldes pro Volumenelement und Frequenzintervall

→ Gesamtenergiedichte der Strahlung:  $u = \int_0^\infty d\nu u_\nu$

## 2.2 Strahlungstransport

$I_\nu = \text{const.}$  entlang der Ausbreitungsrichtung eines Lichtstrahls (falls keine Emissions- oder Absorptionsprozesse stattfinden)

$s = \text{Länge entlang des Strahls}$

$\Rightarrow \frac{dI_\nu}{ds} = \sigma \Rightarrow \text{Flächenhelligkeit einer Quelle ist unabhängig von ihrer Entfernung.}$

Aber: Der beobachtbare Fluss einer Quelle hängt von ihrer Entfernung  $D$  ab, weil der von der Quelle eingenommene Raumwinkel abnimmt:  $F_\nu \propto \frac{1}{D^2}$

→ inklusive Emission & Absorption (bzw. Streuung von Licht)

$$\frac{dI_\nu}{ds} = - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Absorption} \\ \kappa_\nu: \text{Absorptionskoeffizient} \\ [\kappa_\nu] = \frac{1}{\text{cm}}}}{\kappa_\nu} \cdot I_\nu + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Emission} \\ \text{Emissionskoeffizient} \\ [j_\nu] = \frac{\text{erg}}{\text{cm}^3 \text{sHz ster}}}}{j_\nu} \quad (*) \quad (\text{Strahlungstransportgleichung})$$

Absorption/Emission = echte Absorption/Emission + Streuung

→ optische Tiefe  $\tau_\nu(s) := \int_{s_0}^s ds \kappa_\nu(s')$

$\Rightarrow d\tau_\nu = \kappa_\nu \cdot ds, s_0 : \text{Referenzpunkt auf dem Lichtstrahl}$

$$(*) \Rightarrow \frac{dI_\nu}{d\tau_\nu} = -I_\nu + \mathcal{S}_\nu \quad (**)$$

wobei:  $\mathcal{S}_\nu = \frac{j_\nu}{\kappa_\nu}$  Quellfunktion

→ formale Lösung von (\*\*):

$$I_\nu(\tau_\nu) = \underset{\substack{\text{Abfall der Intensität} \\ \text{aufgrund von Absorption}}}{I_\nu(0)e^{-\tau_\nu}} + \int_0^{\tau_\nu} d\tau'_\nu e^{\tau'_\nu - \tau_\nu} \mathcal{S}_\nu(\tau'_\nu) \quad \underset{\substack{\text{Energiegewinn durch} \\ \text{Emission (inklusive} \\ \text{darauffolgender Absorption}}}{}}$$

formale Lösung, weil Zustand der Materie (von der  $\kappa_\nu$  und  $j_\nu$  abhängen) vom Strahlungsfeld selbst abhängt.

## 2.3 Schwarzkörperstrahlung

→ Für Materie im thermischen Gleichgewicht:

$$\mathcal{S}_\nu = B_\nu(T)$$

$$\Leftrightarrow j_\nu = B_\nu(T) \cdot \kappa_\nu$$


Kirchhoffsches Gesetz

hängt nur von der Temperatur ab (und nicht von  $I_\nu$ !) und der Zusammensetzung der Materie

$$\begin{aligned} \Rightarrow I_\nu(\tau) &= I_\nu(0)e^{-\tau_\nu} + B_\nu(T) \cdot \int_0^{\tau_\nu} d\tau'_\nu e^{(\tau'_\nu - \tau_\nu)} \\ &= I_\nu(0)e^{-\tau_\nu} + B_\nu(T) \cdot (1 - e^{-\tau_\nu}) \end{aligned}$$

Für größere  $\tau_\nu$  gilt:  $I_\nu \approx B_\nu(T)$

Die Strahlung der Materie im thermischen Gleichgewicht wird durch die Funktion  $B_\nu(T)$  beschrieben, wenn die optische Tiefe genügend groß ist.



Hohlraumstrahlung ( $\tau_\nu = \infty$ , da Wände undurchsichtig)

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_b T}} - 1}$$


mit:

$h = 6.626 \times 10^{-27} \text{ erg} \cdot \text{s}$  Plank'sches Wirkungsquantum

$k_B = 1.38 \times 10^{-16} \frac{\text{erg}}{\text{K}}$  Boltzmann-Konstante

Schwarzkörperstrahlung:

$$(**) \Rightarrow \text{falls } \tau_\nu \rightarrow \infty \text{ gilt } I_\nu = \mathcal{S}_\nu \begin{cases} I_\nu = B_\nu(T) \\ \text{thermische Strahlung: } \mathcal{S}_\nu = B_\nu(T) \end{cases}$$



→ Maximum von  $B_\nu$  bei  $\frac{h\nu_{max}}{k_B T} = 2.82$  (Wien'sches Verschiebungsgesetz)  
NB:  $\nu_{max} \approx T \Rightarrow$  Messung der Temperatur

→ Wg.  $B_\lambda(T)d\lambda = B_\nu(T)d\nu$  mit  $\lambda = \frac{c}{\nu}$

$$\Rightarrow B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda T}} - 1}$$

Rayleigh-Jeans-Näherung (ergibt sich bereits aus klassischer Elektrodynamik):

$$B_\nu(T) \underset{\frac{h\nu}{k_B T} < 1}{\approx} \frac{2}{c^5} \nu^2 k_B T$$

Wien-Näherung:

$$B_\nu(T) \underset{\frac{h\nu}{k_B T} > 1}{\approx} \frac{2h\nu^3}{c^2} e^{-\frac{h\nu}{k_B T}}$$

→ Energiedichte:

$$u = \frac{4\pi}{c} \int_0^\infty d\nu B_\nu(T) = \underbrace{\frac{8\pi^5 k_B^4}{15c^3 h^3}}_{\approx 7.56 \times 10^{-15} \frac{\text{erg}}{\text{cm}^3 \text{K}^4}} \cdot T^4$$

$\Rightarrow$  Fluss, der von der Oberfläche eines schwarzen Körpers ausgeht:

$$\begin{aligned} F &= \int_0^\infty d\nu F_\nu = \Pi \int_0^\infty d\nu B_\nu(T) \\ &= \sigma \cdot T^4 \text{ mit } \sigma = \text{const} \\ \sigma &= \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} = \text{const} \quad (\text{Stefan-Boltzmann-Konstante}) \end{aligned}$$

## 2.4 Das Magnitudensystem

→ die scheinbare Helligkeit, die das Auge wahrnimmt, verhält sich in etwa logarithmisch mit dem Strahlungsstrom (vgl. Gehörsinn, Einheit Dezibel)

⇒ seit der Antike Einteilung von Sternen in Größenklassen (qualitativ)

⇒ Einführung eines quantitativen (relativen) Magsystems

Definition Für zwei Quellen, die die Flüsse  $S_1$  und  $S_2$  haben, verhalten sich die scheinbaren Magnituden/scheinbaren Helligkeiten der beiden Quellen  $m_1$  und  $m_2$  wie:

$$m_1 - m_2 = -2.5 \log \left( \frac{S_1}{S_2} \right)$$
$$\Leftrightarrow \frac{S_1}{S_2} = 10^{-0.4(m_1 - m_2)}$$

→ NB:

$$\underset{\substack{\text{z.B. } m_1=1 \\ m_2=0}}{\delta m = 1} \Rightarrow \frac{S_1}{S_2} \approx 0.4 \Leftrightarrow \frac{S_2}{S_1} = 2.5 \Rightarrow S_2 > S_1$$

→ je größer die scheinbare Helligkeit, desto schwächer (!) die Quelle.

traditionelle Referenz: Wega  $m = 0 \text{ mag}$

heute "Polsequenz"  $\Rightarrow m^{\text{Wega}} = 0.03 \text{ mag}$

→ Beispiele:

Sonne:  $-26.73$  mag

Vollmond:  $-12.73$  mag

Sirius:  $-1.46$  mag

Polarstern:  $1.97$  mag

Uranus:  $5.5$  mag

Pluto:  $13.9$  mag

## 2.5 Farben & absolute Helligkeit

→ Sterne haben verschiedene Farben (besser mit (z. B.) Feldstecher zu beobachten)

→ man misst die scheinbaren Magnituden für verschiedene wohldefinierte Frequenzen (mit Hilfe von Filtersystemen, die zur Beobachtung genutzt werden) und schreibt:

ultraviolett  $U = m_U$

blau  $B = m_B$

sichtbar  $V = m_V$

rot  $R = m_R$

infrarot  $I = m_I$

etc.

Es existieren mehrer Filtersysteme  $\Rightarrow$  verschiedene gebräuchliche Magnitudendefinitionen & Referenzpunkte

→ Absolute Helligkeit:

- Sei  $L_\nu$  die spezifische Leuchtkraft einer (isotrop emittierenden) Quelle =  $\frac{\text{abgestrahlte Energie}}{dt \cdot d\nu}$   
 $\Rightarrow$  Fluss  $S_\nu = \frac{L_\nu}{4\pi D^2}$ ,  $D$ : Abstand zwischen Quelle und Beobachter  
Definition:

Die absolute Magnitude  $\mathcal{M}$  (absolute Helligkeit) ist gleich der

scheinbaren Magnitude der Quelle, wenn diese sich im Abstand von 10 pc vom Beobachter befindet. ( $1 \text{ pc} = 1 \text{ parsec} \approx 3.089 \times 10^{18} \text{ cm}$ )

$$\begin{aligned}
 L_\nu &= 4\pi D^2 S_\nu = 4\pi (10 \text{ pc})^2 S_\nu^{\text{abs}} \\
 &\Leftrightarrow -2.5 \log \left( D^2 \frac{S_\nu}{S_\nu^0} \right) = -2.5 \log \left[ (10 \text{ pc})^2 \cdot \frac{S_\nu^{\text{abs}}}{S_\nu^0} \right] \\
 &\Leftrightarrow -2.5 \log \left( \frac{S_\nu}{S_\nu^0} \right) - (-2.5) \log \left( \frac{S_\nu^{\text{abs}}}{S_\nu^0} \right) = -5 + 5 \log \left( \frac{D}{1 \text{ pc}} \right) \\
 &\Leftrightarrow m - \mathcal{M} = 5 \log \left( \frac{D}{1 \text{ pc}} \right) - 5 =: \quad \quad \quad \begin{array}{c} \mu \\ \uparrow \\ \text{Entfernungsmodul} \end{array}
 \end{aligned}$$

z.B.:

$$\begin{aligned}
 D = 10 \text{ pc} &\Leftrightarrow \mu = 0 \\
 D = 1 \text{ kpc} &\Leftrightarrow \mu = 10 \\
 D = 1 \text{ Mpc} &\Leftrightarrow \mu = 25
 \end{aligned}$$

→ Die Gesamtleuchtkraft einer Queller:

$$L = \int_0^\infty d\nu L_\nu$$

Gesamtfluss:

$$S = \int_0^\infty d\nu S_\nu$$

⇒ scheinbare bolometrische Helligkeit:

$$m_{bol} = -2.5 \log(S) + \underset{\text{def. über Vergleichsstärke}}{const}$$

absolute bolometrische Helligkeit:

$$\mathcal{M}_{bol} = -2.5 \log(L) + \underset{\text{def. über Vergleichsstärke}}{const}$$

z.B. mit Hilfe der Sonne:

$$\begin{aligned}
 m_{\odot, bol} &= -26.83 \quad \& \quad \mu = -31.47 \quad (D = 1 \text{ AU} \approx 1.5 \times 10^{13} \text{ cm}) \\
 \Rightarrow \mathcal{M}_{\odot, bol} - \mu &= 4.74 \text{ mag}
 \end{aligned}$$



## 2.6 Eigenschaften von Sternen

→ Sterne: Gaskugeln im hydrostatischen zwischen Gravitation und Druck

⇒ äußeres Erscheinungsbild ist charakterisiert durch

Radius  $R$

Temperatur  $T$

Masse  $M$

→ Falls das Sternspektrum der Sterne durch die Planck-Funktion gegeben wäre, so wäre:  $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$  ( $L$ : Leuchtkraft des Sterns)


⇒ Definition der Effektivtemperatur  $T_{eff}$  eines Sterns:

$$\sigma T_{eff}^4 := \frac{L}{4\pi R^2} \quad (*)$$

$\frac{L}{L_{\odot}} \propto 10^{-4} - 10^5$  (Unterschied kommt entweder durch Variation von  $R$  oder  $T$ )

Idee: Klassifizierung der Sterne mit Hilfe ihrer absoluten Helligkeit und ihres Spektraltyps

⇒ Hertzsprung-Russel-Diagramm (HRD)



Spektralklassen:  $O$   $B$   $A$   $F$   
 $30\,000\text{ K} - 50\,000\text{ K}$ ,  $10\,000\text{ K} - 28\,000\text{ K}$ ,  $7\,500\text{ K} - 9\,750\text{ K}$ ,  $6\,000\text{ K} - 7\,350\text{ K}$ ,  
 $G$   $K$   $M$   
 $5\,000\text{ K} - 5\,900\text{ K}$ ,  $3\,500\text{ K} - 4\,890\text{ K}$ ,  $2\,000\text{ K} - 3\,350\text{ K}$

Sonne: G2

Sirius: A

Betelgeuze: M

→ **Die Eigenschaften von Sternen auf der Hauptreihe werden im wesentlichen nur von einem Parameter bestimmt: der Masse  $M$  dieser Sterne!**

→ Riesen: Sterne der gleichen Spektralklasse wie Hauptreihensterne, aber mit viel größerer Leuchtkraft  $L \Rightarrow R$  viel größer (vgl. (\*))

→ Dieser Größeneffekt ist spektroskopisch zu erkennen: Schwerebeschleunigung eines Stern auf seiner Oberfläche:  $g = \frac{\gamma M}{R^2}$  hat Einfluss auf die Breite von Spektrallinien des Sternes

$\Rightarrow$  Zusammenhang zwischen Linienbreite und  $R$

$\Rightarrow L$  mit Hilfe von (\*)

→ Basierend auf der Schärfe von Spektrallinien teilt man die Sterne in die Leuchtkraftklassen ein:

I: Überriesen

II: Helle Riesen

III: Riesen

IV: Unterriesen

V: Zwerge

VI: Unterzwerge

→ Kennt man die Entfernung  $D$  (und  $L$ ) kann man mit Hilfe der Linienbreite  $g$  ermitteln

$\Rightarrow$  Masse  $M$


→ empirischer Zusammenhang zwischen  $L$  und  $M$  für Hauptreihensterne:

$$\frac{L}{L_{\odot}} = \left( \frac{M}{M_{\odot}} \right)^{\frac{7}{2}} \quad (**)$$

## 2.7 Sternentwicklung




→ Energiequelle: thermonukleare Reaktionen

→ einfachster Prozess:







→ zwei Haupt-Reaktionsketten:

(i) pp-Kette ( $T < 15 \times 10^6 \text{ K}$ )



Energieerzeugungsrate  $\propto T^4$

(ii) CNO-Zyklus (Bethe-Weizsäcker):



Energieerzeugungsrate  $\propto T^{20}$

→ erzeugte Energie während des zentralen Wasserstoffbrennens:

$$E_{MS} = 0.1 M c^2 \cdot \underset{\text{Effizienz der Energieerzeugung}}{0.007}$$

„main sequence“

⇒ Lebensdauer  $t_{MS}$  eines Sterns der Hauptreihe:  $E_{MS} = L \cdot t_{MS} \Leftrightarrow$


$$t_{MS} = \frac{E_{MS}}{L} = 8 \times 10^9 \cdot \frac{\frac{M}{M_\odot}}{\frac{L}{L_\odot}} \text{ a} \stackrel{(**)}{=} 8 \times 10^9 \left( \frac{M}{M_\odot} \right)^{-\frac{5}{2}} \text{ a}$$

Stern mit  $M \approx 100 M_\odot : t_\odot \propto \underset{\substack{\text{kurz auf} \\ \text{astronomischer Zeitskala}}}{1 - 3 \text{ Ma}}$

→ **Sternentwicklung nach der Hauptreihe** in Abhängigkeit von  $M$ :

(i)  $M < 0.7 M_\odot$ : Entwicklung unbekannt, da  $t_{ns} >$  Alter des Universums (befinden sich noch auf der Hauptreihe)

- (ii)  $M < 2.5M_{\odot}$ : Helumbrennen im Kern ( $3^4\text{He} \rightarrow ^{12}\text{C}$ ) setzt ein und  
<sub>triple- $\alpha$</sub>   
 verläuft explosiv („Helium-Flash“)  
 $\Rightarrow$  stabile GG-Konfiguration mit erhöhtem Radius  $R \Rightarrow$  Roter  
 Riese oder Überriese



Brennen in Form von Pulsen  $\rightarrow$  Abstoßung der Hülle des Ster-  
 nes  $\Rightarrow$  Weißer Zwerg ( $M \sim 0.6M_{\odot}$  und  $R \sim 5000 \text{ km}$ )

- (iii)  $2.5M_{\odot} < M < 8M_{\odot}$ :
- Zentrale Helium-Brennzone + Fusion von  $^1\text{H}$  in Schale
  - Massenverlust durch Sternwind  
 $\Rightarrow$  Weißer Zwerg (falls  $M_{final} < 1.4M_{\odot}$ )
- (iv)  $M > 8M_{\odot}$ :
- CNO-Zyklus und weitere Fusionen bis zur Erzeugung von Fe im Kern
  - Eisenkern kollabiert, falls  $M_{final} > 1.4M_{\odot}$   
 $\Rightarrow$  Supernova + Neutronenstern oder schwarzes Loch

Nun bekannte wichtige Formeln:


$$\underbrace{\underbrace{\sigma T_{\text{eff}}^4 = \frac{L}{4\pi R^2} \quad S = \frac{L}{4\pi D^2}}_{\Rightarrow L}}_{\Rightarrow R} \quad g = \frac{GM}{R^2}$$

$$\frac{L}{L_{\odot}} \approx \left( \frac{M}{M_{\odot}} \right)^{\frac{7}{2}}$$

## 2.8 Enternungsbestimmungen

### 2.8.1 Trigonometrische Parallaxe

→ rein geometrische Methode



$$1 \text{ AU} = 1.496 \times 10^{13} \text{ cm}$$

(astronomische Einheit)

große Halbachse der Erde

$$\frac{r}{D} = \tan(\varphi) \approx \varphi$$

→ Def: 1 pc ist der Abstand  $D$ , der bei einem Winkelunterschied von 1 Bogensekunde vorliegt.

→ Es gilt:  $D = \left( \frac{\varphi}{1''} \right)^{-1} \text{ pc}$

⇒ Bessel 1837: Abstand zu „G1Cygni“

$\Rightarrow$  Erdbewegung der Teleskope:  $\Delta p \sim 0.01'' \rightarrow D \leq 30 \text{ pc}$   
 Satellit HIPPARCOS:  $\Delta p \sim 0.001'' \rightarrow D \leq 300 \text{ pc}$   
 aktuell: GAIA:  $\Delta p \sim 2 \times 10^{-4}''$

### 2.8.2 Eigenbewegungen

$\rightarrow$  Sterne bewegen sich relativ zur Sonne!

- radiale Komponente der Geschwindigkeit (mit Hilfe von Spektrallinien bestimmbar):

$$v_r = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \cdot c = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \cdot c$$

$\lambda$ : gemessene Wellenlänge  $\neq \lambda_0$  aufgrund der Dopplerverschiebung  
 $\lambda_0$ : Ruhewellenlänge des atomaren Übergangs (messbar im Labor)

Konnotation:

$v_r > \sigma$  Bewegung von uns weg (Rotverschiebung)

$v_r < \sigma$  Bewegung zu uns hin

$\rightarrow$  tangentielle Komponente:

messbar über die Eigenbewegung  $\mu$  des Sterns auf der Himmelssphäre  
 (in  $'' \text{ a}^{-1}$ )

$$v_t = D \cdot \mu \Leftrightarrow \frac{v_t}{\text{km s}^{-1}} = 4.74 \left( \frac{D}{1 \text{ pc}} \right) \cdot \left( \frac{\mu}{1'' \text{ a}^{-1}} \right) = \left( \frac{\text{pc}}{''} \right)$$

HIPPARCOS:  $\mu$  für ca  $10^5$  Sterne

$\Rightarrow v_t$  sowie  $D$  bekannt

$\Rightarrow$  Datenbank mit Sternengeschwindigkeiten

$\Rightarrow$  Struktur der Galaxis


### 2.8.3 Sternstromparallaxe

$\rightarrow$  Sterne eines offenen Sternhaufens haben alle eine sehr ähnliche Raumgeschwindigkeit  $\vec{v}$

→ Die Position des  $i$ -ten Sterns wird beschrieben durch:

$$\vec{r}_i(t) = \vec{r}_i(0) + \vec{v} \cdot t$$

$$\Rightarrow \text{Richtungsvektor: } \vec{n}_i(t) = \frac{\vec{r}_i(t)}{|\vec{r}_i(t)|} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \frac{|\vec{v}|}{|\vec{v}|} \hat{n}_{\text{conv}}$$



$\Psi$  ist die Sternstromparallaxe, gegeben durch den Winkel zwischen  $\hat{n}$  und  $\hat{n}_{\text{conv}}$

$$\rightarrow \text{Es gilt: } \cos(\Psi) = \hat{n} \cdot \hat{n}_{\text{conv}} = \hat{n} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

$$\Rightarrow v_r = v \cos(\Psi), \quad v_t = v \sin(\Psi)$$

$$\Rightarrow v_t = v_r \cdot \tan(\Psi)$$

$$\rightarrow \text{Weiterhin gilt: } v_t = D \cdot \mu$$

$$\Rightarrow D = \frac{v_r \tan(\Psi)}{\mu} \Rightarrow \text{Messung von } v_r \text{ und } \Psi \text{ und } \mu \text{ zwischen Beobachter und Sternhaufen}$$

→ Beispiele:

Hyaden:  $D \approx 45 \text{ pc}$

Ursa-Major  $D \approx 24 \text{ pc}$


Plejaden  $D \approx 130 \text{ pc}$

→ historisch bedeutsam, da Methode für Entfernungen  $> 30 \text{ pc}$  (unterste Sprosse der Entfernungsleiter)

#### 2.8.4 Photometrische Entfernung

- Idee: Sterne auf der Hauptreihe habe für eine gegebene Farbe die gleiche Leuchtkraft
- Für einen Sternhaufen (allen Sterne haben  $\approx$  gleiche Entfernung  $D$  von uns) kann man ein Farben-Helligkeitsdiagramm mit Hauptreihe erhalten, bei dem die scheinbare Helligkeit aufgetragen ist
- In einem zweiten Schritt erhält man das Entfernungsmodul ( $m - M$ ), indem man die Haupreihe mit einer geeichten Hauptreihe (Sternhaufen in der Nähe, z. B. Hyaden) in Übereinstimmung bringt

$$m - M = 5 \log \left( \frac{D}{\text{pc}} \right) - 5$$



→ Probleme:

- Stern wandert auf Hauptreihe während er altert
- HR-Sterne sind Zwerge der Klasse V (schwache Leuchtkraft)
- Extinktion

Extinktion: Die Beziehung zwischen absoluter und scheinbarer Helligkeit wird durch die Absorption und Streuung des Sternenlichtes geändert.



→ Strahlungstransportgleichung (→ 2.2) ohne Emission:

$$\frac{dI_\nu}{ds} = -\kappa_\nu I_\nu$$

$$\Rightarrow I_\nu(s) = I_\nu(0) \cdot e^{-\tau_\nu(s)} \text{ mit } \tau_\nu(s) = \int_0^s ds' \kappa_\nu(s') \text{ optische Tiefe}$$

→  $s_\nu = s_\nu(0)e^{-\tau_\nu(s)}$

→ Extinktionskoeffizient:

$$A_\nu := m - m_0 = -2.5 \log \left( \frac{S_\nu}{S_\nu(0)} \right) = 2.5 \log(e) \tau_\nu = 1.086 \tau_\nu$$

mit:  $m$  Magnitude mit Absorption und  $m_0$  Magnitude ohne Absorption

⇒ Quelle erscheint schwächer und ihre Farbe ändert sich, da Extinktion von  $\nu$  abhängt (via  $\kappa_\nu$ ) → Sterne erscheinen rötler als sie sind

→ Beschreibung mit Hilfe des Farbexzesses (für Filter  $X$  und  $Y$ )

$$E(X - Y) := A_X - A_Y = (X - X_0) - (Y - Y_0) = (X - Y) - (X - Y)_0$$

→ Verhältnis  $\frac{A_X}{A_Y} = \frac{\tau_{\nu,X}}{\tau_{\nu,Y}}$  hängt nur von optischen Eigenschaften des Staubes ab.

$$\Rightarrow E(X - Y) = A_X - A_Y = A_Y \left( \frac{A_X}{A_Y} - 1 \right) = A_Y \cdot \frac{1}{R_Y}$$

üblicherweise:  $X = B$  und  $Y = V$

$$\Rightarrow A_V = R_V E(B - V)$$

z.B. Staub der Milchstraße (empirisch):

$$A_V = (3.1 \pm 0.1) E(B - V)$$

In der Sonnenumgebung (innerhalb der Scheibe)

$$A_V \sim 1 \text{ mag} \frac{D}{1 \text{ kpc}}$$

⇒ nicht vernachlässigbar bei der photometrischen Entfernungsbestimmung von Sternhaufen

⇒ Prozedur in 2 Schritten:

(i) Erstelle Zweifarben-Diagramm des Sternhaufens

→ Verschiebung der HR des Sternhaufens entlang des Verfärbungsvektors bis zur Übereinstimmung der geeichten HR (ohne Absorption)

$$\Rightarrow E(B - V) \Rightarrow A_V = 3.1E(B - V)$$

(ii) Bestimmung des Entfernungsmoduls durch vertikale Verschiebung der Hauptreihe um Farben-Helligkeits-Diagramm bis zur Übereinstimmung mit einer geeichten HR.

$$m - M = 5 \log \left( \frac{D}{1 \text{ pc}} \right) - 5 + \underset{\substack{\uparrow \\ (m - m_0)}}{A_V}$$

### 2.8.5 Visuelle Doppelsterne



mit Massen  $m_1$  und  $m_2$   
Keplersches Gesetz:  $P^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{G(m_1 + m_2)}$

→ Messung von Periode  $P$  und Winkeldurchmesser der Bahn  $2\Theta$  & Bestimmung von  $m_1$  und  $m_2$  mit Hilfe ihrer spektralen Eigenschaften  
⇒  $a \Rightarrow$  Abstand  $D = \frac{a}{\Theta}$

### 2.8.6 Entfernung pulsierender Sterne

→ Verschiedene Arten pulsierender Sterne zeigen periodische Helligkeitsänderungen, wobei ihre Periode mit der Masse (und daher der Leuchtkraft) der Sterne korreliert ist.

→ Man findet (s. Übung)

$$P \sim \bar{\rho}^{-\frac{1}{2}}$$

wobei  $\bar{\rho} \sim \frac{M}{R^3}$  mittlere Dichte des Sterns

→ weiterhin gilt:  $L \sim M^3$  und  $L \sim R^3 \cdot T_{eff}$

$$\Rightarrow P \sim \frac{R^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{M}} \sim L^{\frac{7}{12}}, \text{ falls } T_{eff} = const$$

$\Rightarrow$  drei Sorten pulsierender Sterne:

(i)  $\delta$ -Cephei (klass. Cepheiden): junge Sterne

$$\mathcal{M}_\nu = -3 \log \left( \frac{P}{1 \text{ d}} \right) - 0.8 \text{ (aus Experimenten)}$$

Zur Minimierung der Extinktion und Streuung Beobachtung der  $P - L$ -Relation in Nah-IR besonders nützlich.

(ii) W Virginis Sterne (Population II, Cepheiden):

massearme, metallarme Sterne  
schwerer als Helium

(iii) RR Lyrae-Sterne (ebenfalls Population II)

Metallarm

sehr langsame Perioden  $\mathcal{M}_\nu \in [0.5; 1.0]$  mit  $\mathcal{M}_F = (-2.0 \pm 0.3) \log \left( \frac{P}{1 \text{ d}} \right) + 0.06 \cdot \left[ \frac{\text{Fe}}{\text{H}} \right] - 0.7$

I.a. für ein Element X:  $\left[ \frac{\text{X}}{\text{H}} \right] = \log \left( \frac{n(\text{X})}{n(\text{H})} \right)_* - \log \left( \frac{n(\text{X})}{n(\text{H})} \right)_\odot$  wobei  $n(\text{X})$ =  
Anzahl der Spezies X

z.B.  $\left[ \frac{\text{Fe}}{\text{H}} \right] = -1 \Rightarrow$  Eisen im Stern hat ein zehntel der solaren Häufigkeit  
Metallizität  $Z$ : Massenzahl aller Elemente schwerer als Helium

z.B.:  $Z_\odot = 0.02 \Rightarrow 98\%$  der Sonnenmasse besteht aus H und He

Ergebnis: typische astronomische Distanzen:

Sonne 1 AU  $\approx 150 \times 10^6$  km (8 min 15 s für ein Photon)

$\alpha$ Centauri 1.3 pc

Dicke der Galaxie 0.3 kpc

Abstand zum galaktischen Zentrum 8 kpc

Radius der Galaxis 12.5 kpc

nächste Galaxie 55 kpc

Andromeda M31 770 kpc

Größe eines Galaxiehaufens 1 – 5 Mpc

Zentrum des nächsten Superhaufens (Virgo) 20 Mpc


Größe eines Superhaufens 260 Mpc

sichtbares Universum 4000 Mpc

### 3 Unsere Galaxis

(=Milchstraße= $\lambda\alpha\lambda\alpha\xi\zeta$ )

#### 3.1 Struktur der Galaxis



→ stellare Populationen:

Population I (Pop I): Sterne mit Metallizität  $Z \sim 0.02 \sim Z_{\odot}$  v.a. in der dünnen Scheibe

Population II (Pop II): metallarm  $Z \sim 0.001$  v.a. in der dicken Scheibe, aber auch im Halo und im Bulge

→ Metallizität und Alter:

· extrem alte Sterne:  $\left[\frac{\text{Fe}}{\text{H}}\right] = -4.5$

· dicke Scheibe:  $\left[\frac{\text{Fe}}{\text{H}}\right] = -6.5$

· dünne Scheibe:  $\left[\frac{\text{Fe}}{\text{H}}\right] = -0.5$

· sehr junge Sterne:  $\left[\frac{\text{Fe}}{\text{H}}\right] = 1$

→ Hauptursache für die Metellanreicherung im interstellaren Medium: Supernovae!

Supernova (SN): Sternenexplosion mit hoher Leuchtkraft  $L \sim 10^9 \cdot L_{\odot}$   
(vergleichbar mit  $L_B$  einer ganzen Galaxie)

→ historische Klassifizierung anhand der spektralen Eigenschaften:

SN I keine Balmerlinien des Wasserstoffs

SN Ia starkes SiII Emission,  $\lambda = 615 \text{ nm}$

SN Ib, Ic keine SiII Emission

SN II mit Balmerlinien

→ heute bekannt:

- (i) SNII, SN Ib, c: Sternexplosion mit  $M_* \gtrsim 8M_\odot$  abgestrahlte Energie  $\sim 3 \times 10^{53} \text{ erg}$  (Neutrinos!)


1. (?) Nachweis von 10 Neutrinos der SN1987A

→ Wechselwirkung zw. Neutrino und Sternmaterie (hohe Dichte!)

⇒ Explosion der Sternhülle mit  $E_{\text{kin}} \sim 10^{51} \text{ erg} = 1 \text{ foe} = 1 \text{ Bethe}$

⇒  $10^{49} \text{ erg}$  umgesetzt in Photonen (nur Bruchteil der Gesamtenergie!)

- (ii) SN Ia: Explosion eines weißen Zerges eines Doppelsternsystems




Massentransfer (Akkrektion)  
von seinem Begleiter, bis die  
Chandrasekhar-Masse  $M_{Ch} \approx$   
 $1.44 M_\odot$  überschritten wird ⇒ SN Ia

→ homogene Anfangsbedingungen für SN Ia mit etwa gleicher Leuchtkraft

⇒ **Standardkerzen, die weithin sichtbar sind**

	neutrales Gas	dünne Scheibe	dicke Scheibe	Bulge	stellarer Halo	DM Halo
$\frac{M}{10^{10} M_{\odot}}$	0.5	6	0.2 – 0.4	1	0.15	-
$\frac{L_B}{10^{10} L_{\odot}}$	-	1.8	0.02	0.3	0.1	0
$\frac{\frac{M}{L_B}}{\frac{M_{\odot}}{L_{\odot}}}$	-	3	10	3	$\sim 1$	-
Durchmesser (kpc)	50	50	50	2	100	$> 200$
Form	$e^{-\frac{z}{h_z}}$	$e^{-\frac{z}{h_z}}$	$e^{-\frac{z}{h_z}}$	Balken?	$r^{-3.5}$	$\frac{1}{w^2+r^2}$
Skalenhöhe $h_z$ (kpc)	0.13	0.325	1.5	0.4	3	2.8
Geschwindigkeitsdispersion km/s	7	20	40	120	100	-
$\left[\frac{\text{Fe}}{\text{H}}\right]$	$> 0.1$	$-0.5 - (+0.3)$	$(-1.6) - (-0.4)$	$-1 - (-1)$	$-4.5 - (-0.5)$	-

### 3.2 Kinematik der Galaxis



→ sphärische Galaktische Koordinaten  $(l, b)$  mit der Sonne als Zentrum:  
 $l$  = galaktische Länge,  $b$  = galaktische Breite  $b = 90^\circ \hat{=}$  galaktischer Nordpol (NGP)

→ zylindrische Galaktische Koordinaten  $(R, \theta, z)$  mit Geschwindigkeitskomponenten  $(U, V, W)$

→ Körper mit der Bahnkurve  $(R(t), \theta(t), z(t))$  hat die Geschwindigkeitskomponenten:

$$U = \frac{dR}{dt}; \quad V = R \cdot \frac{d\theta}{dt}; \quad W = \frac{dz}{dt}$$

→ fiktives Ruhesystem: Local Standard of Rest (LSR) mit  $U_{\text{LSR}} = 0$ ,  $V_{\text{LSR}} = 0$ ,  $W_{\text{LSR}} = 0$   
wobei  $v_0 = V(R_0)$  Kreisbahngeschwindigkeit am Ort der Sonne entspricht

→ Pekuliargeschwindigkeit (=Geschwindigkeit relativ zum LSR):

$$\vec{v} = (u, v, w) = (U - U_{\text{LSR}}, V - V_{\text{LSR}}, W - W_{\text{LSR}}) = (U, V - V_0, W)$$

$\vec{v}_{\odot}$ : Sonnenbewegung relativ zum LSR

$$\Rightarrow \vec{v} = \vec{v}_{\odot} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Geschwindigkeit eines Sterns relativ zur Sonne}}}{\Delta \vec{v}}$$

→ Mittelwert der Pekuliargeschwindigkeitskomponenten:

$$\langle u \rangle = 0, \langle w \rangle = 0, \langle v \rangle \neq 0$$

$$\langle v \rangle = -C \cdot \langle u^2 \rangle$$


$$\Rightarrow \vec{v}_{\odot} = (-\langle \Delta u \rangle, (-C \cdot \langle u^2 \rangle - \langle \Delta v \rangle), -\langle \Delta w \rangle)$$

→ Wie kann  $C$  gefunden werden?  $\Rightarrow$  Messen von  $\langle \Delta v \rangle$  und  $\langle u^2 \rangle$  von verschiedenen Sternpopulationen





→ Asymmetrischer Drift:



- $(u, v)$ -Verteilung junger Sterne eng um  $u = v = 0$ , die für ältere Sterne breiter wird (Dispersion wg. Gravitationswechselwirkungen)
- $v \approx -220 \frac{\text{km}}{\text{s}}$  Mittelpunkt der kreisförmigen Einhüllenden der Halopopulation (mit der älteren Sterne)
- Annahme: Halo rotiert nicht (oder nur langsam)  $\Rightarrow V_0 = V(R_0) = 220 \frac{\text{km}}{\text{s}}$

→ GG-Bedingung für eine Kreisbahn: Zentrifugalkraft=Gravitationskraft

$$\Leftrightarrow \frac{mV^2}{R} = G \frac{mM}{R^2} \text{ mit } M = M(R) = \text{Masse im Inneren der Kugelschale}$$

$$\Rightarrow M(R_0) = \frac{V_0^2 R_0}{G} = 8.8 \times 10^{10} M_\odot$$


$\Rightarrow$  Umlaufzeit des LSR um die Galaxis:

$$P = \frac{2\pi R_0}{V} = 230 \times 10^6 \text{ a}$$

1. Scheibe:  $n(R, z) = n_0 \cdot \left( e^{-\frac{|z|}{h_{\text{thin}}}} + 0.02 \cdot e^{-\frac{|z|}{h_{\text{thick}}}} \right) \cdot e^{-\frac{R}{h_R}}$   
 $h_R = 3.5 \text{ kps}$   
 $h_{\text{thin}} = 325 \text{ ps}, h_{\text{thick}} = 1.5 \text{ kps}$
2. Bulge:  
 Skalenhöhe ( $\propto e^{-\frac{|z|}{h_z}}$ ):  $h_z = 0.4 \text{ kps}$   
 $I(R) = I_e \cdot e^{-7.669 \cdot \left( \left( \frac{R}{R_e} \right)^{\frac{1}{4}} - 1 \right)}$  de Vancouleurs-Profil  
 $R_e$ : Effektivradius, innerhalb dessen die Hälfte der Leuchtkraft emittiert wird.
3. Stellarer Halo:  
 $n(r) \propto r^{-3.5}$  Dichteverteilung  
 mit de Vancouleurs-Profil:  $r_e \approx 3 \text{ kps}$
4. DM Halo:  
 quasi-isothermal:  $n(r) \propto \frac{1}{a^2 + r^2}, a = 12 \text{ kps}$   $\begin{pmatrix} a & \text{definiert} \\ n & \text{bei } r = 0 \end{pmatrix}$   
 Navarro-Frenk-White Modell:  $n_{NFW} \propto \frac{1}{\frac{r}{r_s} \left( 1 + \frac{r}{r_s} \right)^2} r_s \approx 12 \text{ kps}$

### 3.3 Die Rotationskurve der Galaxis

→ Motivitation: Bestimmung der Rotationsgeschwindigkeit  $V = V(R)$  as Funktion des Abstands  $R$  von galaktischem Zentrum (GC)



→ (kreisförmige) Bewegung in der galaktischen Ebene:  $\vec{r} = R \begin{pmatrix} \sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix}, \vec{V} = \dot{\vec{r}} = V(R) \cdot \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ -\sin(\theta) \end{pmatrix}$

→ Mit Hilfe der Abbildung:  $\vec{r} = \begin{pmatrix} D \cdot \sin(l) \\ R_0 - D \cdot \cos(l) \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \sin(\theta) = \frac{D}{R} \sin(l) \\ \cos(\theta) = \frac{R_0}{R} - \frac{D}{R} \cos(l)$$

$$\text{mit } \vec{V}_\odot \approx \vec{V}_{\text{LSR}} = \begin{pmatrix} V_0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Delta \vec{V} = \vec{V} - \vec{V}_\odot = \begin{pmatrix} V \frac{R_0}{R} - V \frac{D}{R} \cos(l) - V_0 \\ -V \frac{D}{R} \sin(l) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_0 - (\Omega - \Omega_0) - \Omega \cdot D \cdot \cos(l) \\ -\Omega D \sin(l) \end{pmatrix}$$

$$\text{mit } \Omega(R) = \frac{V(R)}{R} \text{ der Winkelgeschwindigkeit } \Omega_0 = \frac{V_0}{R_0}$$

→ Komponenten der Relativbewegung zwischen Sonne und Objekten ergibt sich durch Projektion von  $\vec{V}$  :

$$v_r = \Delta \vec{V} \cdot \begin{pmatrix} \sin(l) \\ -\cos(l) \end{pmatrix} = (\Omega - \Omega_0) \cdot R_0 \cdot \sin(l) \quad \text{Radialgeschwindigkeit}$$

$$v_t = \Delta \vec{V} \cdot \begin{pmatrix} \cos(l) \\ \sin(l) \end{pmatrix} = (\Omega - \Omega_0) \cdot R_0 \cdot \cos(l) - \Omega \cdot D \quad \text{Tangentialgeschwindigkeit}$$

Messung von  $l$  und  $v_r$  (Dopplereffekt, siehe 2.8.2) möglich über Eigenbewegung  $\mu = \frac{v_t}{D}$  (siehe 2.8.2) erhält man  $\Omega$  und  $D$

$$\rightarrow R = \sqrt{R_0^2 + D^2 - 2R_0 D \cos(l)}$$

→ Problem: Nicht möglich bei großen  $D$  wegen Extinktion in der galaktischen Scheibe ( $A_v \sim 28 \text{ mag}$ )

→ Für kleine  $D \ll R_0$ , lineare Näherung:

$$(\Omega - \Omega_0) \approx \left( \frac{d\Omega}{dR} \right) |_{R_0} \cdot (R - R_0) + \dots$$

$$\Rightarrow v_r = (R - R_0) \frac{d\Omega}{dR} |_{R_0} \cdot R_0 \sin(l)$$

$$= (R - R_0) \frac{d}{dR} \left( \frac{V}{R} \right) |_{R_0} \cdot \sin(l)$$

$$\approx \left( \left( \frac{dV}{dR} \right)_{R_0} - \frac{V_0}{R_0} \right) \cdot \sin(l) (R - R_0)$$

$$\text{und } v_t = \left( \left( \frac{dV}{dR} \right) |_{R_0} - \frac{V_0}{R_0} \right) \cdot (R - R_0) \cos(l) - \Omega_0 \cdot D$$

Für  $(R - R_0) \ll R_0 \Rightarrow R_0 - R \approx D \cos(l)$


$$\Rightarrow v_r = AD \sin(l), \quad v_t = AD \cos(2l) + B \cdot D$$

mit den Oortschen Koordinaten:

$$A := -\frac{1}{2} \left[ \left( \frac{dV}{dR} \right)_{R_0} - \frac{V_0}{R_0} \right]$$

$$B := -\frac{1}{2} \left[ \left( \frac{dV}{dR} \right)_{R_0} + \frac{V_0}{R_0} \right]$$

$$\Rightarrow \Omega_0 = \frac{V_0}{R_0} = A - B, \quad \left( \frac{dV}{dR} \right)_{R_0} = -(A + B)$$





Messung ergibt:

$$A = (14.8 \pm 0.8) \frac{\text{km}}{\text{s}} \frac{1}{\text{kps}}$$

$$B = (-12.4 \pm 0.6) \frac{\text{km}}{\text{s}} \frac{1}{\text{kps}}$$

→ Bestimmung von  $V(R)$  für  $R < R_0$ :



⇒ Messung von  $v_r$  mit Hilfe der 21 cm Emissionslinie von neutralem Wasserstoff (galaktische Scheibe transparent für Radiowellen) mit Hilfe des Doppler-Effekts

→ Unter der Annahme, dass sich das Gas der Galaxis auf Kreisbahnen um das GC bewegt, ist zu erwarten, dass für die Wolke im Tangentialpunkt (Wolke 3 im Bild) die gesamte Geschwindigkeit auf  $v_r$  projiziert wird und sie daher die größte Radialgeschwindigkeit aufweist:

$$D = R_0 \cos(l), R_{\min} = R_0 \sin(l) \text{ und}$$


$$V_{r,max} = (\Omega(R_{\min}) - \Omega_0) R_0 \sin(l) = V(R_{\min}) - V_0$$

$$\Rightarrow V(R) = \frac{R}{R_0} + V_0 + V_{r,max}|_{\sin(l)=\frac{R}{R_0}}$$

$A \neq 0 \Rightarrow$  Galaxis rotiert nicht starr.

→ Bestimmung von  $V(R)$  für  $R > R_0$ :  $v_r$  Messung an Objekten deren Entfernung  $D_{max}$  bestimmen kann, z.B. Cepheiden

Resultat:



→ Die Rotationskurve fällt nach außen hin ab, trotz einer Stern- und Gasdichte, die exponentiell abfällt:

$$n(R, z) \approx n_0 e^{-\frac{|z|}{h_z}} e^{-\frac{R}{h_R}} \text{ mit } h_z \approx 0.3 \text{ kps}, h_R \approx 3.5 \text{ kps}$$

→ wenn es nur sichtbare Materie gäbe, würde Ian + Kepler gelten:  $V(R) \sim R^{-\frac{1}{2}}$

→ aber man erhält  $V(R) \sim \text{const.} \Rightarrow M(R) \sim R$   
 ⇒ „dunkle Materie“ (?)

### 3.4 Die Welt der Galaxien

- Erkenntnis, dass die Milchstraße nur eine Galaxie von viele ist  $\sim 100$  Jahre alt
- vorher: Katalog von Charles Messier (1730-1817)
- enthält 103 diffuse Objekte (z.B. M31: Andromeda-Galaxie)
- 19. Jhd.: NGC=New General Catalogue, John Preyer (1852-1926)
- 1925: Beobachtung von Cepheiden in M31 durch Edwin Hubble

$$\Rightarrow D = 285 \text{ kps (Aktueller: 770 kps)}$$

1928: Beobachtung des Auseinanderstrebens der Galaxien

Hubble'sche Gesetz:

$$v = H_0 \cdot r \text{ mit } H_0 \simeq 72 \frac{\text{km}}{\text{s}} \cdot \frac{1}{\text{Mps}} \text{ der Hubble'schen Konstante}$$

- Morphologische Klassifizierung (Hubble-Sequenz)




Abbildung 1:  $E_0 \dots E_7$




Abbildung 2:  $S_0$




Abbildung 3:  $S_a$




Abbildung 4:  $S_b$




Abbildung 5:  $S_c$




Abbildung 6:  $S_{Ba}$




Abbildung 7:  $S_{Bb}$




Abbildung 8:  $S_{Bc}$

Elliptische Galaxien E

Spiralgalaxien mit und ohne Balken (S,S<sub>B</sub>)

Irreguläre Galaxien I

Milchstraße S<sub>Bbc</sub>

### 3.4.1 Elliptische Galaxien Allgemein

Normale Ellipsen:  $E$  mit Elliptizität  $0 \leq \epsilon \leq 0.7$

$E_n$  wobei  $n = 10 \epsilon \Rightarrow E_0 - E_7$

→  $S_0$  Galaxien: Übergang zwischen Elliptischen und Spiralgalaxien (linsenförmig mit Bulge und Scheibe ohne Spiralarme)

→ CD Galaxien elliptische Riesengalaxien

	$E$	$S_0$	$CD$
Absolute Helligkeit	$-15 - (-23)$	$(-17) - (-22)$	$(-22) - (-25)$
$\frac{M}{M_0}$	$100 - 10^{13}$	$10^{10} - 10^{12}$	$10^{13} - 10^{14}$
$\frac{2R}{\text{kps}}$	$1 - 200$	$10 - 100$	$300 - 1000$
$\frac{\frac{M}{L_B}}{\frac{M_\odot}{L_\odot}}$	$10 - 100$	$\sim 10$	$> 100$

→ Leuchtkraft: de Vancouleurs-Profil:  $\log \left( \frac{I(R)}{I_0} \right) = -3.3307 \left( \left( \frac{R}{R_e} \right)^{\frac{1}{4}} - 1 \right)$

$I(R)$ : Flächenhelligkeit in  $\frac{L_\odot}{\text{ps}^2}$

$R_l$ : Effektivradius, mit  $\int_0^{R_l} dR R I(R) = \frac{1}{2} \int_0^\infty dR R I(R)$

→ woher kommt die Abplattung der Elliptischen Galaxie?

i) Rotation? In diesem Fall gelte:  $\frac{rot}{\sigma} \approx \sqrt{\frac{\epsilon}{1-\epsilon}}$

**Aber:** Beobachtet  $v_r \ll \sigma$

ii) Selbst gravitierendes Gleichgewichtssystem (Elliptizität ergibt sich aus den Anfangsbedingungen) Zeitlich stabil? → „thermalisierung“ durch 2er Stöße?

→ Betrachte Relaxationszeit durch 2er Stöße in einem System von  $N$  Sternen der Masse  $m$  (Gesamtmasse  $M = N \cdot m$ ) der Ausdehnung

$$R: t_{relax} = \frac{R}{v} \cdot \frac{N}{\ln(N)} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{charakteristische Zeit} \\ \text{eines Sterns beim durchqueren}}}{t_{cross}} \cdot \frac{N}{\ln(N)}$$

charakteristische Zeit, in der ein Stern durch 2er-Stöße seine Richtung um  $90^\circ$  ändert

für eine Galaxie  $N \sim 10^{12}$ ,  $t_{cross} \approx 10^8 \text{a} \Rightarrow t_{relax} \approx 14 \times 10^9 \text{a}$  (älter als Universum)  $\Rightarrow$  stabil



### 3.4.2 Spiralgalaxien

	$S_a$	$S_b$	$S_c$	$S_d$
$M_B$	$-17 - (-23)$	$-17 - (-23)$	$(-10) - (-22)$	$(-15) - (-20)$
$\frac{M}{M_\odot}$	$10^9 - 10^{12}$	$10^9 - 10^{12}$	$10^9 - 10^{12}$	$10^8 - 10^{10}$
$\frac{L_B}{L_\odot}$	$6.0 \pm 0.6$	$4.5 \pm 0.4$	$2.6 \pm 0.2$	$-1$
$\frac{L_{Bulge}}{L_{tot}}$	$0.3$	$0.13$	$0.05$	$-$
$\frac{2R}{kps}$	$5 - 100$	$5 - 100$	$5 - 100$	$0.5 - 50$
$\frac{v_{max}}{(\frac{km}{s})}$	$300$	$220$	$175$	$-$

Profil des Bulges folgt einem de Vancouleurs-Profil:

Mit Flächenhelligkeit  $U \sim 2.5 \log(I)$  :

$$M_{Bulge}(R) = U_e + 8.326 \cdot \left( \left( \frac{R}{R_e} \right)^{\frac{1}{4}} - 1 \right)$$

$$M_{Scheibe}(R) = U_0 + 1.09 \left( \frac{R}{n_R} \right)$$

Ian Freeman:  $U_0$  ist konstant für verschiedene Spiralgalaxien

$$S_a - S_c: U_0 = 21.5 \pm 0.39 \frac{\text{mag}}{\text{arcs}^2}$$

$$S_d: U_0 = 22.07 \pm 0.4 \frac{\text{mag}}{\text{arcs}^2}$$

→ Rotationsachsen von Spiralgalaxien verlaufen nicht wie durch die Lichtverteilung erwartet für  $R \geq n_R$ , sondern im wesentlichen flach, (vgl. Kap 3.3)

⇒ Spiralgalaxien sind von einem Halo dunkler Materie umgeben!  
Es gilt (Gleichgewicht zwischen Zentrifugal- und Gravitationskraft):

$$V^2(R) = \frac{G \cdot M(R)}{R} \quad \text{Gesamtmasse von } R$$

für sichtbare Materie:

$$V_{enm}^2 = \frac{GM_{enm}(R)}{R} \Rightarrow V_{dark}^2 = V^2 - V_{enm}^2 = \frac{G \cdot M_{dark}}{R}$$

$$\Rightarrow M_{dark}(R) = \frac{R}{G} (V^2(R) - V_{enm}^2(R))$$

- Problem: äußerer Radius ist Halo und daher nicht klar  
Sterne:  $R \geq 40 \text{ kps}$   
Satelliten:  $R \geq 140 \text{ kps}$

Zusammensetzung:

Elliptische Galaxien: alte Sterne (orange und rot)

Spiralgalaxien: Bulge ähnlich wie elliptische Galaxien, Spiralarme mit geringem blauanteil

### 3.4.3 Skalengesetze

Tully-Fisher (177)

$$L \sim V_{max}^4$$

- Korrelation zwischen maximaler Rotationsgeschwindigkeit von Spiralen und Leuchtkraft

⇒ recht genaue Abschätzung der Leuchtkraft aus der Rotationskurve der Galaxie

- Durch Vergleich mit scheinbarer Helligkeit ⇒ Abstand

- heuristische Herleitung:

Rotationskurve bei  $V(R) = const.$  impliziert

$$M = \frac{V_{max}^2 \cdot R}{G} \Rightarrow L = \left(\frac{M}{L}\right)^{-1} \cdot \frac{V_{max} \cdot R}{G}$$

mittlere Flächenhelligkeit:  $\langle I \rangle = \frac{L}{R^2}$

$$\Rightarrow L = \left(\frac{M}{L}\right)^{-1} \cdot \frac{V_{max} \cdot R}{G \cdot M} \cdot \frac{V_{max} \cdot R}{G} = \left(\frac{M}{L}\right)^{-2} \cdot \frac{V_{max}}{G} \cdot \frac{1}{\langle I \rangle}$$

Freeman:  $\langle I \rangle \sim const.$  für Spiralgalaxien

$\frac{M}{L}$  variiert nur wenig ⇒  $L \sim V_{max}^4$

(kein Beweis, aber macht Skalengesetz plausibel)

### 3.4.4 Schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien

→ Was ist ein schwarzes Loch?

Laplace (1795) Fluchtgeschwindigkeit eines Objektes von der Oberfläche eines Himmelskörpers der Masse  $M$  und Radius  $R$ :

$$v_{\text{Flucht}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Bei genügend kleinem Radius  $v_{\text{Flucht}} = c = \text{Lichtgeschwindigkeit}$

→ Schwarzschildradius:  $R = \frac{2GM}{c^2} \leadsto 3 \cdot 10^4 \left( \frac{M}{M_{\odot}} \right) \text{ cm}$

z.B. für Sonne:  $3 \cdot 10^5 \text{ cm}$  (3 km)

Definition: Ein Schwarzes Loch hat einen Radius von  $R < R_{BH}$

Nachweis schwarzer Löcher?

indirekt über Detektion kompakter Massenkonzentration

$M_0$  mit Geschwindigkeitsdispersion  $\sigma$

Charakteristische Rotationsgeschwindigkeit im Abstand  $R$ :

$$V \sim \sqrt{\frac{G \cdot M_0}{R}} \text{ für Abstände } R \leq R_{BH} := \frac{GM}{\sigma^2} \sim 0.4 \left( \frac{M_0}{10^6 M_{\odot}} \right) \left( \frac{\sigma}{100 \frac{\text{km}}{\text{s}}} \right)^{-2} \text{ ps}$$

wird der Einfluss des SMBH auf die Kinematik der Systeme bemerkbar

$$\Rightarrow \text{zugehöriger Winkel} = \theta_{BH} = \frac{R_{BH}}{D} \sim 0.1 \left( \frac{M_0}{10^6 M_{\odot}} \right) \left( \frac{\sigma}{100 \frac{\text{km}}{\text{s}}} \right)^{-2} \left( \frac{D}{\text{Mpc}} \right)^{-1}$$

$$\Rightarrow \sigma \text{ steigt an wie } \sqrt{R} \text{ für } R \leq R_{BH}$$

Empirisch findet man:

$$M = 1.2 \times 10^8 M_{\odot} \left( \frac{\sigma}{200 \frac{\text{km}}{\text{s}}} \right)^{3.75}$$

kann für relativ nahe Galaxien detektiert werden

### 3.5 Extragalaktische Entfernungsbestimmungen

- $\exists$  Methoden für verschiedene Längenskalen
- 1. Schritt: Bestimmung der Entfernung zur großen Magellanschen Wolke (LMC)
- Supernova SN1987A  $\Rightarrow$  beleuchtet einen elliptischen Ring  
Ring der aus Material stammt, das vom Vorläuferstern der SN herausgeschleudert wurde  
Elliptizität aufgrund geometrische Projektion (intrinsisch Kreisförmig)  
Aufleuchten des Rings nicht gleichförmig, da uns das Licht von dem Teil des Rings, der näher ans uns ist, früher erreicht  $\Rightarrow \frac{\text{Licht auf Verzögerung}}{\text{Licht an Verzögerung}}$  &  
Inklinationswinkel des Rings  $\Rightarrow$  Durchmesser des Rings  $\Rightarrow$  Abstand  
 $D_{LMC} = 51.8 \text{ kps} \pm 6 \%$   
Aktuell (2019)  $49.59 \pm 0.09(tot) \pm 0.54(system) \text{ kps} (\pm 0.8 \%)$
- Eichung der Perioden-Leuchtkraft-Relation der Cepheiden (28.6) mit Hilfe der LMC, zur Entfernungsmessung weiter entfernter Galaxien
- sekundäre Entfernungsindikatoren (Entfernungsindikatoren Entfernungsverhältnis z.B. über Skalengesetz Tully-Fischer, Farber-Jackson)

## 4 Homogene Isotrope Weltmodelle

- **Ziel:** Verständnis des Universums auf großen Skalen
- Schwierigkeiten:
  - $\exists$  nur ein Universum
  - große Entfernung  $\Rightarrow$  lichtschwache Quellen
  - $\Rightarrow$  Erkenntnisgewinn durch Entwicklung großer Teleskope ( $\varnothing > 8 \text{ m}$ )
- **wichtigster Aspekt** für Beobachtungen: endliche Lichtgeschwindigkeit  $\Rightarrow$  Beobachtungen von entfernten Objekten erlauben in die Vergangenheit zu schauen!

## 4.1 Grundlegende Beobachtungen auf kosmologischen Skalen

- (I) Nachts ist es dunkel (Olders Paradoxon)
- (II) Lichtschwache (weiter entfernte) Galaxien sind am Himmel Gleichförmig verteilt
- (III) Spektrallinien in Spektren von Galaxien zeigen eine systematischen Verschiebung

$$z := \frac{\lambda_B - \lambda_0}{\lambda_0} \quad \lambda := \text{Wellenlänge der Spektrallinie im Ruhesystem (Laborsystem)}$$

$\lambda_B$  := von Beobachtern gemessene Wellenlänge


$\Rightarrow \lambda_B = (1 + z)\lambda_0$  i.d.  $z > 0 \rightarrow$  Rotverschiebung (Ausnahme: Gleichgewicht nahe Galaxien, M31) f+r kleinere  $z$  gilt für die Relativgeschwindigkeit  $v \approx z \cdot c$

Hubble-Gesetz:  $v = \overset{\substack{\uparrow \\ \text{Hubble-Konstante}}}{H_0} \cdot D$  zur Galaxie

$$\Rightarrow D \approx 1000 \cdot z h^{-1} \text{Mps (falls } z \ll 1)$$

- (IV) In fast allen Kosmischen Objekten beträgt der Massenanteil von Helium etwa 25 – 30 %
- (V) Die ältesten Sternhaufen in unserer Galaxis haben ein Alter von  $\sim 12 \times 10^9$  a

$\rightarrow$  mit Hilfe des Hertzsprung-Russel-Diagramms



Sterne der Masse, für die das Lebensalter der Hauptreihe gleich dem Alter des Sternhaufens ist  $\rightarrow$  Alter des Sternhaufens durch Vergleich mit theoretischem Modell der Sternentwicklung

- (VI)  $\exists$  eine Mikrowellenstrahlung (kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, im B) isolation bis auf fluktuation der relativen Stärke  $\sim 10^{-5}$
- (VII) Spektrum dieser Hintergrundstrahlung entspricht einer perfekten Schwarzkörperstrahlung mit Temperatur  $T = 2.728 \pm 0.004 \text{ K}$
- (VIII) Die Anzahl dicht von Radioquellen mit Fluss folgt mit den einfachen Gesetzen  $N(> s) \propto s^{-\frac{3}{2}}$  (Beobachtet bei hoher galaktischen Breite) um Quellen der Milchstraße auszuschließen

**Ziel:** Entwicklung eines kosmologischen Modells, das diese Beobachtungen erklärt

## 4.2 Ist das Universum unendlich, euklidisch und statisch?

$\rightarrow$  Naive Annahme eines

- räumliche unendlichen
- euklidischen
- statischen

Universums ist im Widerspruch zu (I) und (VIII)

Zu (I) Olbers-Paradoxon:

Der Nachthimmel in solch einem Universum wäre (ungemütlich) hell!

- Betrachte dazu:

$n_*$ : mittlere Anzahldichte der Sterne

$R_*$ : mittlerer Radius eines Sterns

- Eine Kugelschale mit Radius  $r$  und Dicke  $dr$  um die  $\odot$  enthält  $4\pi r^2 n_* dr$  Sterne, jeder mit Raumwinkel  $\frac{\pi R_*^2}{r^2} \Rightarrow$  gesamter von  $*$  eingenommener Raumwinkel:  
 $d\omega = 4\pi r^2 dr n_* \frac{\pi R_*^2}{r^2} = 4\pi^2 n_* R_*^2 dr$  unabhängig von  $r \Rightarrow$  im gesamten Universums  $\omega = \int_0^\infty dr \frac{d\omega}{dr} = 4\pi^2 n_* R_*^2 \int_0^\infty dr = \infty !$
- Offensichtlich haben wir den Effekt von sich überlappenden Sternscheiben an der Sphäre nicht berücksichtigt  
 $\Rightarrow$  Jedoch zeigt diese Betrachtung, dass der Himmel von Sternscheiben vollständig gefüllt wäre  
 $\Rightarrow$  Der Himmel wäre so hell wie die Oberfläche eines typischen Sterns (z.B. die Sonne)

zu (VIII)

- Sei  $n(> L)$  die räumliche Anzahldicke von Radioquellen mit Leuchtkräften  $> L$ .
- eine Kugelschale mit Radius  $r$  und Dicke  $dr$  um die  $\odot$  enthält wiederum  $4\pi r^2 dr n(> L)$  Quellen
- $L = 4\pi r^2 \cdot S$ , mit  $S$ : beobachteter Fluss  
 $\Rightarrow dN(> S) = 4\pi r^2 dr n(> (4\pi r^2 S))$   
 $\Rightarrow N(> S) = \int_0^\infty dr 4\pi r^2 n(> (4\pi r^2 S)) \underset{r=\sqrt{\frac{L}{4\pi S}}}{=} \int_0^\infty \frac{dL}{2\sqrt{4\pi L S}} \frac{L}{4\pi S} n(> L)$   
 $= \frac{1}{16\pi^{\frac{3}{2}}} S^{-\frac{3}{2}} \int_0^\infty DL \sqrt{L} n(> L) \propto S^{-\frac{3}{2}}$   
 $\Rightarrow$  Wenigstens eine der drei Ausgangshypothesen ist falsch.  
 Rotverschiebung der Galaxien/Hubble-Gesetz  $\Rightarrow$  nicht-statisches Universum

zu (V)  $\Rightarrow$  Alter des Universums  $> 12 \times 10^9$  a zu (II) und (IV)  $\Rightarrow$  Das Universum scheint auf ausreichend großen Skalen isotrop zu sein.

$\rightarrow$  Falls unser Standort im Kosmos nicht ausgezeichnet ist

$\Rightarrow$  Das Universum ist auch homogen.

### Kosmologisches Prinzip: Das Universum ist homogen und Isotrop

- Homogenität ist nicht direkt beobachtbar und auf kleinen Skalen hin-fällig (bis zu  $\sim 100 \text{ h}^{-1} \text{ Mpc}$ ), allerdings bisher keine Hinweise auf Struk-turen  $\gg 100 \text{ h}^{-1} \text{ Mpc}$
- Dies ist klein im Vergleich zum Hubble-Radius (= charakteristische Größe des beobachtbaren Universums)

$$R_H = \frac{c}{H_0} = 3000 \text{ h}^{-1} \text{ Mpc}$$

$\Rightarrow$  Homogenität und Isotropie auf Skalen von  $(100-3000) \text{ h}^{-1} \text{ Mps}$   
 $\uparrow$   
 1. Annäherung (später zu präzisieren)



### 4.3 Ein expandierendes Universum

→ Betrachte eine homogene Kugel der Massendichte  $\rho = \rho(t)$

→ Ort eines Volumenelements:

$$\vec{r}(t) = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Skalenfaktor} \\ a(t_0)=1, t_0 \hat{=} \text{heute}}}{a(t)} \vec{r}(t_0)$$

⇒ Position eines mitbewegten Beobachters mit Weltlinie  $(\vec{r}, t) = (a(t) \cdot \vec{r}_0, t)$  und Geschwindigkeit

$$\vec{v} = \frac{d}{dt} \vec{r} = \frac{da}{dt} \cdot \vec{r}_0 = \frac{\dot{a}}{a} \cdot \vec{r}(t) =: H(t) \cdot \vec{r}(t)$$

↷ Expansionsrate:  $H(t) := \frac{\dot{a}}{a}$

→ insbesondere Relativgeschwindigkeit zweier mitbewegter Punkte:

$$\Delta \vec{v} = \vec{c}(\vec{r} + \Delta \vec{r}, t) - \vec{v}(\vec{r}, t) = H(t) \cdot \Delta \vec{r}$$

≡ Verallgemeinerung des Hubble-Gesetzes, für das gilt:  $H(t_0) = H_0$

#### 4.3.1 Newtonsche Kosmologie

→ Radius  $\vec{r}(t) \equiv a(t)r$  einer Kugel der Masse:

$$M(r_0) = \frac{4\pi}{3} \rho_0 r_0^3 = \frac{4\pi}{3} \rho(t) (a(t) \cdot r_0)^3$$

$$\Rightarrow \rho(t) = \rho_0 \cdot a(t)^{-3}$$

→ Bewegungsgleichung:

$$r''(t) = -\frac{G \cdot M(r_0)}{r^2} = -\frac{4\pi G}{3} \frac{\rho_0 \cdot r_0^3}{r^2}$$

$$\ddot{a} = \frac{\ddot{r}}{r} = -\frac{4\pi G}{3} \rho \cdot a \quad \text{unabhängig von } r_0$$

→ „Energieerhaltung“:

$$\dot{a}^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_0 \frac{1}{a} - K \cdot c^2$$

$$= \frac{8\pi G}{3} \rho(t) \cdot a(t) - K c^2$$

mit  $K \propto$  Gesamtenergie eines mitbewegten Teilchens

- wenn  $K < 0 \Rightarrow \dot{a} > 0 \Rightarrow$  Universum expandiert ewig
- wenn  $K > 0 \Rightarrow \dot{a} < 0 \Rightarrow$  bei größeren  $t \Rightarrow$  Universum rekollabiert
- wenn  $K = 0 \Rightarrow$  kritische Dichte:

$$\left( \frac{\dot{a}(t_0)}{a(t_0)} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_0$$

$$\Rightarrow \rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \approx 1.88 \times 10^{-29} \text{ h}^2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$\Rightarrow \text{Dichteparameter: } \Omega_0 := \frac{\rho_0}{\rho_c}$$

#### 4.3.2 Relativitätstheorie

→ **Relativitätsprinzip** (Einstein 1905):

Die Naturgesetze haben in allen Inertialsystemen die selbe Form.

→ betrifft Wechsel zwischen Bezugssystemen mit konstanter Relativgeschwindigkeit ( $\Rightarrow$  spezielle Lorentz-Transformation)

→ daraus folgende Vorhersagen wurden spektakulär nachgewiesen (Längenkontraktion, Zeitdilatation, etc.) und betrifft alle Untergebiete der modernen Physik

→ Für die Kosmologie muss die Gravitation miteinbezogen werden, da es die einzige **bekannte** Kraft ist, die auf kosmischen Distanzen wirkt

→ **Äquivalenzprinzip** (Einstein 1914):

In jedem Punkt der Raumzeit (mit und ohne Gravitationsfelder) kann man ein (in Zeit und Raum) **lokales** Inertialsystem so wählen, dass die physikalischen Gesetze denen eines unbeschleunigten kartesischen Bezugssystems entsprechen

→ Mathematisch kann gezeigt werden, dass die Gravitation die Geometrie der Raumzeit beeinflusst

(i) **ohne** Gravitation:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

(ii) **mit** Gravitation:

$$ds^2 = \sum_{\mu, \nu=0}^3 g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad \text{mit } x^\mu = (c \cdot t, x, y, z)$$

→ Der metrische Tensor  $g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$  bestimmt die geometrischen Eigenschaften der Raumzeit


→  $g_{\mu\nu}$  ergibt sich aus den Einstein'schen Feldgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie → 10 nichtlineare, partielle, gekoppelte Differentialgleichungen für die 10 unabhängigen Komponenten der Metrik

$$\begin{array}{ccccc} G_{\mu\nu} & = & \kappa & \cdot & T_{\mu\nu} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \text{Einstein-Tensor} & & \text{Konstante} & & \text{Energieimpulstensor} \\ \text{enthält } g_{\mu\nu} \text{ und} & & \text{(ergibt sich aus} & & \\ \text{ihre 1. und 2. Ableitungen)} & & \text{dem gewählten} & & \\ & & \text{Einheitensystem)} & & \\ & & \kappa = \frac{8\pi G}{c^4} \text{ [SI]} & & \end{array}$$


$$\begin{aligned} G_{\mu\nu} &= R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \\ R_{\mu\nu} &= \sum_{\alpha=0}^3 R_{\mu\alpha\nu}^\alpha \quad R = \sum_{\mu, \nu=0}^3 g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \\ R_{\nu\sigma\tau}^\mu &= \partial_\sigma \Gamma_{\nu\tau}^\mu - \partial_\tau \Gamma_{\nu\sigma}^\mu + \sum_{\alpha=0}^3 \Gamma_{\sigma\alpha}^\mu \Gamma_{\nu\tau}^\alpha - \sum_{\alpha=0}^3 \Gamma_{\tau\alpha}^\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\alpha \\ \Gamma_{\mu\nu}^\sigma &= \sum_{\alpha=0}^3 \frac{1}{2} g^{\sigma\alpha} (\partial_\nu g_{\alpha\mu} + \partial_\mu g_{\alpha\nu} - \partial_\alpha g_{\mu\nu}) \end{aligned}$$

### 4.3.3 Gekrümmte Räume

→ Die Ebene ist flach, Vektoren können parallel verschoben werden, ohne dass sie ihre Richtung ändern




→ Ist die Kugel flach?





Parallelverschiebung von  $\vec{v}$  liefert nach Abschluss des gestrichelten Weges den Vektor  $\vec{v}'$  und dann mit Verschiebung entlang des Äquators den Vektor  $\vec{v}'' = -\vec{v}$

→ Weitere Beispiele:



$$C < 2\pi a$$



$$C = 2\pi a$$

→ Wie kann man Krümmung messen?

to Vergleich von Kreisumfang  $C$  und Kreisfläche  $A$  eines Kreises mit Radius  $a$

Kugel	$C < 2\pi a$	$A < \pi a^2$	positiv
Ebene	$C = 2\pi a$	$A = \pi a^2$	null (=flach)
Sattel	$C > 2\pi a$	$A > \pi a^2$	negativ

**Krümmung ist eine intrinsische Eigenschaft!**

d.h. man kann nie messen, ohne den „Raum“ zu verlassen (essentiell in der Kosmologie)

#### 4.3.4 Modifikation der Newtonschen Kosmologie

(a) Äquivalenz von Masse und Energie ( $E = mc^2$ )

$\Rightarrow \rho$  in den kosmologischen Bewegungsgleichungen enthält nicht nur die Materiedichte

(b) Die Einsteinschen Feldgleichungen der ART erlauben einen zusätzlichen Term, die **Kosmologische Konstante**  $\Lambda$

(c) Die Interpretation der Expansion des Kosmos ändert sich: Das Universum ist keine expandierende Kugel, sondern der **Raum selbst expandiert**

$\Rightarrow$  Die Rotverschiebung ist eine Eigenschaft der expandierenden Raumzeit ( $a = a(t)$  = Skalenfaktor)

$\rightarrow$  **Erster Hauptsatz der Thermodynamik**

$$\begin{array}{ccccc} dU & = & - & P & \cdot & dV \\ \uparrow & & & \uparrow & & \uparrow \\ \text{Änderung der} & & & \text{Druck} & & \text{(adiabatische)} \\ \text{inneren Energie} & & & & & \text{Volumenänderung} \end{array}$$

Aus den Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie folgt eine analoge Relation für einen homogenen und isotropen Kosmos:

$$\frac{d}{dt} \left( \underbrace{c^2 \rho}_{\text{Energiedichte}} a^3 \right) = -P \cdot \frac{d(a^3)}{dt}$$

(d.h. für „normale“ Materie ist  $\rho$  die Massendichte,  $P$  der Druck der Materie und  $V = a^3(t) \cdot V_0$  das Volumen)

$\rightarrow$  Die Friedmann-Lemaître Expansionsgleichung:

$$\left( \frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{Kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda}{3} \quad (F1)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left( \rho + \frac{3P}{c^2} \right) + \frac{1}{3} \quad (F2)$$

· Unterschiede zu Newton:

(i) zusätzlicher Druckterm um (F2)

(ii) kosmologische Konstante

→ Die **Kosmologische Konstante**: NB: Falls  $\Lambda = 0$ , gibt es keine Lösung der Friedmann-Lemaître-Gleichungen mit  $\dot{a} = 0$  (siehe Übungsblatt 7, Aufgabe 2)

⇒  $\Lambda \neq 0$  eingeführt von Einstein um das statische Universum zu retten"

1923 Eddington diskutiert die Möglichkeit eines nicht statischen Universums

1929 Hubble beobachtet eine systematische Expansion

Quantenfeldtheorie: auch das Vakuum enthält eine nicht verschwindende Energie

⇒ mathematisch äquivalent zu  $\Lambda \neq 0$  (aber Größenordnungen stimmen nicht!)

#### 4.3.5 Die Materiekomponenten des Universums

→ Druckfreie Materie („Staub“)

$$P_m = 0$$

Druck eines Gases  $\propto$  thermische Bewegung

z.B. Moleküle der Luft mit  $v \sim v_{\text{Schall}} \sim 300 \frac{\text{m}}{\text{s}} \Rightarrow P_m \ll \rho_m c^2$

→ Strahlung  $P_r = \frac{1}{3} \rho_r c^2$

z.B. Photonen des CMB

→ Vakuumenergie

$$P_V = - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{aus dem 1. HS (s.o.)} \\ \text{mit } \rho_V = \text{const.}}}{\rho_V} c^2$$

Das Vakuum übt einen negativen Druck aus

#### 4.3.6 Heuristische Herleitung der Friedmann-Lemaître-Expansionsgleichungen

IVB: Eine korrekte Herleitung ergibt sich direkt aus der ART!

→ Hier nutzen wir die Newtonschen Gleichungen und reinterpretieren die „Energieerhaltung“

$$\dot{a}^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho a^2 - Kc^2 \xrightarrow{\frac{d}{dt}} 2\dot{a}\ddot{a} = \frac{8\pi G}{3} (\dot{\rho}a^3 + 2\rho a\dot{a})$$

→ 1. HS  $\left(\frac{d}{dt}(c^2\rho a^3) = -P\frac{d(a^3)}{dt}\right)$

$$\begin{aligned}\dot{\rho}a^3 + 3\rho a^2\dot{a} &= -3\frac{P}{c^2}a^2\dot{a} \\ \Rightarrow \dot{\rho} &= -3\rho\frac{\dot{a}}{a} - 3\frac{P}{c^2}\frac{\dot{a}}{a} \quad \text{und einsetzen ergibt:} \\ \Rightarrow \dot{a}\ddot{a} &= \frac{4\pi G}{3} \left(-\rho\dot{a}a - 3\frac{P}{c^2}\dot{a}a\right) \Rightarrow \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3P}{c^2}\right)\end{aligned}$$

→ neu dabei:

$$\begin{array}{ccccc}\rho & = & \rho_m & + & \rho_r & + & \rho_V \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ & & \text{Materie} & & \text{Strahlung} & & \text{Vakuum} \\ & & & & \text{(Photonen)} & & \\ P & = & \sigma & + & P_r & + & P_V \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ & & \text{Materie} & & \text{Strahlung} & & \text{Vakuum} \\ & & & & \text{(Photonen)} & & \end{array}$$

Schreibe  $\rho_V = \frac{1}{8\pi G}$  und  $\rho = \rho_m + \rho_r$ ,  $P = P_R P_V = -\rho_V c^2$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \frac{\ddot{a}}{a} &= -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3P}{c^2} + \frac{\Lambda}{8\pi G} - \frac{3}{c^2} \left(\frac{\Lambda}{8\pi G}\right) \cdot c^2\right) \\ &= -\frac{4\pi G}{3} \left(\rho + \frac{3P}{c^2}\right) + \frac{\Lambda}{3}\end{aligned}$$

→ Und schließlich in der Energieerhaltung:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 &= \frac{8\pi G}{3} \left(\rho_m + \rho_r + \frac{\Lambda}{8\pi G}\right) - \frac{Kc^2}{a^2} \\ &= \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{Kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda}{3} \Rightarrow \text{(F1) und (F2)} \square\end{aligned}$$

N.B: Wert von  $\Lambda$  lässt sich bisher nicht aus mikroskopischen Theorien herleiten.

⇒ Eines der großen Rätsel der heutigen Physik

#### 4.3.7 Diskussion der Expansionsgleichungen

→ Entwicklung der kosmischen Dichte (folgt aus dem 1. Hauptsatz)

$$\cdot \text{ „Staub“: } P_m = 0 \Rightarrow \rho_m(t) \sim a(t)^{-3}$$

$$\cdot \text{ „Strahlung“: } P_r = \frac{1}{3}\rho_r c^2 \Rightarrow \frac{d}{dt}(\rho_r a^3) = -\frac{1}{3}\rho_r \frac{da^3}{dt}$$

$$\dot{\rho}_r a^3 = -4a^2 \dot{a} \rho_r \Rightarrow \frac{\dot{\rho}_r}{\rho_r} = -4 \frac{\dot{a}}{a} \Rightarrow \rho_r(t) \sim a(t)^{-4}$$

Vakuum:  $\rho_V = \text{const.}$

$$\Rightarrow \rho_m(t) = \rho_{m,0} a(t)^{-3}, \rho_r(t) = \rho_{r,0} a(t)^{-4}, \rho_V(t) = \rho_V$$

→ Grund für  $\rho_r \sim a^{-4}$ : Nicht nur die Anzahldichte der Photonen nimmt ab (mit  $a^{-3}(t)$ ), sondern auch ihre Energie (Rotverschiebung)

$$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda} \quad \text{mit} \quad \lambda \sim a(t) \Rightarrow \rho_r(t) \sim a^{-3}(t) \cdot a^{-1}(t) = a^{-4}(t)$$



→ Falls  $\rho_V \neq 0$  wird die Vakuumdichte ab einem gewissen Zeitpunkt dominant!

→ dimensionslose Dichteparameter:

$$\Omega_m := \frac{\rho_{m,0}}{\rho_c}, \quad \Omega_r := \frac{\rho_{r,0}}{\rho_c}, \quad \Omega_\Lambda := \frac{\Lambda}{3H_0^2}$$

mit der kritischen Dichte  $\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$

→ heutige Werte:

Staub:

Galaxien (inklusive ihrer dunklen Halos):  $\Omega_m \gtrsim 0.02$

Galaxienhaufen  $\Omega_m \gtrsim 0.1$

Kosmologie  $\Omega_m \sim 0.3$

Strahlung: Photonen der CMB + Neutrinos aus dem frühen Universum  $\Omega_r \sim 4.2 \times 10^{-5} \cdot h^{-2}$

$\parallel$   
 $\approx 0.72$

Vakuum:  $\Omega_\Lambda \sim 0.7$

→ Da  $H(t) = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}$  und  $\rho = \rho_{m,0} \cdot a^{-3}(t) + \rho_{r,0} \cdot a^{-4}(t)$

$$\Rightarrow H^2(t) = H_0^2 \left[ a^{-4}(t) \cdot \Omega_r + a^{-3}(t) \Omega_m - a^{-2}(t) \frac{K \cdot c^2}{H_0^2} + \Omega_\Lambda \right]$$

→ Für  $t = t_0$  (heute) mit  $a(t_0) = 1$  ergibt sich (mit  $H(t_0) = H_0$ ):

$$K = \left( \frac{H_0}{c} \right)^2 \cdot \left( \Omega_m + \underbrace{\Omega_r}_{\substack{\text{vernachlässigbar} \\ (\text{für } t = t_0)}} + \Omega_\Lambda - 1 \right)$$

und schließlich:

$$\left( \frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = H^2(t) = H_0^2 \left( a^{-4}(t) \cdot \Omega_r + a^{-3}(t) \cdot \Omega_m + a^{-2}(t) \cdot (1 - \Omega_m - \Omega_\Lambda) + \Omega_\Lambda \right) \quad (*)$$

→ **Diskussion:**

- Für  $a \ll 1$  dominiert der erste (strahlungsdominiertes Universum)

- Für etwas größeres  $a$  dominiert der zweite Term, der Staub- (oder Materie)-Term
- Für  $K \neq 0$  wird für größere  $a$  der dritte Term dominieren
- Falls  $\Lambda \neq 0$ , dominiert die Kosmologische Konstante für  $a \gg 1$

→ DGL (\*) ist nicht analytisch lösbar


→ Einige wichtige Spezialfälle:

Einstein (1917)  $K > 0, \Lambda \sim a^{-2}$  statisch

de Sitter (1917)  $K = \sigma, \Lambda > \sigma$


Lemaître (1950)  $K > 0, \Lambda > a^{-2}$

Friedmann (1922)  $K \begin{matrix} \geq \\ < \end{matrix} \sigma, \Lambda = \sigma$



⇒ viele Möglichkeiten

Klassifikation in Abhängigkeit von  $\Omega_\Lambda$  und  $\Omega_m$



→ Im Gegensatz zur Newtonschen Kosmologie sind offen & Expansion bzw. geschlossen & Kollaps nicht mehr identisch  
 Für  $\Omega_\Lambda < 1$  gilt immer  $H^2 > 0 \forall a \leq 1$

⇒  $\exists$  ein Zeitpunkt in der Vergangenheit mit  $a(t) \rightarrow 0$

⇒ „Größe“ des Universums verschwindend klein

⇒ **Urknall**

### N.B

Die Möglichkeit  $\Omega_\Lambda > 1$  ohne Urknall kann inzwischen durch Beobachtungen ausgeschlossen werden

→ **Abbremsparameter**

$$q_0 := - \frac{\ddot{a} \cdot a}{a^2} \Big|_{t=t_0} \stackrel{(F1)(F2)}{=} \frac{1}{2} \Omega_m - \Omega_\Lambda$$

- Für den Fall  $\Omega_\Lambda = 0$  ist  $q_0 > 0, \ddot{a} < 0$ , d.h. die Expansion wird abgebremst
- Falls  $\Omega_\Lambda$  genügend groß ist  $\Rightarrow q_0 < 0 \Rightarrow \ddot{a} > 0$   
 ⇒ **beschleunigte Expansion** (wg. negativem Druck der Vakuumenergie)
- Beobachtungen deuten darauf hin, dass dies tatsächlich seit einigen Ga passiert

→ **Weltalter**

$$dt = \frac{da}{\left(\frac{da}{dt}\right)} = \frac{da}{a \cdot H}$$


$$\Rightarrow t(a) = \frac{1}{H_0} \int_0^a da' \left[ (a')^{-2} \cdot \Omega_r + (a')^{-1} \Omega_m + (1 - \Omega_m - \Omega_\Lambda) \cdot (a')^{-2} + (a')^2 \Omega_\Lambda \right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$t_0 = t(1)$$

$$= \frac{1}{H_0} \int_0^1 da' \left[ (a')^{-2} \cdot \Omega_r + (a')^{-1} \Omega_m + (1 - \Omega_m - \Omega_\Lambda) \cdot (a')^{-2} + (a')^2 \Omega_\Lambda \right]^{-\frac{1}{2}}$$


→ Zwei wichtige Familien von Modellen:

- (i)  $\Omega_\Lambda = 0$  (da keine „vernünftige“ Begründung für  $\Lambda \neq 0$ )
- (ii)  $\Omega_r + \Omega_\Lambda = 1$ , d.h.  $K = 0$ , flache Universen → bevorzugt in Inflationstheorien (s.u.)



## 4.4 Das Hubble'sche Gesetz

**Ziel:** Zusammenhang zwischen der Rotverschiebung  $z$  (bzw. der radialen Komponente der Relativgeschwindigkeit) und dem Skalenfaktor  $a = a(t)$



→ fiktiver mitbewegter Beobachter bei 1 und 2 mit relativer Entfernung  $dr$  und relativer Bewegung  $dv = H(z)dr$

→ Dies messen sie als Rotverschiebung des Lichtes:

$$\frac{d\lambda}{\lambda} = z = \frac{dv}{c}$$

→ Das Licht benötigt die Zeit  $dt = \frac{dv}{c}$  um von einem zum anderen Beobachter zu gelangen.

→ Da  $\dot{a} = \frac{da}{dt} = H \cdot a \Rightarrow dt = \frac{da}{H \cdot a}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{d\lambda}{\lambda} &= \frac{dv}{c} = \frac{H}{c} dv = H \cdot dt = \frac{da}{a} \Leftrightarrow \frac{d\lambda}{d a} = \frac{\lambda}{a} \\ \Rightarrow \lambda(a) &= c \cdot a \end{aligned}$$

„Heute“  $a = 1 \Rightarrow \lambda(1) = C = \lambda_{\text{obs}}$  mit  $\lambda_{\text{obs}}$  heute beobachtbare Wellenlänge

$$\Rightarrow \lambda(a) = a \cdot \lambda_{\text{obs}}, \quad \lambda_e = a(t_e) \cdot \lambda_{\text{obs}}$$

↑  
Wellenlänge bei Emission

Da  $1 + z = \frac{\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_e} \Rightarrow 1 + z = \frac{1}{a} \quad (**)$

Ergebnis ist kompatibel mit dem lokalen Hubble-Gesetz ( $z \ll 1$ ):

- Mit  $v \approx z \cdot c$  gilt  $z = \frac{H_0 \cdot D}{c}$

- Der Abstand  $D$  entspricht einer Lichtlaufzeit von  $\Delta t = \frac{D}{c} \Rightarrow \Delta a = 1 - a \approx H_0 \cdot \Delta t$  (wobei  $a = a(t_0 - \Delta t)$  und  $a(t_0) = 1$ )  
 $\Rightarrow D \approx (1 - a) \cdot \frac{c}{H_0}$  und  $z = (1 - a) \cdot \frac{c}{H_0} \cdot \frac{H_0}{c} = 1 - a$

$$\Leftrightarrow a = 1 - z \approx \left(1 + z + \mathcal{O}(z^2)\right)^{-1}$$

$\Rightarrow$  Die allgemeine Relation (\*\*) enthält Hubble-Gesetz als Spezialfall

### $\rightarrow$ Konsequenzen für den kosmischen Mikrowellenhintergrund

- Nehmen wir an, dass das Universum zum Zeitpunkt  $t_1$  eine Schwarzkörperstrahlung der Temperatur  $T_1$  enthalten hat.  
 $\Rightarrow$  Anzahldichte  $dN_\nu$  von Photonen in Frequenzintervall  $\nu$  und  $\nu + d\nu$ :

$$\frac{dN_\nu}{d\nu} = \frac{8\pi\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{h_p\nu}{k_B T}\right) - 1}$$

- Zum Zeitpunkt  $t_2 > t_1$  hat sich das Universum um einen Faktor  $\frac{a(t_1)}{a(t_2)}$  ausgedehnt  
 $\Rightarrow$  Rotverschiebung der Photonen:

$$1 + z = \frac{a(t_2)}{a(t_1)}$$

$\Rightarrow$  Photon mit Frequenz  $\nu$  bei  $t_1$  wird mit der Frequenz  $\nu' = \frac{\nu}{1+z}$  bei  $t_2$  gemessen  $= d\nu' = \frac{d\nu}{1+z}$

- Weiterhin gilt  $dN'_\nu = dN_\nu \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Volumenausdehnung}}}{(1+z)^{-3}}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{dN'_{\nu'}}{d\nu'} &= \frac{dN_\nu \cdot (1+z)^{-3}}{d\nu \cdot (1+z)^{-1}} \\ &= \frac{1}{(1+z)^2} \cdot \frac{8\pi[(1+z)\nu']^3}{c^3} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{h_p(1+z)\nu'}{k_B T_1}\right) - 1} \\ &= \frac{8\pi\nu'^2}{c^3} \frac{1}{\exp\left(\frac{h_p\nu'}{k_B T_2}\right) - 1} \quad \text{mit } T_2 = \frac{T_1}{1+z} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$  Planck-Verteilung der Photonen bleibt während der kosmischen Expansion erhalten. Nur die Temperatur wird um den Faktor  $(1+z)^{-1}$  reduziert.

heute  $T_0 = T_{CMB} \approx 2.7 \text{ K}$  (Strahlung aus der Frühphase des Kosmos)

$\Rightarrow$  „Temperatur des Universums“:  $T(z) = T_0(1+z) = \frac{T_0}{a}$

$\rightarrow$  Energiedichte:

$$\rho_r = \sigma_{SB} \cdot T^4 = \left( \frac{\pi^2 k_b^4}{15 \hbar_p^3 c^3} \right) T^4 \sim (1+z)^4 = \underset{\text{wie erwartet}}{a^{-4}}$$

## 4.5 Thermische Geschichte des Universums

→ wegen  $T \propto 1 + z$  war das Universum früher heißer:

$$z = 0 \text{ (heute)} \quad T \approx 2.7 \text{ K}$$

$$z = 1100 \quad T = 3000 \text{ K}$$

$$z = 10^9 \quad T \sim 3 \times 10^9 \text{ K heißer als das innere von Sternen}$$

⇒ energetische Prozesse wie z.B. Kernfusion im frühen Universum

**Ziel:** Extrapolation der physikalischen Gesetze für das frühe Universum, um dieses zu beschreiben (Annahme Naturgesetze haben sich zeitlich nicht geändert)

→ Vorbemerkungen:

- $1 \text{ eV} \approx 1.1905 \times 10^4 \text{ k}_B \text{ K}$
- Anzahldichte und Energieverteilung von Teilchen im thermodynamischen und chemischen Gleichgewicht hängt allein von ihrer Temperatur ab
- Die Elementarteilchenphysik ist für Energien  $\lesssim 1 \text{ GeV}$  sehr gut verstanden und wird durch die Quantenmechanik beschrieben
- Notwendige Bedingung zum Erreichen eines chemischen Gleichgewichts ist die Möglichkeit der Paarerzeugung- und vernichtung, z.B.  $2\gamma \mapsto e^+ + e^-$

### 4.5.1 Expansion in strahlungsdominierter Phase

→ Für  $z \gg z_{\text{eq}} = a_{\text{eq}}^{-1} - 1 \approx 23\,900 \Omega_m h^2$  ist die Energiedichte der Strahlung  $\rho_r \sim T^4 \Leftrightarrow \rho \sim a^{-4}$  dominant.

→ (F1) wird zu:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \cdot \text{const} \cdot a^{-4} + \text{vernachlässigbare Terme}$$

→ Lösung durch Ansatz  $a(t) \sim t^\beta \Rightarrow t^{-2} \sim t^{-4\beta} \Rightarrow \beta = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow a(t) \sim t^{\frac{1}{2}}, t \sim T^{-2}, t \sim \rho^{-\frac{1}{2}}$$

wobei die Proportionalitätskonstante von der Anzahl der relativistischen Teilchen abhängt



- Unter der Annahme des thermodynamischen Gleichgewichts (Hypothese!) ist diese Anzahl bekannt  $\Rightarrow$  Verlauf der frühen Expansion komplett bekannt

#### 4.5.2 Entkopplung der Neutrinos

- Beginn der Betrachtung bei  $T = 10^{12} \text{K} \hat{=} 100 \text{ MeV}$
- Proton,  $m_p \approx 938.3 \frac{\text{MeV}}{c^2}$   
 Neutron,  $m_n \approx 936.6 \frac{\text{MeV}}{c^2}$   
 Elektron,  $m_e \approx 0.511 \frac{\text{MeV}}{c^2}$   
 Myon,  $m_\mu \approx 140 \frac{\text{MeV}}{c^2}$
- Protonen und Neutronen (Baryonen) sind zu schwer um bei der betrachteten Temperatur erzeugt zu werden, sie müssen vorher erzeugt worden sein
- **Alle** Baryonen, die es heute gibt, müssen damals schon vorhanden gewesen sein
- Auch Paare von Myonen können nicht mehr effizient in der Reaktion  $\gamma + \gamma \mapsto \mu^+ + \mu^-$  erzeugt werden ( $\mu^\pm$  sind instabil mit  $\tau \sim 2 \mu\text{s}$ )
- $\Rightarrow$  relativistische Teilchensorte, die zur Strahlungsdichte beitragen:
- Elektronen/Positronen  $e^-/e^+$
  - Photonen  $\gamma$
  - Neutrinos/Antineutrinos  $\nu/\bar{\nu}$  mit  $m_\nu < 1 \text{ eV} \approx 0$  (Grenze aus der Kosmologie)
- $\Rightarrow$  nichtrelativistische Teilchen, die zu  $\rho_m$  beitragen:
- Protonen/Neutronen  $p/n$
  - Konstituenten der dunklen Materie WIMPs (?) mit Masse  $\gtrsim 100 \text{ GeV}$
- Die Reaktionen:
- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| $e^\pm + \gamma \leftrightarrow e^\pm + \gamma$ | Comptonstreuung                |
| $e^+ + e^- \leftrightarrow \gamma + \gamma$     | Paarerzeugung und Annihilation |
| $\nu + \bar{\nu} \leftrightarrow e^+ + e^-$     | Neutrino-Antineutrino-Streuung |
| $\nu + e^\pm \leftrightarrow \nu + e^\pm$       | Neutrino-Elektro-Streuung      |

halten die relativistischen Teilchen im Gleichgewicht.

→ Energiedichte zu dieser Zeit:

$$\rho = \rho_r = 10.75 \frac{\pi^2}{30} \cdot \frac{(k_B T)^4}{\hbar \cdot c^3} \Rightarrow t = 0.3 \text{ s} \cdot \left( \frac{T}{1 \text{ MeV}} \right)^{-2}$$

→ Damit die Teilchen im Gleichgewicht bleiben, müssen die obigen Reaktionen genügend häufig ablaufen, d.h. die mittlere Zeit zwischen zwei Reaktionen muss sehr viel kürzer sein als die Zeitskala, auf der sich die Gleichgewichtsbedingungen aufgrund der Expansion ändern (Reaktionsraten müssen größer als  $H(t)$  sein)

→ insbesondere Neutrinos interagieren nur per schwacher Wechselwirkung

→ Reaktionsrate:  $\Gamma \sim n\sigma$

Anzahldichte:  $n \sim a^{-3} \sim t^{-\frac{3}{2}}$

Wirkungsquerschnitt für Neutrinos:  $\sigma \sim E^2 \sim T^2 \sim a^{-2}$

$$\Rightarrow \Gamma \sim n\sigma \sim a^{-3} \cdot a^{-2} = a^{-5} \sim t^{-\frac{5}{2}} \sim T^5$$

→ Zu Vergleichen mit Expansionsrate  $\frac{\dot{a}}{a} = H(t) \sim t^{-1} \sim T^2$

→ Aus  $\sigma$  der schwachen Wechselwirkung kann man den Zeitpunkt bzw. die Temperatur des Übergangs berechnen:

$$\frac{\Gamma}{H} \sim \left( \frac{T^3}{1.6 \times 10^{10} \text{ K}} \right)$$

⇒ Für  $T \lesssim 10^{10} \text{ K}$  sind die Neutrinos nicht mehr mit den anderen Teilchen im Gleichgewicht. Nach diesem Zeitpunkt ( $t = 1 \text{ s}$ ) bewegen sie sich ohne weitere Wechselwirkung bis zum heutigen Tage. heute:  $n_\nu = 113 \text{ cm}^{-3}$  für jede Neutrinoart

$$T_\nu = 1.9 \text{ K} \quad (\text{s.u.})$$

↪ leider sehr schwach nachweisbar

### 4.5.3 Paarvernichtung

→ Für  $T \lesssim 5 \times 10^9 \text{ K}$  bzw.  $k_B T \lesssim 500 \text{ keV}$  dominiert die Annihilation  $e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$  über die Paarerzeugung.

⇒ Dichte der  $e^+e^-$  - Paare nimmt sehr schnell ab

⇒ Photonengas wird erhitzt (Neutrinos nicht, da sie bereits entkoppelt sind)

$$T_\gamma = \left(\frac{11}{4}\right)^{\frac{1}{3}} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{vor Annihilation}}}{T} = \left(\frac{11}{4}\right)^{\frac{1}{3}} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Temperatur der} \\ \text{entkoppelten Neutrinos}}}{T_\nu} \rightarrow \text{siehe Übung}$$

→ Nach der Annihilation gilt das Expansionsgesetz  $t = 0.55 \text{ s} \left(\frac{T}{1 \text{ MeV}}\right)^{-2}$  und das Verhältnis von Baryonendichte und Photonendichte bleibt konstant:  $\eta := \left(\frac{n_b}{n_\gamma}\right) = 2.74 \times 10^{-8} \Omega_b h^2 = 0.02$

→ Nach der Annihilation sind **fast** alle Elektronen zerstrahlt, aber eine kleine Zahl  $n_e = n_p$  muss übrig bleiben, damit das Universum elektrisch neutral bleibt  $\Rightarrow \frac{n_{e^-}}{n_\gamma} = 0.8\eta$  ( $\eta$  beinhaltet Protonen und Neutronen)

### 4.5.4 Primordiale Nukleosynthese

→ Entstehung von Atomkernen aus  $p$  und  $n$  im frühen Universum

→ wichtigste Reaktionen im chemischen Gleichgewicht:

$$p + e^- \leftrightarrow n + \nu_e, \quad p + \bar{\nu}_e \leftrightarrow n + e^+, \quad n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

Zerfallszeit des freien Neutrons:  $\tau_n = 887 \text{ s}$

→ im thermischen Gleichgewicht:  $\frac{n_n}{n_p} = \left(\frac{m_n}{m_p}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot e^{-\frac{\Delta m c^2}{k_B T}} \quad (*)$   
mit  $\Delta m = m_n - m_p = 1.293 \frac{\text{MeV}}{c^2}$

→ Gleichgewichts-Reaktionen werden selten, nachdem die Neutrinos ausgefroren sind. Dies geschieht bei  $T \approx 0.8 \text{ MeV}$

$$\Rightarrow \frac{n_n}{n_p} \approx e^{-\frac{1.3 \text{ MeV}}{0.8 \text{ MeV}}} \approx 0.2$$

→ Nach der Entkopplung von  $n$  und  $p$  wird ihr Verhältnis nicht mehr durch (\*) beschrieben, sondern nur noch durch den Zerfall der freien Neutronen auf der Zeitskala  $\tau_n$  modifiziert  $\Rightarrow$  heutige Neutronen wurden schnell in Atomkerne gebunden