Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

Schock ist nicht gleich Schock – vergleichen und nach Leitsymptom handeln

🎯 **Lernziel:** Die Lernenden vergleichen die drei Schockformen und begründen Sofortmaßnahmen und Lagerung anhand des Leitsymptoms. Sie grenzen eigenverantwortliche von ärztlich angeordneten Maßnahmen ab und korrigieren typische Fehlvorstellungen (Schocklage bei Atemnot, Antihistaminikum statt Adrenalin).

Rahmen: KB I · Woche 2 (SW 7) · 3 UE (135 min) · Leitfall „Frau Maler“ (11 Uhr, Kausalkette) · Vorwissen: Woche 1 (Kompensation, Schockspirale, Schockindex), Erste-Hilfe-Kurs und Positionierung (1. AJ), Thromboseprophylaxe (1. AJ), PESR (1. AJ) · Ich-kann-Liste KB I, Woche 2, Nr. 1–5 · KA-Bezug: KB 1, Aufg. 3.1–3.3 und 5.5

Kompetenzbezug: Anlage 1 PflAPrV I.1.d, I.4.a, I.4.c, III.2.b · Landeslehrplan CE 06 „In Akutsituationen sicher handeln“ (1./2. AD: „Sofortmaßnahmen bei Schockzuständen“, „Verabreichung von Notfallmedikamenten nach ärztlicher Anordnung“, „Sofortmaßnahmen bei Verdacht auf … Lungenembolie“, Simulation von Notfallsituationen)

Zeit	Phase	Lehrerhandeln	Schülerhandeln	Sozialform	Material	Didaktische Funktion
vor der Stunde	**Vorbereitung**	Yogamatten auslegen; 3 Schilder in Raumecken (Anlage); Stammgruppen-Liste am Beamer; fortschritt.html öffnen → „Neuen Raum starten“.	–	–	Matten, Schilder, Beamer	Ablauf ohne Umbaupausen
0–8	**Problemorientierter Einstieg**	An den Schlusssatz von Woche 1 anknüpfen; Fallauszug und Leitfrage (Sprechblase) an die Tafel; Vermutungen aus W1 (AA3a) abrufen; Abstimmung Runde 1 freigeben, Ergebnis am Beamer zeigen, nicht auflösen.	Vermutung nennen; am Handy entscheiden und Sicherheit angeben.	EA → Plenum	AB S. 1, Handy, Beamer	Vorwissen und Fehlvorstellungen sichtbar machen (IKL Nr. 4); kognitiver Konflikt. AFB I
„In Woche 1 haben Sie gesehen, wie der Körper einen Schock ausgleicht. Heute geht es um die Frage: Ist jeder Schock gleich – und muss ich deshalb immer gleich handeln?“						
8–23	**Erarbeitung I: Expertenrunde (AA1)**	Stammgruppen und Expertenrollen einteilen (siehe Hinweise), Expertenblätter A/B/C austeilen, Zeit ansagen; Fortschritt am Beamer beobachten.	Fall lesen, Befunde in der App markieren, Infotext lesen, Schockform anhand von 4 Symptomen begründen (Wortlaut KA 3.1), Expertenkarte ausfüllen, 60-Sekunden-Erklärprobe.	EA → GA (Experten)	Expertenblätter, Handy	Befunde im Fließtext identifizieren wie in KA 3.1; Expertenwissen aufbauen. AFB I
23–43	**Erarbeitung II: Stammgruppe (AA2)**	Zeitsignal alle 3 min; Hilfekarten bei Bedarf; Expertinnen und Experten an ihre Prüferrolle erinnern.	Reihum erklären, Vergleichstabelle ergänzen, Schockform-Detektiv, Merksatz; 2.1 und 2.2 schreiben, Expertenkorrektur.	GA (3–4)	AB S. 2–3, Handy	Vergleichen (IKL Nr. 1); Pathophysiologie erläutern (KA 3.2), Unterschied neurogen (KA 5.5). AFB II
„Sie wissen jetzt, wie sich die Schockformen unterscheiden. Aber wie lagern Sie? Aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennen Sie: ‚Beine hoch.‘ Prüfen wir, ob das immer stimmt.“						

Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

Zeit	Phase	Lehrerhandeln	Schülerhandeln	Sozialform	Material	Didaktische Funktion
43–63	**Erarbeitung III: Lagerungsparcours (AA3)**	Paare bilden, eine Karte gemeinsam vormachen (Ablauf, Sicherheit); Paare begleiten; Entscheidungsweg kurz sichern.	Karten ziehen, lagern und begründen, aufdecken, Rollen tauschen; Merksatz; Entscheidungsweg; 3.1 und 3.2.	PA → EA	Yogamatten, Kissen, Handy, AB S. 3–4	Handlungsorientiert; Fehlvorstellung „immer Beine hoch“ korrigieren; Lagerungsbegründung als K.-o.-Kriterium in KA 3.3. AFB II
63–88	**Erarbeitung IV: Notfall-Simulation (AA4)**	Rollen erklären, Start gemeinsam, Gruppen begleiten, Rollenwechsel einfordern; Plenum: Warum unterschiedliche Lagerung?	Drei Varianten spielen, protokollieren, Zeitstrahl mit Protokoll vergleichen; 4b und 4.1 (Vergleich Klinik – Pflegeheim) beantworten.	GA (3–4) → Plenum	Handy (1 je Gruppe), Notfallprotokoll (Anlage)	Sofortmaßnahmen in Entscheidungen umsetzen (I.4.a); Dokumentation; 4.1 übt die KA-Punkte „Infusion stoppen, Zugang belassen“, „Adrenalin/Sauerstoff nach SOP“ schriftlich (KA 3.3). AFB II
Pause (falls im Stundenraster vorgesehen). – „In der Simulation mussten Sie entscheiden: Darf ich das – oder brauche ich eine Anordnung?“						
88–100	**Vertiefung: Wer darf was? (AA5)**	Maßnahmen vorlesen (Liste in den Hinweisen), bei Uneinigkeit nachfragen; Dialog zeigen, Think-Pair-Share moderieren.	Positionieren und begründen, Tabelle ausfüllen; Stellungnahme zu Herrn Brandt schreiben.	Plenum (Bewegung) → EA → PA	Schilder, AB S. 4–5	Verantwortungsgrenzen (III.2.b); Fehlvorstellung Antihistaminikum (IKL Nr. 3–4). AFB II–III
„Jetzt wie in der Klassenarbeit: allein, ohne Unterlagen, mit Punkten.“						
100–115	**Sicherung: Klausurtraining (AA6)**	Zeit stoppen (8 min), Tauschpartner aus anderer Stammgruppe zuweisen, Raster am Handy, Rückmeldesatz einfordern.	Transferfall lösen; Lösung der Partnerin/des Partners mit App-Raster bewerten.	EA → PA	AB S. 5–6, Handy	Transfer auf neuen Fall wie in der KA (3.3); Examensformat. AFB III
115–130	**Transfer: Zurück zu Frau Maler (AA7)**	Placemats austeilen, Zeiten ansagen (3/3/4 min), eine Gruppe stellt vor; Auflösung: obstruktiver Schock, Lagerung um 11 Uhr.	Placemat bearbeiten, Kausalkette in der Mitte, Leitfrage beantworten; 7.1/7.2 beginnen.	GA (4) → Plenum	Placemat A3	Kausalkette (IKL Nr. 5); offene Frage aus W1 klären; Brücke zu W4 und W7. AFB III
130–135	**Abschlusssicherung**	Abstimmung Runde 2 freigeben, vorher/nachher zeigen, größte Veränderung kurz besprechen; Hausaufgabe erteilen.	Erneut abstimmen; Ich-kann-Liste (Ampel); Leitfrage beantworten.	EA → Plenum	Handy, Beamer, Ich-kann-Liste	Lernzuwachs sichtbar machen; Lernstandsdiagnose.
„Nächste Woche geht es darum, wie man eine starke Blutung stoppt – damit es gar nicht erst zum hypovolämischen Schock kommt.“						

Vorbereitung und Hinweise

Gruppeneinteilung

- **3BFP2.1 (23 SuS):** 7 Stammgruppen – 5 Dreiergruppen (A, B, C) und 2 Vierergruppen (A, B, B, C; Anaphylaxie ist Klausurschwerpunkt). Expertengruppen: A = 7 (4 + 3), B = 9 (3 × 3), C = 7 (4 + 3). Lagerungsparcours: 10 Paare + 1 Dreiergruppe (11 Matten). Placemat: 5 Vierergruppen + 1 Dreiergruppe (eine Person übernimmt zwei Felder).
- **3BFP2.2 (20 SuS):** 6 Stammgruppen – 4 Dreiergruppen und 2 Vierergruppen (A, B, B, C). Expertengruppen: A = 6 (3 + 3), B = 8 (4 + 4), C = 6 (3 + 3). Lagerungsparcours: 10 Paare (10 Matten). Placemat: 5 Vierergruppen.
- Die Simulation (AA4) läuft in den Stammgruppen; in Vierergruppen übernimmt die vierte Person die Beobachtung (Lagerung, Verantwortung) und gibt nach jeder Runde einen Hinweis.

Material und Technik

- Kopien: AB (SV) für alle; Expertenblätter A/B/C nach Einteilung; Notfallprotokoll 1 je Stammgruppe; Placemat auf A3 (1 je Vierergruppe); drei Schilder (Anlage) für die Raumecken. Yogamatten, einige Kissen/Decken als Polster.
- Beamer: **fortschritt.html** öffnen → „Neuen Raum starten“ → Raumcode zeigen. Die Seite zeigt den Fortschritt (AA1a, AA2b, AA3a) und unter **„Abstimmung“** die Runden 1 und 2 der Entscheidungsfragen nebeneinander. Namen lassen sich verbergen; nach 6 Stunden wird alles gelöscht.
- Ohne WLAN oder Handys: Abstimmung per Handzeichen/Ampelkarten; Lagerungskarten aus der Liste unten vorlesen; Simulation als Fallkarte – die Lehrkraft spielt „Monitor“ und nennt die Werte nach den Entscheidungen der Gruppe (Drehbuch unten).
- Schutz gegen Durchklicken wie gewohnt: Merksätze erscheinen nur, wenn genug Aufgaben beim ersten Versuch richtig sind.

Inhaltliche Hinweise

- Die Lagerungsempfehlungen folgen der S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021): symptomorientiert; Flachlagerung und Vermeiden abrupter Lageveränderungen (Aufsitzen, Aufstehen) als Grundstrategie; bei führender Atemnot (halb-)sitzend; bei eingeschränktem Bewusstsein und intaktem Kreislauf stabile Seitenlage; zur Kreislaufverbesserung Beine hoch.
- Adrenalin i. m. laut Leitlinie 0,15–0,6 mg in die Außenseite des Oberschenkels, Autoinjektoren 0,15/0,3/0,5 mg, Wiederholung nach ca. 5–10 min. Antihistaminika: langsamerer Wirkungseintritt, Wirkung auf Kreislauf und Bronchokonstriktion nicht belegt, lebensrettende Sofortmaßnahmen dürfen nicht verzögert werden. Glukokortikoide: untergeordnete Rolle in der Akutphase. Die KA-Lösung nennt „Erwachsene 0,5 mg“ – das liegt in diesem Bereich.
- Der Leitfall ist belastend (Christin, Reanimation). AA7 bleibt bewusst fachlich (Kausalkette, verpasste Chancen) und bewertet Christin nicht; Erleben, Hilflosigkeit und Verarbeitung sind Thema in KB II und KB V.
- Die Übungsfälle vermeiden bewusst die Personen und Auslöser der Klassenarbeit (Frau Sommer, Herr Brenner, Antibiotika-Kurzinfusion), damit die KA den Transfer prüft.

Nicht enthalten (andere Kompetenzbereiche/Fächer)

- KB II: psychologische Erste Hilfe, Beruhigen, Notfalleinwilligung, SPIKES/NURSE, SAfE · KB III: Reanimation, ABCDE-Schema, Notaufnahme/Triage, PTBS (nur Verweise) · KB IV: Delegationsrecht, Haftung, unterlassene Hilfeleistung, Ersthelferschutz, Patientenverfügung · KB V: eigene Überforderung · Deutsch: Notruf absetzen, SBAR · Pädiatrie (3. AJ): Anaphylaxie bei Kindern · Anatomie: Pathophysiologie der Lungenembolie (1. AJ, nur aktiviert).

Liste für die Aufstellung (AA5a) – Lösung

- 🟢 selbst: Infusion stoppen, Zugang belassen · Hilfe holen · nach Leitsymptom lagern · Vitalzeichen messen · dokumentieren
- 🟡 n. ä. A./SOP: Adrenalin i. m. · Sauerstoff · Antihistaminikum · Volumengabe · eigener Autoinjektor nach ärztlichem Notfallplan (der Plan ist die Anordnung)
- 🔴 ärztlich: Diagnose stellen · über weitere Therapie und Überwachungsdauer entscheiden

Lagerungskarten (AA3a) – zum Vorlesen ohne App

Karte	Situation	Lösung und Begründung
Herr Bauer (70)	Nach einem Bienenstich ist ihm schwindelig. Puls 120/min, Blutdruck 85/50 mmHg. Er atmet ruhig und ist ansprechbar.	**flach, Beine hoch** – Schockzeichen ohne Atemnot: Blut aus den Beinen fließt zum Herzen.
Frau Carla Yıldız (55) (Dilemma)	Nach Kontrastmittel ist sie heiser und atmet pfeifend, 30 Atemzüge/min. Blutdruck 90/55 mmHg.	**Oberkörper hoch** – Atemnot ist das Leitsymptom – trotz niedrigem Blutdruck. Beine hoch würde die Atmung erschweren.
Herr Demir (40)	Sturz von einer 4 m hohen Leiter. Er klagt über Nackenschmerzen und Kribbeln in beiden Händen.	**nicht bewegen, Kopf halten** – Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung: Jede Bewegung kann das Rückenmark weiter schädigen.
Frau Engel (63)	Nach einem Wespenstich reagiert sie nicht mehr auf Ansprache. Sie atmet normal.	**stabile Seitenlage** – Bewusstlos mit normaler Atmung: Die Atemwege bleiben frei, Erbrochenes kann abfließen.
Herr Fuchs (81)	Teerstuhl seit dem Morgen. Er ist blass und kaltschweißig, Puls 116/min, Blutdruck 98/72 mmHg, keine Atemnot.	**flach, Beine hoch** – Hypovolämischer Schock ohne Atemnot. Nicht aufsetzen – Kollapsgefahr.
Frau Graf (35)	Sie hat eine Nussallergie und Quaddeln am Hals: „Ich krieg so schlecht Luft." Blutdruck 120/80 mmHg.	**Oberkörper hoch** – Atemnot steht im Vordergrund, der Kreislauf ist noch stabil. Nicht aufstehen lassen.
Herr Hahn (28)	Sturz mit dem Fahrrad, offener Unterschenkelbruch. Er ist blass, Puls 120/min. Keine Nacken- oder Rückenschmerzen.	**flach, verletztes Bein nicht anheben** – Keine Schocklage bei Verletzungen an Bein oder Becken: Bein in der vorgefundenen Lage ruhigstellen (Woche 3).
Herr Ivo (66)	Nach einem Wespenstich ist er bewusstlos und atmet nicht normal.	**Reanimation beginnen (KB III)** – Keine normale Atmung = Kreislaufstillstand. Lagerung: Rückenlage auf harter Unterlage.
Profi-Karte: Frau Jäger (74)	Plötzlich peitschenartiger Schmerz im linken Bein. Das Bein ist blass und kalt, am Fuß ist kein Puls tastbar.	**Bein tief lagern, polstern** – Verdacht auf akuten Arterienverschluss: Tieflagern verbessert die Durchblutung (Examen Mai 2024). Die Lagerung richtet sich immer nach dem Problem.

Drehbuch der Simulation (AA4) – idealer Ablauf und typische Fehler

Variante	Leitsymptom und richtige Schritte	Typische Fehler und ihre Folgen in der App
A Klinik – Herr Kaiser (58), Eisen-Kurzinfusion, Notfall-SOP	Atemnot (Heiserkeit, pfeifende Atmung, SpO_2 ↓) → Infusion stoppen, Zugang belassen · Notfallteam rufen · Oberkörper hoch · Adrenalin i. m. nach SOP · Sauerstoff nach SOP · Vitalzeichen · dokumentieren, Allergie vermerken, Nachbeobachtung	Zugang ziehen (kein Weg für Medikamente) · Beine hoch (Atemnot nimmt zu) · Antihistaminikum statt Adrenalin (keine Besserung) · allein lassen
B Pflegeheim – Frau Gruber (84), neues Schmerzmittel (Tablette), keine Ärztin im Haus, keine SOP	Kreislauf ohne Atemnot (Schwindel, RR ↓, Puls ↑) → Hilfe holen: Pflegefachkraft, Notruf 112 · flach, Beine hoch · nicht aufsetzen · überwachen · keine Medikamente ohne Anordnung · Übergabe an Notärztin, dokumentieren	Zur Toilette begleiten/aufsetzen (Kollaps) · Adrenalin aus dem Notfallkoffer ohne Anordnung · etwas zu trinken geben
C ambulant – Herr Hager (66), Bienenstich, eigenes Notfallset mit ärztlichem Notfallplan	Heiserkeit, dann Bewusstseinstrübung bei erhaltener Atmung → Notruf 112 · Autoinjektor aus dem Notfallset nach Notfallplan (Außenseite Oberschenkel) · bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage · Atmung überwachen · Stachel abstreifen (Biene) · Uhrzeit notieren	Tropfen aus dem Notfallset zuerst (Antihistaminikum; Aspirationsgefahr) · aufrichten · Autoinjektor nicht nutzen und nur warten

Quellen

- S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie, AWMF 061-025, Update 2021 (Ring et al., Allergo J Int 2021;30:1–25) · MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock · Landeslehrplan Berufsfachschule Pflege BW, CE 06 · Ich-kann-Liste KB I (3BFP2) · BW-Abschlussprüfungen Mai 2023–Mai 2026 (Operatoren, Aufgabenformat)

Schock ist nicht gleich Schock – vergleichen und nach Leitsymptom handeln [LSG]

🎯 **Lernziel:** Sie vergleichen den hypovolämischen, den anaphylaktischen und den neurogenen Schock und begründen Sofortmaßnahmen und Lagerung (Positionierung) anhand des Leitsymptoms. Sie grenzen eigenverantwortliche von ärztlich angeordneten Maßnahmen ab und korrigieren typische Fehlvorstellungen.

📱 = am Smartphone (QR-Code scannen) ✏️ = auf Papier

Fallbezug: „Reanimation – und nicht nur ich war hilflos“ (Auszug)

Frau Maler, 71 Jahre, ist seit gestern neu im Pflegeheim. Vor drei Wochen erhielt sie nach einer Schenkelhalsfraktur eine Hüft-TEP. Seit der Entlassung liegt sie die meiste Zeit im Bett.

Schülerin Christin berichtet: „Gegen elf Uhr wirkte sie unruhig, atmete schnell und sagte, sie bekomme schlecht Luft. Sie war blass, hatte kalten Schweiß auf der Stirn, ihr Puls lag bei 118/min und der Blutdruck bei 105/70 mmHg. Ich dachte, sie sei nur aufgeregt, weil alles neu für sie ist.“

Aus Woche 1 wissen Sie: Frau Maler war um 11 Uhr im kompensierten Schock (Schockindex ≈ 1,1). Offen blieb, woher die Luftnot kommt. **Meine Vermutung zur Schockform (AA3a, Woche 1):** offen – wird in AA7 geklärt (obstruktiver Schock durch Lungenembolie)

> 💬 *Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen?*

📱 Einstieg: Ihre Entscheidung, bitte! (Runde 1)

⏱ *8 min · Einzelarbeit → Plenum · AFB I · Ich-kann-Liste W2 Nr. 4 · Vorwissen und Fehlvorstellungen sichtbar machen*

Scannen Sie den QR-Code und tragen Sie oben **Vorname + Raumcode vom Beamer** ein. Entscheiden Sie bei fünf kurzen Notfällen, was Sie tun würden, und geben Sie an, wie sicher Sie sind.

Am Beamer sehen Sie, wie die Klasse entschieden hat – ohne Namen. **Die Auflösung gibt es erst am Ende der Stunde** (Runde 2).

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-entscheidung.html

Nr.	Richtig	Begründung
E1	B Oberkörper hoch	Atemnot ist das Leitsymptom → Oberkörper hoch. Beine hoch würde die Atmung erschweren.
E2	B Adrenalin i. m.	Adrenalin wirkt am schnellsten auf Kreislauf, Schleimhäute und Bronchien. Antihistaminikum und Kortison kommen danach.
E3	B Nein – das kann ein Schock sein	Neurogener Schock: Der Sympathikus fällt aus – kein Pulsanstieg, keine Zentralisation, aber der Blutdruck ist niedrig.
E4	C stoppen, Zugang liegen lassen	Allergen sofort stoppen – den venösen Zugang braucht das Notfallteam für Medikamente und Volumen.
E5	B Nein, nur nach Anordnung oder SOP	Sauerstoff ist ein Arzneimittel. Eigenverantwortlich: erkennen, Hilfe holen, lagern, überwachen.

Teil A · Drei Wege in den Schock (Gruppenpuzzle)

Ihre Lehrkraft teilt Sie in **Stammgruppen** ein. In jeder Stammgruppe gibt es Expertinnen und Experten für **A** (hypovolämischer Schock), **B** (anaphylaktischer Schock) und **C** (neurogener Schock). Ihr Expertenblatt erhalten Sie gesondert.

Ich bin Expertin/Experte für: ☐ A ☐ B ☐ C **Meine Stammgruppe:** _____

AA1: Identifizieren – Expertenrunde: Bearbeiten Sie in Ihrer **Expertengruppe** die Aufträge a–c auf Ihrem Expertenblatt: Fall lesen und Befunde am Smartphone markieren, die Schockform anhand von Symptomen **begründen**, Expertenkarte ausfüllen. Üben Sie zum Schluss: Erklären Sie Ihrer Nachbarin oder Ihrem Nachbarn Ihre Schockform in 60 Sekunden.

⏱ *15 min · Einzelarbeit → Gruppenarbeit (Expertengruppe) · AFB I · Ich-kann-Liste W2 Nr. 1 · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.1*

Lösungen zu AA1 a–c: siehe Lösung der Expertenblätter (am Ende dieser Lehrerversion).

AA2: Vergleichen – Stammgruppe: a) Erklären Sie reihum Ihre Schockform (je 3 Minuten). Die anderen **ergänzen** die Tabelle.

20 min (a–c) · Gruppenarbeit (Stammgruppe 3–4) · AFB II · Ich-kann-Liste W2 Nr. 1 · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.2 und 5.5

	A hypovolämisch	B anaphylaktisch	C neurogen
Ursache	Blut- oder Flüssigkeitsverlust (Blutung, z. B. Magen-Darm-Blutung; Verbrennung; Durchfall, Erbrechen)	allergische Sofortreaktion auf Medikament, Insektengift oder Nahrungsmittel	Verletzung des Rückenmarks (meist Halswirbelsäule), z. B. Kopfsprung, Sturz aus der Höhe
Entstehung (kurz)	Volumen ↓ → Rückstrom zum Herzen ↓ → Schlagvolumen ↓ → Blutdruck ↓	Histamin → Gefäße weit und durchlässig → relativer Volumenmangel → Blutdruck ↓; Bronchien eng	Sympathikus fällt aus → Gefäße weit, Blut versackt → Blutdruck ↓; keine Gegenregulation
Puls	schnell, schwach	schnell	langsam oder normal
Haut	blass, kalt, schweißig (Zentralisation)	Juckreiz, Rötung, Quaddeln, Schwellungen (kann auch blass sein)	unterhalb der Verletzung warm, trocken, rosig
weitere typische Zeichen	Durst, Unruhe, schnelle Atmung, wenig Urin; ggf. sichtbares Blut, Teerstuhl	Heiserkeit, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, Schwindel	Lähmungen, Kribbeln, Taubheit, Nacken-/Rückenschmerz, flache Atmung, Auskühlung
Darauf achte ich besonders	Blutungsquelle; Puls und Blutdruck im Verlauf (Schockindex); Bewusstsein; Urin	Atemwege und Atmung (Heiserkeit, SpO_2); Kreislauf; zweite Reaktion nach Stunden möglich	Atmung; Blutdruck und Puls; Temperatur; nicht bewegen
Gemeinsamkeit	Bei allen drei Formen fällt der Blutdruck, die Organe werden schlecht durchblutet → Sauerstoffmangel → Lebensgefahr. Anaphylaktischer und neurogener Schock sind distributive Schockformen: Die Gefäße sind weit gestellt (relativer Volumenmangel).		

b) Schockform-Detektiv:

Bestimmen Sie bei sechs kurzen Fällen die Schockform und markieren Sie die **zwei Befunde**, die Ihre Entscheidung belegen. Im **Monitorvergleich** finden Sie die Unterschiede zwischen zwei Patienten.

Am Ende: Ergänzen Sie den Merksatz.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-detektiv.html

Merksatz AA2

Bei allen drei Schockformen **fällt** der Blutdruck, und die Organe werden schlecht durchblutet. Beim neurogenen Schock fällt der **Sympathikus** aus: Der Puls ist **langsam** oder normal, und die Haut ist **warm** und trocken.

c) Klausurtraining: Bearbeiten Sie die Aufgaben allein. Danach prüft **Expertin/Experte B** Ihre Antwort zu 2.1 und **Expertin/Experte C** Ihre Antwort zu 2.2.

Nr.	Aufgabe	Punkte
2.1	Erläutern Sie, wie es bei Mia zum Schock kommt. – Tipp: Denken Sie in einer Pfeilkette – Auslöser → Botenstoff → Gefäße → Blutdruck; die Atemwege extra.	___ / 3

Nr.	Aufgabe	Punkte
2.2	Nennen Sie 1 Befund, der bei Herrn Weber anders ist als bei Herrn Albrecht. Begründen Sie den Unterschied.	___ / 2

2.1

Die Haselnuss (Allergen) löst eine allergische Sofortreaktion aus: Mastzellen setzen Histamin und weitere Botenstoffe frei.

Die Gefäße werden weit und durchlässig: Flüssigkeit tritt ins Gewebe (Quaddeln, Schwellung von Lippen und Lidern), im Gefäßsystem fehlt Volumen → der Blutdruck fällt (88/50 mmHg), das Herz gleicht mit 128/min aus.

Zusätzlich schwellen die Schleimhäute an (Heiserkeit) und die Bronchien verengen sich → Atemnot, Sauerstoffmangel (SpO_2 93 %).

(je schlüssiger Schritt 1 P.)



2.2

Befund: Herr Weber hat einen langsamen Puls (52/min), Herr Albrecht einen schnellen (116/min). – oder: Herr Webers Haut ist warm, trocken, rosig, Herrn Albrechts Haut blass, kalt, schweißig.

Begründung: Bei Herrn Weber ist das Rückenmark verletzt, der Sympathikus fällt aus. Der Körper kann nicht gegenregulieren: kein Pulsanstieg, keine Zentralisation. (Befund 1 P., Begründung 1 P.)

AA3: Begründen – Lagerung (Positionierung) nach Leitsymptom: Aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennen viele: Schock → Beine hoch. Das stimmt nicht immer. Entscheidend ist das **Leitsymptom** – das Zeichen, das die Person gerade am meisten gefährdet.

20 min · Partnerarbeit (Yogamatte) → Einzelarbeit · AFB II · Ich-kann-Liste W2 Nr. 2 und 4 · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.3

			
Oberkörper hoch (halbsitzend) **Wann?** Atemnot steht im Vordergrund. **Warum?** Die Atemhilfsmuskulatur kann besser arbeiten, die Bauchorgane drücken nicht gegen das Zwerchfell.	**Flach, Beine hoch (Schocklage)** **Wann?** Schockzeichen ohne Atemnot. **Warum?** Blut aus den Beinen fließt zum Körperstamm, das Herz bekommt mehr Blut. Nicht bei Atemnot und nicht bei Verletzungen an Beinen, Becken oder Wirbelsäule.	**Stabile Seitenlage** **Wann?** Bewusstlos, Atmung normal. **Warum?** Die Atemwege bleiben frei, Erbrochenes kann abfließen. Nach einem Unfall nur achsengerecht drehen.	**Nicht bewegen** **Wann?** Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung. **Warum?** Jede Bewegung kann das Rückenmark weiter schädigen. Kopf mit beiden Händen halten (Woche 4).

⚠ **Bei Anaphylaxie:** nicht aufsitzen, aufstehen oder gehen lassen – das Blut kann „versacken", ein Kreislaufstillstand droht. **Atmet die Person nicht normal → Reanimation** (KB III).

Quelle: nach S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); Ich-kann-Liste KB I; sprachlich vereinfacht.

a) Lagerungsparcours (Partnerarbeit auf der Yogamatte):

Die App zieht eine Situationskarte. **Person A lagert Person B** innerhalb von 60 Sekunden und begründet: „Ich lagere …, weil …". Dann tippen Sie auf **Aufdecken** und vergleichen. Wechseln Sie nach jeder Karte die Rollen.

Sicherheit: behutsam lagern, nicht heben. Wer nicht gelagert werden möchte, übernimmt die Begründung. **Am Ende:** Ergänzen Sie den Merksatz.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-lagerung.html

Merksatz AA3

Die Lagerung richtet sich nach dem **Leitsymptom**, nicht nach der Schockform: Atemnot → **Oberkörper hoch**; Schockzeichen ohne Atemnot → **flach, Beine hoch**; bewusstlos mit normaler Atmung → **stabile Seitenlage**; Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung → **nicht bewegen**.

b) Entscheidungsweg: Ergänzen Sie, wie Sie lagern. Prüfen Sie die Fragen **von oben nach unten** – die erste Frage, die Sie mit „Ja" beantworten, entscheidet.

Frage	„Ja" → so handle bzw. lagere ich
1. Atmet die Person **nicht normal**?	Reanimation beginnen (KB III)
2. Ist sie **bewusstlos**, atmet aber normal?	stabile Seitenlage (nach Unfall achsengerecht)
3. Gibt es Hinweise auf eine **Wirbelsäulenverletzung**?	nicht bewegen, Kopf mit beiden Händen halten
4. Steht **Atemnot** im Vordergrund?	Oberkörper hoch (halbsitzend)
5. **Schockzeichen** ohne Atemnot?	flach, Beine hoch

c) Klausurtraining:

Nr.	Aufgabe	Punkte
3.1	*Frau Carla Yıldız (55) hat in der Radiologie Kontrastmittel erhalten. Sie ist heiser und atmet pfeifend mit 30 Atemzügen pro Minute. Ihr Blutdruck liegt bei 90/55 mmHg.* Begründen Sie, warum Sie Frau Yıldız trotz des niedrigen Blutdrucks mit erhöhtem Oberkörper lagern.	___ / 2
3.2	Nehmen Sie Stellung zu der Aussage: „Bei einem Schock legt man immer die Beine hoch."	___ / 2

3.1

Bei Frau Yıldız steht die Atemnot im Vordergrund (Heiserkeit, pfeifende Atmung, 30/min). Mit erhöhtem Oberkörper kann sie die Atemhilfsmuskulatur einsetzen, die Bauchorgane drücken nicht gegen das Zwerchfell.

Flach mit Beinen hoch würde die Atemnot verstärken. Nicht aufsetzen oder aufstehen lassen, Kreislauf engmaschig überwachen. (je schlüssiges Argument 1 P.)

3.2

Die Aussage ist falsch. Die Schocklage hilft nur bei Schockzeichen ohne Atemnot, weil Blut aus den Beinen zum Herzen fließt.

Entscheidend ist das Leitsymptom: bei Atemnot Oberkörper hoch, bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage, bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung nicht bewegen; bei Verletzungen an Beinen oder Becken keine Schocklage. (Beurteilung 1 P., Begründung mit Gegenbeispiel 1 P.)

Teil B · Anaphylaxie – im Team handeln

AA4: Ableiten – Notfall-Simulation: Sie arbeiten in Ihrer Stammgruppe. Die App spielt die Patientin oder den Patienten und zeigt einen Monitor. **Was Sie tun, verändert die Werte.** Verteilen Sie die Rollen:

⏱ *25 min · Gruppenarbeit (Stammgruppe 3–4) → Plenum · AFB II · Ich-kann-Liste W2 Nr. 3 · Lehrplan CE 06: Simulation von Notfallsituationen, I.4.a*

🩺 Pflegefachperson	📟 Monitor & Stimme	📝 Protokoll
Entscheidet und wählt in der App die Handlungen aus. Sagt laut, was sie tut und warum.	Bedient das Handy, liest die Aussagen der Patientin/des Patienten und die Werte laut vor.	Führt das Notfallprotokoll (Anlage): Uhrzeit, Werte, Maßnahme, Grundlage. In 4er-Gruppen zusätzlich: Beobachtung (Lagerung, Verantwortung).

Spielen Sie die drei Varianten nacheinander (je ca. 6 Minuten) und **wechseln Sie nach jeder Runde die Rollen**:

A – Klinik: Herr Kaiser (58), Eisen-Kurzinfusion · **B – Pflegeheim:** Frau Gruber (84), neues Schmerzmittel · **C – ambulante Pflege:** Herr Hager (66), Bienenstich, eigenes Notfallset

Nach jeder Runde zeigt die App einen **Zeitstrahl**. Vergleichen Sie ihn mit Ihrem Protokoll. Nach der dritten Runde: Ergänzen Sie den Merksatz.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-simulation.html

Merksatz AA4

Anaphylaxie: Allergen **stoppen**, Hilfe holen, lagern nach **Leitsymptom**, **Adrenalin** i. m. nach Anordnung oder SOP, überwachen und **dokumentieren**.

b) Nachbesprechung: Es war jedes Mal ein anaphylaktischer Schock. **Begründen** Sie, warum Sie in den drei Varianten trotzdem unterschiedlich gelagert haben.

Die Lagerung richtet sich nach dem Leitsymptom: A (Herr Kaiser) Atemnot → Oberkörper hoch; B (Frau Gruber) Kreislaufzeichen ohne Atemnot → flach, Beine hoch; C (Herr Hager) bewusstlos mit normaler Atmung → stabile Seitenlage.

c) Klausurtraining: Vergleichen Sie die Klinik (Variante A) mit dem Pflegeheim (Variante B).

Nr.	Aufgabe	Punkte
4.1	Nennen Sie 3 Maßnahmen, die Sie bei Herrn Kaiser zusätzlich zu den Maßnahmen bei Frau Gruber durchführen dürfen oder müssen. Begründen Sie jede Maßnahme.	___ / 3

z. B.: Infusion sofort stoppen, venösen Zugang belassen – das Allergen fließt sonst weiter; den Zugang braucht das Notfallteam für Medikamente und Volumen.

Adrenalin 0,5 mg i. m. in die Außenseite des Oberschenkels nach Notfall-SOP – die SOP erlaubt Pflegefachpersonen die Gabe (bei Frau Gruber gibt es keine Anordnung und keine SOP).

Sauerstoff nach SOP (Maske mit Reservoir) – Atemnot, SpO_2 ↓; die SOP erlaubt die Gabe.

Volumengabe nach ärztlicher Anordnung vorbereiten – der Zugang liegt bereits.

Notfallteam der Klinik statt Notruf 112 – Ärztin ist im Haus und schnell da.

(je Maßnahme mit Begründung 1 P., max. 3 P.)

AA5: Unterscheiden – Wer darf was? a) Aufstellung: Ihre Lehrkraft liest Maßnahmen vor. Stellen Sie sich in die passende Ecke des Raums und **begründen** Sie Ihre Wahl. Tragen Sie danach die Maßnahmen aus dem Wortspeicher in die Tabelle ein.

⏱ *12 min (a und b) · Plenum (Aufstellung) → Einzelarbeit → Partnerarbeit → Plenum · AFB II–III · Ich-kann-Liste W2 Nr. 3 und 4 · Kompetenz III.2.b*

Wortspeicher

Infusion stoppen, Zugang belassen · Hilfe holen (Notfallteam bzw. 112) · nach Leitsymptom lagern ·

Puls, Blutdruck, Atmung, SpO_2 messen · Adrenalin i. m. geben · Sauerstoff geben · Antihistaminikum geben · Infusion zur Volumengabe anschließen · eigenen Autoinjektor nach dem ärztlichen Notfallplan anwenden · Diagnose „anaphylaktischer Schock“ stellen · Ereignis dokumentieren · über weitere Therapie und Dauer der Überwachung entscheiden

🟢 **mache ich selbst (eigenverantwortlich)**	🟡 **nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP**	🔴 **ärztliche Aufgabe**
Infusion stoppen, Zugang belassen; Hilfe holen (Notfallteam bzw. 112); nach Leitsymptom lagern; Puls, Blutdruck, Atmung, SpO_2 messen; Ereignis dokumentieren	Adrenalin i. m.; Sauerstoff; Antihistaminikum; Infusion zur Volumengabe; eigenen Autoinjektor nach dem Notfallplan (der Plan ist die ärztliche Anordnung für diese Person)	Diagnose stellen; über weitere Therapie und Dauer der Überwachung entscheiden; Medikamente anordnen

Informationstext: Verantwortung im Notfall

„[Pflegefachpersonen] treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder des Arztes ein.“ (PflAPrV, Anlage 1, I.4.a; vgl. § 5 PflBG)

Eigenverantwortlich: Gefahr erkennen, Hilfe holen, Allergen stoppen, lagern, überwachen, dokumentieren.

Nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP: Medikamente – auch Adrenalin –, Sauerstoff und Infusionen. Eine **Notfall-SOP** ist eine schriftliche, ärztlich freigegebene Handlungsanweisung der Einrichtung für eine bestimmte Notfallsituation. Pflegende „wirken … an der Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen … mit“ (III.2.b).

Als Auszubildende/r: unter Anleitung handeln, sofort eine Pflegefachperson holen, die eigenen Grenzen kennen.

b) Adrenalin oder Antihistaminikum? Lesen Sie den Informationstext und den Dialog.

Problem bei der Anaphylaxie	Wirkung von Adrenalin
Gefäße weit → Blutdruck fällt	Gefäße eng → Blutdruck steigt
Schleimhäute geschwollen (Kehlkopf, Lippen)	Schleimhäute schwellen ab
Bronchien eng → Atemnot	Bronchien weit
Herz muss mehr leisten	Herz schlägt kräftiger
Mastzellen setzen weiter Histamin frei	weniger Histamin wird freigesetzt

Adrenalin wirkt von allen Notfallmedikamenten bei Anaphylaxie **am schnellsten**. Erwachsene erhalten 0,3–0,5 mg in den Muskel an der **Außenseite des Oberschenkels** (auch als Fertigspritze, sog. Autoinjektor); nach 5–10 Minuten kann die Gabe wiederholt werden. **Antihistaminika** blockieren nur die Histamin-Wirkung, wirken langsamer und haben keine belegte Wirkung auf Kreislauf und Bronchien. **Glukokortikoide** (Kortison) wirken erst nach Stunden. Beide kommen erst **nach** Adrenalin – sie ersetzen es nicht.

Quelle: nach S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

💬 **Herr Brandt, Pflegefachkraft:**
„Geben Sie ihr erst mal das Antihistaminikum aus dem Notfallkoffer. Adrenalin ist mir zu heftig.“

💬 **Lina, Auszubildende:**
„Aber in unserer Notfall-SOP steht Adrenalin ganz oben …“

Think: Wer hat recht? Notieren Sie zwei Argumente (2 Min.). **Pair:** Vergleichen Sie mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner (2 Min.). **Share:** Einige Paare stellen vor.

Nr.	Aufgabe	Punkte
5.1	Nehmen Sie Stellung zu der Aussage von Herrn Brandt.	___ / 3

Die Aussage ist fachlich falsch. Beim anaphylaktischen Schock ist Adrenalin i. m. das Mittel der ersten Wahl (nach SOP bzw. ärztlicher Anordnung): Es stellt die Gefäße eng und hebt den Blutdruck, lässt die Schleimhäute abschwellen, weitet die Bronchien und wirkt am schnellsten.

Ein Antihistaminikum blockiert nur Histamin, wirkt langsamer und hebt weder den Blutdruck noch weitet es die Bronchien. Es darf Adrenalin nicht verzögern und kann danach gegeben werden.

Lina sollte die SOP ansprechen und sofort das Notfallteam bzw. die Ärztin einbeziehen. (Beurteilung 1 P., je fachliches Argument 1 P., max. 3 P.)

Klausurtraining: Sofortmaßnahmen ableiten und dokumentieren

AA6: Klausurtraining – Transferfall: Lösen Sie die Aufgaben **allein und ohne Unterlagen** (ca. 8 Minuten). Tauschen Sie dann mit einer Person aus einer **anderen** Stammgruppe. Bewerten Sie deren Lösung mit dem **Bewertungsraster in der App** und geben Sie eine Rückmeldung in einem Satz.

15 min · Einzelarbeit → Peer-Korrektur mit App-Raster · AFB I–III · KA-Format (KB 1, Aufg. 3.3) · Examensvorbild: Mai 2024 Tag 3, Aufg. 8.2; Mai 2026 Tag 1, Aufg. 3.2

Fallsituation

Sie sind in der Tagespflege „Sonnenhof“ eingesetzt. Herr Klaus Martens (74) hat einen Diabetes mellitus Typ 2 und eine Herzinsuffizienz. Gegen 14:15 Uhr sitzt er mit anderen Gästen auf der Terrasse beim Kaffee. Plötzlich schreit er auf: Eine Wespe hat ihn in die Oberlippe gestochen.

Nach etwa fünf Minuten ist seine Oberlippe stark geschwollen, am Hals bilden sich Quaddeln. Mit kloßiger Stimme sagt er: „Mir ist so eng im Hals.“ Beim Einatmen hören Sie ein pfeifendes Geräusch. Sie messen: Atemfrequenz 28/min, Puls 124/min, Blutdruck 92/60 mmHg (am Morgen: 150/85 mmHg). In der Tagespflege ist keine Ärztin anwesend. Ein Notfallset hat Herr Martens nicht dabei.

Pflegefachpersonen treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
6.1	Beschreiben Sie stichwortartig 5 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Herrn Martens bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes einleiten. Begründen Sie dabei die Positionierung von Herrn Martens.	___ / 6
6.2	Kennzeichnen Sie in Ihrer Antwort zu 6.1 jede Maßnahme, die Sie nur nach ärztlicher Anordnung durchführen dürfen, mit „n. ä. A.“.	___ / 1
6.3	*Der Rettungsdienst hat Herrn Martens übernommen.* Nennen Sie 6 Informationen, die Sie in der Pflegedokumentation festhalten.	___ / 3

6.1 und 6.2

z. B.: Hilfe holen: eine Kollegin setzt den Notruf 112 ab (Notärztin nötig); Herrn Martens nicht allein lassen.

Oberkörper hoch (halbsitzend), weil Atemnot und Schwellung im Vordergrund stehen (Kloßgefühl, pfeifende Einatmung, 28/min): Die Atemhilfsmuskulatur kann arbeiten. Keine Schocklage – auch wegen der Herzinsuffizienz. Nicht aufstehen oder gehen lassen.

Vitalzeichen engmaschig überwachen: Atmung, Puls, Blutdruck, Bewusstsein, wenn vorhanden SpO_2 (Schockindex 124 : 92 ≈ 1,3).

Beengende Kleidung am Hals öffnen; Einstichstelle zusätzlich kühlen (Kühlpack in ein Tuch gewickelt).

Nichts zu essen oder zu trinken geben (Schwellung, Aspirationsgefahr).

Adrenalin i. m. (n. ä. A.) – gibt hier die Notärztin, da keine Anordnung und kein Notfallset vorliegen; Sauerstoff (n. ä. A.).

Uhrzeit, Werte und Maßnahmen notieren; bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage, ohne normale Atmung Reanimation (KB III).

6.1: je beschriebene Maßnahme 1 P. (max. 5), Begründung der Positionierung 1 P.; Schocklage trotz Atemnot oder Antihistaminikum statt Adrenalin wird nicht gewertet. 6.2: 1 P., wenn alle Medikamenten- und Sauerstoff-Maßnahmen mit „n. ä. A." gekennzeichnet sind.

6.3

z. B. (je 0,5 P.): Uhrzeit des Stichs und Beginn der Beschwerden · Auslöser (Wespenstich Oberlippe) · Symptome (Lippenschwellung, Quaddeln, Kloßgefühl, pfeifende Atmung) · Vitalwerte mit Uhrzeit (AF 28/min, Puls 124/min, RR 92/60 mmHg, Vorwert 150/85) · Maßnahmen mit Uhrzeit und Namenskürzel (Notruf, Lagerung, Überwachung) · Übergabe an den Rettungsdienst (Uhrzeit, Zielklinik) · Information der Angehörigen bzw. Hausärztin · Insektengiftallergie in der Akte vermerken · Hinweis auf Nachbeobachtung wegen möglicher zweiter Reaktion (zweigipfliger Verlauf) weitergeben.

Peer-Korrektur: Öffnen Sie das Bewertungsraster, haken Sie ab, was Ihre Partnerin oder Ihr Partner geschrieben hat. Die App zählt die Punkte – wie im Erwartungshorizont der Klassenarbeit.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-raster.html

Meine Punkte: ____ / 10 · Das muss ich noch üben:

_____

Teil C · Zurück zu Frau Maler

AA7: Erklären – Placemat: Arbeiten Sie zu viert mit der Placemat (A3). Jede Person übernimmt ein **Außenfeld** – einen Zeitpunkt aus Christins Bericht – und notiert still: Was steckt dahinter? Gehört es zur Kette? Was hätte Christin selbst tun können? (3 Min.) Drehen Sie die Placemat und lesen Sie die anderen Felder (3 Min.). **Einigen Sie sich in der Mitte** auf die Kausalkette und beantworten Sie gemeinsam die Leitfrage (4 Min.).

⏱ *15 min · Gruppenarbeit (4er, Placemat) → Plenum · AFB III · Ich-kann-Liste W2 Nr. 5 · Brücke zu Woche 4 (Aspiration) und Woche 7 (Thrombose)*

Tipp: Erinnern Sie sich an die Thromboseprophylaxe aus dem 1. Ausbildungsjahr. Nicht jeder Zeitpunkt gehört zur Kette!

Lösung Placemat

Feld Wade (morgens): Wade dick, Schmerz beim Auftreten → Verdacht auf tiefe Beinvenenthrombose (Immobilität nach Hüft-TEP, Angst vor Luxation). Gehört zur Kette. Christin: sofort weitergeben, nicht massieren, nicht mobilisieren bis zur ärztlichen Abklärung.

Feld Frühstück: verschluckt sich, hustet kräftig → leichte Atemwegsverlegung; Husten lassen war richtig. Gehört **nicht** zur Kette (Woche 4).

Feld 11 Uhr: Luftnot, P 118, RR 105/70, blass, kaltschweißig, unruhig → Lungenembolie mit obstruktivem Schock (kompensiert, Schockindex ≈ 1,1). Sofort Hilfe holen, Oberkörper hoch, nicht mobilisieren, nicht allein lassen, überwachen.

Feld Mittag: zyanotisch, keine Reaktion, kein Puls → Kreislaufstillstand; Hilfe rufen, Reanimation (KB III).

Mitte (Kette): Immobilität → tiefe Beinvenenthrombose → Lungenembolie → obstruktiver Schock → Kreislaufstillstand.

Klausurtraining (in der Stunde beginnen, zu Hause fertigstellen):

Frau Maler zeigte bereits Stunden vor dem Kreislaufstillstand Warnzeichen.

Nr.	Aufgabe	Punkte
7.1	Erläutern Sie in Bezug auf die Situation von Frau Maler, wie es von ihrer Immobilität bis zum Kreislaufstillstand kommen konnte.	___ / 5
7.2	Beschreiben Sie 3 Maßnahmen, die um 11 Uhr hätten eingeleitet werden müssen. Begründen Sie die Positionierung von Frau Maler.	___ / 4

7.1

Nach der Hüft-TEP liegt Frau Maler aus Angst vor einer Luxation fast nur im Bett (Immobilität) → das Blut fließt in den Beinvenen langsamer und gerinnt nach der Operation leichter → tiefe Beinvenenthrombose (rechte Wade dick, schmerzt beim Auftreten) – trotz Heparin.

Ein Teil des Gerinnsels löst sich (möglicherweise beim Aufsetzen an der Bettkante) und wird über das rechte Herz in die Lungenarterie geschwemmt → Lungenembolie: Das Blut kann nicht mehr ungehindert durch die Lunge fließen.

Das linke Herz bekommt zu wenig Blut, das Herzzeitvolumen sinkt → obstruktiver Schock (11 Uhr: Luftnot, Puls 118/min, Blässe, kalter Schweiß, Unruhe; Schockindex ≈ 1,1).

Ohne Behandlung dekompensiert der Kreislauf → Kreislaufstillstand (Mittag: Zyanose, kein Puls). (je schlüssiges Glied mit Fallbezug 1 P., max. 5 P.)

7.2

z. B.: Sofort eine Pflegefachkraft holen bzw. Ärztin oder Notruf – Verdacht auf Lungenembolie mit Schockzeichen, nicht abwarten.

Oberkörper hoch lagern, weil die Luftnot im Vordergrund steht (Atemhilfsmuskulatur); keine Schocklage.

Nicht aufstehen oder mobilisieren lassen (weitere Gerinnsel könnten sich lösen); nicht allein lassen.

Vitalzeichen engmaschig: Puls, Blutdruck, Atemfrequenz, SpO_2, Bewusstsein; Sauerstoff n. ä. A. oder SOP; Beobachtungen mit Uhrzeit dokumentieren und weitergeben.

(je Maßnahme 1 P., Begründung der Positionierung 1 P.)

Check-out: Ihre Entscheidung, bitte! – Runde 2. Scannen Sie den QR-Code vom Einstieg noch einmal und stimmen Sie erneut ab. Vergleichen Sie am Beamer: Wo hat sich die Klasse verändert?

5 min · Einzelarbeit → Plenum · Lernstandsdiagnose; Verbindung zur Klausurvorbereitung

Ich-kann-Liste Woche 2: Schätzen Sie sich ein: ☺ sicher · 😐 teilweise · ☹ noch nicht. Bei 😐 oder ☹ notieren Sie, wo Sie nachlesen.

Ich kann …	☺ 😐 ☹	Nachlesen in …
1. … den hypovolämischen, den anaphylaktischen und den neurogenen Schock vergleichen.		Expertenblätter, AA2
2. … die Lagerung nach Leitsymptom beschreiben und begründen.		AA3, AA4b
3. … Sofortmaßnahmen bei einem anaphylaktischen Schock ableiten und meine Verantwortung beschreiben.		AA4, AA5, AA6
4. … falsche Aussagen zum Schock identifizieren und die Korrektur fachlich begründen.		Einstieg, AA3.2, AA5.1
5. … am Fall Frau Maler die Kausalkette bis zum Kreislaufstillstand erklären.		AA7

Zurück zur Leitfrage: *Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen?*

Die Luftnot kommt von einer Lungenembolie: Ein Gerinnsel aus der Beinvene hat die Lungenstrombahn verlegt → obstruktiver Schock. Um 11 Uhr: Oberkörper hoch (Luftnot im Vordergrund), nicht mobilisieren, nicht allein lassen, sofort Hilfe holen und engmaschig überwachen.

Hausaufgabe · Klausurtraining wie im Examen

Bearbeitungszeit: ca. 26 Minuten · Hilfsmittel: keine · 20 Punkte – Lösen Sie die Aufgaben wie in einer Prüfung. Kontrollieren Sie sich danach selbst mit der App.

⏱ *ca. 26 min (1,3 min je Punkt wie im Examen) · Einzelarbeit zu Hause · AFB I–III · Examensformat: Ausgangssituation, Rahmensatz je Aufgabe, Situationswechsel im Aufgabenstamm (vgl. Mai 2024 Tag 1, 1.2; Mai 2024 Tag 3, 8.1–8.2; Mai 2026 Tag 1, 1.3)*

Ausgangssituation

Sie arbeiten als Auszubildende bzw. Auszubildender im zweiten Ausbildungsdrittel in der orthopädischen Rehabilitationsklinik „Talblick“. Frau Sabine Lorenz (52) ist seit einer Woche nach einer Bandscheibenoperation an der Lendenwirbelsäule bei Ihnen. Sie ist verheiratet, arbeitet als Bankkauffrau und möchte „so schnell wie möglich wieder fit sein“. In ihrem Allergiepass steht eine Fischallergie. Ihr Notfallset hat sie zu Hause vergessen.

Beim Mittagessen um 12:20 Uhr isst sie Gemüsecurry. Erst später stellt sich heraus, dass die Soße mit Fischsauce gewürzt war. Um 12:35 Uhr klingelt Frau Lorenz. Sie kratzt sich an den Händen und an der Kopfhaut, am Bauch sind Quaddeln zu sehen. Sie sagt: „Mir ist so schwindelig und übel.“ Sie ist blass und unruhig. Sie messen: Puls 124/min, Blutdruck 86/52 mmHg, Atemfrequenz 20/min, Sauerstoffsättigung 96 %. Bei der Morgenrunde lagen der Blutdruck bei 128/78 mmHg und der Puls bei 72/min. Ihre Stimme klingt normal, sie hat keine Atemnot. Die Stationsärztin ist im Haus erreichbar; für allergische Notfälle gibt es eine Notfall-SOP.

Aufgabe 1 (7 Punkte)

Pflegefachpersonen schätzen akute Situationen anhand von Beobachtungen und Messwerten ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
1.1	Beurteilen Sie aus pflegerischer Perspektive die im vorliegenden Fall beschriebenen Messdaten von Frau Lorenz: a) Puls b) Blutdruck	___ / 3
1.2	Begründen Sie anhand von 4 Symptomen aus der Situation, dass bei Frau Lorenz ein anaphylaktischer Schock vorliegt.	___ / 4

1.1 a) Puls 124/min: deutlich erhöht (Tachykardie), Anstieg von 72/min → der Kreislauf versucht auszugleichen. (1,5 P.)

1.1 b) Blutdruck 86/52 mmHg: zu niedrig, deutlicher Abfall vom Vorwert 128/78 mmHg; Schockindex 124 : 86 ≈ 1,4 (über 1) → spricht für einen Schock. (1,5 P.)

1.2 z. B. (je Symptom mit Zuordnung 1 P.): zeitlicher Zusammenhang – Beginn 15 Min. nach dem Essen mit Fischsauce bei bekannter Fischallergie · Haut – Juckreiz an Händen und Kopfhaut, Quaddeln am Bauch · Kreislauf – Puls 124/min, Blutdruckabfall von 128/78 auf 86/52 mmHg, Blässe, Schwindel · Magen-Darm – Übelkeit · Gehirn – Unruhe (Minderdurchblutung).

Für die volle Punktzahl muss die Kreislaufbeteiligung genannt sein (wie in der Klassenarbeit).

Aufgabe 2 (9 Punkte)

Pflegefachpersonen treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten Sofortmaßnahmen ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
2.1	Beschreiben Sie stichwortartig 6 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Frau Lorenz einleiten. Begründen Sie die Positionierung.	___ / 7
2.2	*Fünf Minuten später ist Frau Lorenz heiser und sagt: „Ich krieg so schlecht Luft.“ Die Sauerstoffsättigung sinkt auf 90 %.* Begründen Sie, wie Sie Frau Lorenz jetzt positionieren.	___ / 2

2.1 z. B.: nicht weiteressen (Allergen stoppen) · Hilfe holen: Stationsärztin bzw. Notfallteam alarmieren, Frau Lorenz nicht allein lassen · flach lagern, Beine hoch, weil Kreislaufzeichen ohne Atemnot im Vordergrund stehen → mehr Blut zum Herzen; nicht aufsetzen oder aufstehen lassen · Adrenalin i. m. nach Notfall-SOP bzw. ärztlicher Anordnung vorbereiten/verabreichen (Außenseite Oberschenkel) · venösen Zugang und Volumengabe n. ä. A. vorbereiten · Sauerstoff n. ä. A./SOP · Vitalzeichen engmaschig (Puls, Blutdruck, Atmung, SpO_2, Bewusstsein) · Uhrzeit, Symptome und Maßnahmen dokumentieren.

(je Maßnahme 1 P., max. 6 P.; Begründung der Positionierung 1 P.; Antihistaminikum statt Adrenalin wird nicht gewertet)

2.2 Jetzt Oberkörper hoch (halbsitzend), weil die Atemnot im Vordergrund steht (Heiserkeit = Schleimhautschwellung, SpO_2 90 %): Die Atemhilfsmuskulatur kann arbeiten. Trotzdem nicht auf die Bettkante setzen oder aufstehen lassen; Kreislauf weiter überwachen und die Ärztin über die Verschlechterung informieren. (Positionierung 1 P., Begründung 1 P.)

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Pflegefachpersonen steuern den Pflegeprozess auch nach einem Notfall.

Nr.	Aufgabe	Punkte
3.1	*Frau Lorenz geht es nach der Behandlung besser. Die Ärztin ordnet an, sie 24 Stunden lang zu überwachen.* Formulieren Sie 1 Pflegeproblem von Frau Lorenz im PESR-Format.	___ / 4

P: Frau Lorenz ist gefährdet, erneut eine anaphylaktische Reaktion bis hin zum Schock zu entwickeln (zweigipfliger Verlauf möglich).

E: Fischallergie; anaphylaktischer Schock um 12:35 Uhr nach Fischsauce; Notfallset nicht vorhanden.

S: (Risiko – darauf wird geachtet) Juckreiz, Quaddeln, Heiserkeit, Atemnot, Schwindel, Puls ↑, Blutdruck ↓.

R: kennt ihre Allergie und hat einen Allergiepass; ist wach und kann Beschwerden sofort mitteilen; möchte rasch wieder gesund werden. (je P, E, S, R 1 P.)

Selbstkontrolle: Die App zeigt die Musterlösung erst, wenn Sie bestätigen, dass Ihre Antwort auf dem Papier steht. Dann haken Sie ab und zählen Ihre Punkte.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-transfer.html

Meine Punkte: ____ / 20 · Das muss ich noch üben:

_____

Expertenblatt A · Hypovolämischer Schock [LSG]

Ihre Aufgabe als Expertin oder Experte: Gleich erklären Sie Ihrer Stammgruppe Ihre Schockform. Bearbeiten Sie dafür die Aufträge a–c in Ihrer Expertengruppe.

Fallsituation

Herr Gerhard Albrecht (81) lebt seit vier Jahren im Pflegeheim „Am Kocherufer“. Wegen eines Vorhofflimmerns nimmt er einen Gerinnungshemmer. Er hört schlecht und trägt deshalb zwei Hörgeräte. Am Vormittag hatte er schwarzen, klebrigen Stuhlgang.

Als Sie ihn um 11:30 Uhr zum Mittagessen an die Bettkante setzen wollen, sagt er: „Mir wird ganz schwarz vor Augen.“ Er ist blass, seine Stirn ist kalt und feucht. Mehrmals bittet er um etwas zu trinken. Er wirkt unruhig und fragt, wo seine Frau sei, obwohl er sonst gut orientiert ist. Sie messen: Puls 116/min, Blutdruck 98/72 mmHg, Atemfrequenz 24/min. Bei der Morgenrunde lagen die Werte bei Puls 78/min und Blutdruck 145/85 mmHg.

a) Identifizieren: Markieren Sie in der App alle Stellen im Fall, die auf einen Schock hinweisen.

Scannen Sie den QR-Code und tragen Sie **Vorname + Raumcode** ein. Tippen Sie im Fall alle Hinweise auf einen Schock an. Die App zeigt Ihnen, was Sie übersehen haben. **Am Ende:** Ergänzen Sie den Merksatz.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-markieren.html?fall=a

Merksatz AA1

Ein Schock zeigt sich an den Zeichen des **Kreislaufs**: Puls, Blutdruck, Haut und Bewusstsein. Die Schockform erkenne ich an der **Ursache** und an den **Begleitzeichen**, z. B. Quaddeln oder Lähmungen.

Informationstext A: Hypovolämischer Schock

Ursache: Dem Gefäßsystem fehlt Volumen, weil Blut oder Flüssigkeit verloren geht, z. B. durch eine Blutung (sichtbar nach außen oder verborgen im Körper wie bei einer Magen-Darm-Blutung), durch Verbrennungen oder durch starken Durchfall und Erbrechen. Gerinnungshemmer erhöhen das Blutungsrisiko. Schwarzer, klebriger Stuhl (Teerstuhl) ist ein Hinweis auf eine Blutung im Magen oder Zwölffingerdarm.

Entstehung: Weniger Volumen → weniger Blut fließt zum Herzen zurück → das Herz kann weniger auswerfen (Schlagvolumen sinkt) → der Blutdruck droht zu fallen. Der Sympathikus gleicht aus: Der Puls steigt, die Gefäße in Haut, Muskeln, Niere und Darm verengen sich (Zentralisation, siehe Woche 1). Hält der Verlust an, gerät der Körper in die Schockspirale.

Typische Zeichen: schneller, schwacher Puls; blasse, kalte, schweißige Haut; Durst; Unruhe, Angst, Verwirrtheit; schnelle Atmung; wenig Urin. Der Blutdruck fällt erst spät – entscheidend ist der Vergleich mit dem Vorwert (Schockindex).

Darauf achte ich besonders: Blutungsquelle (Stuhl, Erbrochenes, Verband, Drainage), Puls und Blutdruck im Verlauf, Bewusstsein, Urinausscheidung.

Erste Schritte: Hilfe holen, Ärztin oder Arzt informieren; nicht aufsetzen oder aufstehen lassen; flach lagern, Beine hoch (wenn keine Atemnot); Wärme erhalten; nichts essen oder trinken lassen (mögliche Untersuchung oder Operation); engmaschig überwachen; Volumengabe nur nach ärztlicher Anordnung.

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); Ich-kann-Liste KB I; sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: hypovolämisch = mit zu wenig Volumen | Teerstuhl = schwarzer Stuhl durch verdautes Blut | Zentralisation = Umverteilung des Blutes zu Gehirn und Herz

b) Klausurtraining:

Nr.	Aufgabe	Punkte
b	Begründen Sie anhand von 4 Symptomen aus der Situation, dass bei Herrn Albrecht ein hypovolämischer Schock vorliegt.	___ / 4

Tipp wie in der Klassenarbeit: Ordnen Sie jedes Symptom zu (z. B. Kreislauf, Haut, Atemwege) und erklären Sie kurz, was es zeigt. Ohne Kreislaufzeichen gibt es nicht die volle Punktzahl.

z. B. (je Symptom mit Zuordnung 1 P.): Ursache: schwarzer, klebriger Stuhl (Teerstuhl) unter Gerinnungshemmer → Blutung im Magen-Darm-Trakt · Kreislauf: Puls 116/min – Anstieg von 78/min (Tachykardie, Gegenregulation) · Kreislauf: Blutdruck 98/72 mmHg – Abfall von 145/85 mmHg, kleine Amplitude; Schockindex 116 : 98 ≈ 1,2 · Haut: blass, Stirn kalt und feucht (Zentralisation) · Volumenmangel: Durst (bittet mehrmals um etwas zu trinken) · Gehirn: Unruhe, neue Verwirrtheit, „schwarz vor Augen“ (Minderdurchblutung) · Atmung: Atemfrequenz 24/min (Frühzeichen)

Werte nur mit Vorwert-Vergleich voll werten; für die volle Punktzahl muss die Kreislaufbeteiligung genannt sein (vgl. Erwartungshorizont KA, Aufg. 3.1).

c) Expertenkarte: Fassen Sie zusammen, was Ihre Stammgruppe wissen muss. Damit erklären Sie gleich.

Meine Schockform	Hypovolämischer Schock
Ursache	Blutverlust: Magen-Darm-Blutung (Teerstuhl) unter Gerinnungshemmer
Entstehung (in Pfeilen)	Volumen ↓ → Rückstrom zum Herzen ↓ → Schlagvolumen und Blutdruck ↓ → Sympathikus: Puls ↑, Zentralisation
Puls · Haut · weitere Zeichen	Puls schnell (116/min) · Haut blass, kalt, schweißig · Durst, Unruhe, Verwirrtheit, schnelle Atmung, Schwindel
Das gibt es nur bei meiner Schockform	sichtbarer oder verborgener Blutverlust (hier Teerstuhl); starker Durst
Darauf achte ich besonders	Blutungsquelle, Puls und Blutdruck im Verlauf (Schockindex ≈ 1,2), Bewusstsein, Urin
Lagerung und erste Sofortmaßnahme	Hilfe holen, Ärztin informieren; flach, Beine hoch (keine Atemnot); nicht aufsetzen; Wärme; nüchtern lassen; überwachen

Expertenblatt B · Anaphylaktischer Schock [LSG]

Ihre Aufgabe als Expertin oder Experte: Gleich erklären Sie Ihrer Stammgruppe Ihre Schockform. Bearbeiten Sie dafür die Aufträge a–c in Ihrer Expertengruppe.

Fallsituation

Mia (19) ist Auszubildende im ersten Ausbildungsdrittel und mit Ihnen auf einer internistischen Station eingesetzt. In der Pause isst sie ein Stück Geburtstagskuchen, das eine Kollegin mitgebracht hat. Der Kuchen enthält Haselnüsse. Mia erzählt, dass es bei Nüssen „schon mal im Mund gekribbelt" habe. Es ist ihr dritter Tag auf der Station.

Zehn Minuten später kratzt sie sich an Hals und Händen, auf Hals und Brust bilden sich Quaddeln. Ihre Lippen und Augenlider schwellen an. Mit heiserer Stimme sagt sie: „Mir ist schlecht, und mir ist so schwindelig." Sie hat Bauchkrämpfe. Ihre Kollegin misst: Puls 128/min, Blutdruck 88/50 mmHg, Atemfrequenz 26/min, Sauerstoffsättigung 93 %. Mia sagt, ihr Blutdruck sei sonst „immer so 120 zu 70".

a) Identifizieren: Markieren Sie in der App alle Stellen im Fall, die auf einen Schock hinweisen.

Scannen Sie den QR-Code und tragen Sie **Vorname + Raumcode** ein. Tippen Sie im Fall alle Hinweise auf einen Schock an. Die App zeigt Ihnen, was Sie übersehen haben. **Am Ende:** Ergänzen Sie den Merksatz.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-markieren.html?fall=b

Merksatz AA1

Ein Schock zeigt sich an den Zeichen des **Kreislaufs**: Puls, Blutdruck, Haut und Bewusstsein. Die Schockform erkenne ich an der **Ursache** und an den **Begleitzeichen**, z. B. Quaddeln oder Lähmungen.

Informationstext B: Anaphylaktischer Schock

Ursache: Allergische Sofortreaktion des Immunsystems auf einen eigentlich harmlosen Stoff (Allergen), z. B. Medikamente, Insektengift (Wespe, Biene) oder Nahrungsmittel (Nüsse, Erdnüsse, Sellerie, Fisch). Die Reaktion beginnt Sekunden bis Minuten nach dem Kontakt.

Entstehung: Das Allergen bringt Mastzellen dazu, schlagartig Histamin und weitere Botenstoffe freizusetzen. Die Gefäße werden weit und durchlässig: Flüssigkeit tritt ins Gewebe aus (Quaddeln, Schwellungen), im Gefäßsystem fehlt Volumen (relativer Volumenmangel) → der Blutdruck fällt. Gleichzeitig schwellen die Schleimhäute an (z. B. im Kehlkopf) und die Bronchien verengen sich → Atemnot und Sauerstoffmangel. Das Herz versucht mit einem schnellen Puls auszugleichen.

Typische Zeichen – oft an mehreren Organen gleichzeitig: Haut (Juckreiz, Rötung, Quaddeln, Schwellungen); Atemwege (Heiserkeit, Kloßgefühl, pfeifende Atmung, Atemnot, sinkende Sauerstoffsättigung); Kreislauf (schneller Puls, Blutdruckabfall, Schwindel, Bewusstseinsstörung); Magen-Darm (Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe). Achtung: Die Haut kann auch blass sein – Hautzeichen sind nicht immer deutlich.

Darauf achte ich besonders: Atemwege und Atmung (Heiserkeit, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung), Kreislauf. Nach Stunden kann eine zweite Reaktion folgen (zweigipfliger Verlauf) – deshalb Nachbeobachtung.

Erste Schritte: Allergen stoppen, Hilfe holen, lagern nach Leitsymptom, Adrenalin i. m. nach

Anordnung oder SOP (Mittel der ersten Wahl), überwachen, dokumentieren – mehr dazu in AA3 bis AA5.

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); Ich-kann-Liste KB I; sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: Allergen = Auslöser einer Allergie | Mastzellen = Abwehrzellen im Gewebe, die Histamin speichern | Quaddeln = juckende, erhabene Hautschwellungen | anaphylaktisch = durch eine schwere allergische Reaktion

b) Klausurtraining:

Nr.	Aufgabe	Punkte
b	Begründen Sie anhand von 4 Symptomen aus der Situation, dass bei Mia ein anaphylaktischer Schock vorliegt.	___ / 4

Tipp wie in der Klassenarbeit: Ordnen Sie jedes Symptom zu (z. B. Kreislauf, Haut, Atemwege) und erklären Sie kurz, was es zeigt. Ohne Kreislaufzeichen gibt es nicht die volle Punktzahl.

z. B. (je Symptom mit Zuordnung 1 P.): zeitlicher Zusammenhang: Beginn etwa 10 Minuten nach dem Haselnusskuchen (Allergen) · Haut: Juckreiz, Quaddeln an Hals und Brust, Schwellung von Lippen und Augenlidern · Atemwege: heisere Stimme (Schwellung der Kehlkopfschleimhaut), Atemfrequenz 26/min, SpO_2 93 % · Kreislauf: Blutdruck 88/50 mmHg – deutlich unter ihrem üblichen Wert (120/70); Puls 128/min (Tachykardie) · Magen-Darm: Übelkeit, Bauchkrämpfe · Gehirn/Kreislauf: Schwindel

Werte nur mit Vorwert-Vergleich voll werten; für die volle Punktzahl muss die Kreislaufbeteiligung genannt sein (vgl. Erwartungshorizont KA, Aufg. 3.1).

c) Expertenkarte: Fassen Sie zusammen, was Ihre Stammgruppe wissen muss. Damit erklären Sie gleich.

Meine Schockform	Anaphylaktischer Schock
Ursache	Allergie: Haselnüsse im Kuchen (Nahrungsmittel)
Entstehung (in Pfeilen)	Allergen → Mastzellen setzen Histamin frei → Gefäße weit und durchlässig → relativer Volumenmangel → Blutdruck ↓; Schleimhaut ↑, Bronchien eng → Atemnot
Puls · Haut · weitere Zeichen	Puls schnell (128/min) · Haut: Juckreiz, Quaddeln, Schwellungen · Heiserkeit, Atemnot, Übelkeit, Bauchkrämpfe, Schwindel
Das gibt es nur bei meiner Schockform	Haut- und Schleimhautzeichen (Quaddeln, Schwellungen), Atemwegszeichen; zeitlicher Zusammenhang mit einem Allergen
Darauf achte ich besonders	Atemwege und Atmung (Heiserkeit, SpO_2), Kreislauf; zweite Reaktion nach Stunden möglich
Lagerung und erste Sofortmaßnahme	Allergen stoppen, Hilfe holen, lagern nach Leitsymptom, Adrenalin i. m. nach Anordnung/SOP

Expertenblatt C · Neurogener Schock [LSG]

Ihre Aufgabe als Expertin oder Experte: Gleich erklären Sie Ihrer Stammgruppe Ihre Schockform. Bearbeiten Sie dafür die Aufträge a–c in Ihrer Expertengruppe.

Fallsituation

An einem Sonntagnachmittag sind Sie privat mit Freunden am Baggersee. Tobias Weber (24) springt kopfüber vom Steg ins Wasser – an einer Stelle, an der das Wasser nur hüfttief ist. Seine Freunde ziehen ihn sofort ans Ufer. Kurz vorher hatte er sich noch mit Sonnencreme eingecremt.

Herr Weber ist wach und sagt: „Ich spür meine Beine nicht. Und meine Hände kribbeln." Er klagt über starke Nackenschmerzen. Arme und Beine kann er kaum bewegen. Seine Atmung ist flach. Sie tasten einen langsamen Puls von 52/min. Die Haut an seinen Beinen ist warm, trocken und rosig. Der Rettungsdienst misst später einen Blutdruck von 82/45 mmHg.

a) Identifizieren: Markieren Sie in der App alle Stellen im Fall, die auf einen Schock hinweisen.

Scannen Sie den QR-Code und tragen Sie **Vorname + Raumcode** ein. Tippen Sie im Fall alle Hinweise auf einen Schock an. Die App zeigt Ihnen, was Sie übersehen haben. **Am Ende:** Ergänzen Sie den Merksatz.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-markieren.html?fall=c

Merksatz AA1

Ein Schock zeigt sich an den Zeichen des **Kreislaufs**: Puls, Blutdruck, Haut und Bewusstsein. Die Schockform erkenne ich an der **Ursache** und an den **Begleitzeichen**, z. B. Quaddeln oder Lähmungen.

Informationstext C: Neurogener Schock

Ursache: Verletzung des Rückenmarks, meist im Bereich der Halswirbelsäule oder der oberen Brustwirbelsäule, z. B. durch einen Kopfsprung in flaches Wasser, einen Sturz aus der Höhe oder einen Verkehrsunfall.

Entstehung: Im Rückenmark verlaufen auch die Nervenbahnen des Sympathikus. Sind sie unterbrochen, fehlt den Gefäßen unterhalb der Verletzung die Spannung: Sie werden weit, das Blut „versackt", es entsteht ein relativer Volumenmangel → der Blutdruck fällt. Weil der Sympathikus ausfällt, kann der Körper nicht gegensteuern: Der Puls steigt nicht an (oft ist er sogar langsam), und es gibt keine Zentralisation.

Typische Zeichen: niedriger Blutdruck bei langsamem oder normalem Puls; Haut unterhalb der Verletzung warm, trocken und rosig; Lähmungen und Gefühlsstörungen (Kribbeln, Taubheit) unterhalb der Verletzung; Nacken- oder Rückenschmerzen; der Körper kühlt leicht aus; bei sehr hoher Verletzung ist auch die Atmung gestört. Achtung: Die Person wirkt „stabil" – ruhiger Puls, rosige Haut –, ist aber im Schock.

Darauf achte ich besonders: Atmung, Blutdruck und Puls im Verlauf, Körpertemperatur, Lähmungen und Gefühl im Verlauf. Nach einem Unfall kann zusätzlich eine Blutung vorliegen.

Erste Schritte: Notruf veranlassen; den Kopf mit beiden Händen in der vorgefundenen Lage halten; nicht aufsetzen, nicht bewegen; Wärme erhalten; Atmung und Puls überwachen (mehr in Woche 4).

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); Ich-kann-Liste KB I; sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: neurogen = vom Nervensystem ausgehend | Rückenmark = Nervenstrang im Wirbelkanal | Sympathikus = Teil des Nervensystems, der Puls und Gefäßspannung steigert

b) Klausurtraining:

Nr.	Aufgabe	Punkte
b	Begründen Sie anhand von 4 Symptomen aus der Situation, dass bei Herrn Weber ein neurogener Schock vorliegt.	___ / 4

Tipp wie in der Klassenarbeit: Ordnen Sie jedes Symptom zu (z. B. Kreislauf, Haut, Atemwege) und erklären Sie kurz, was es zeigt. Ohne Kreislaufzeichen gibt es nicht die volle Punktzahl.

z. B. (je Symptom mit Zuordnung 1 P.): Ursache: Kopfsprung in flaches Wasser, starke Nackenschmerzen → Verletzung der Halswirbelsäule · Kreislauf: Blutdruck 82/45 mmHg (niedrig) · Kreislauf: langsamer Puls 52/min trotz niedrigem Blutdruck – der Sympathikus fällt aus · Haut: an den Beinen warm, trocken, rosig (keine Zentralisation) · Nerven: Lähmungen (Arme und Beine kaum beweglich), „Ich spür meine Beine nicht“, Kribbeln in den Händen · Atmung: flach (hohe Verletzung)

Werte nur mit Vorwert-Vergleich voll werten; für die volle Punktzahl muss die Kreislaufbeteiligung genannt sein (vgl. Erwartungshorizont KA, Aufg. 3.1).

c) Expertenkarte: Fassen Sie zusammen, was Ihre Stammgruppe wissen muss. Damit erklären Sie gleich.

Meine Schockform	Neurogener Schock
Ursache	Rückenmarksverletzung an der Halswirbelsäule (Kopfsprung in flaches Wasser)
Entstehung (in Pfeilen)	Sympathikus fällt aus → Gefäße weit, Blut versackt → relativer Volumenmangel → Blutdruck ↓; keine Gegenregulation
Puls · Haut · weitere Zeichen	Puls langsam (52/min) · Haut warm, trocken, rosig · Lähmungen, Kribbeln, Nackenschmerz, flache Atmung
Das gibt es nur bei meiner Schockform	langsamer Puls und warme, rosige Haut trotz Schock; Lähmungen und Gefühlsstörungen
Darauf achte ich besonders	Atmung, Blutdruck und Puls, Temperatur (Auskühlung), Lähmungen im Verlauf
Lagerung und erste Sofortmaßnahme	Notruf; Kopf mit beiden Händen halten, nicht bewegen; Wärme erhalten; Atmung und Puls überwachen