



a) Global estimates



Global prevalence (%)

b) Point estimates

KL2	9	7.3	9.5	13.2	2.6
KL102	8.7	10.5	13.4	10.4	2.6
KL25	8.6	3.1	19.7	7.3	4.5
KL15	5.4	3.7	1.1	5	9.3
KL62	4.7	5.3	6.2	5.6	2.1
KL30	3.3	1.3	4.1	4.1	1.9
KL10	2.7	2.1	1.4	2.3	4.2
KL17	2.5	2.1	1.9	2.5	3
KL23	2.5	1.7	0.4	4.3	1.4
KL51	2.4	0.7	0.3	0.5	7.1
KL112	2.4	0.9	0.8	1.2	5.6
KL24	2.3	1.1	1.8	2	3.3
KL149	2.2	0.9	8.7	0.5	0.7
KL39	2	3.1	1.8	2.5	1.1
KL64	1.9	0.8	0.4	1.4	3.9
KL122	1.9	3.1	1.3	2.2	1.5
KL3	1.8	3.1	2.4	1.3	1.8
KL48	1.8	1.8	1.7	0.5	3.7
KL19	1.6	1.7	0.8	1.4	2.5
KL9	1.6	0.9	2.7	1.7	1.1
KL16	1.5	0.8	1.1	2.1	1
KL28	1.4	6.8	0.8	1.4	0.5
KL38	1.3	0.7	0.3	1.3	1.9
KL52	1.3	1.5	0.4	1.6	1.3
KL81	1.3	0.5	0.3	0.2	3.7
KL54	1.3	0.8	1.1	1.1	1.7
KL8	1.1	0.7	3.1	0.3	1.3
KL108	1	1.3	0.6	1.6	0.4
KL136	1	0.5	0.5	0.2	2.6
KL104	0.9	0.5	0.3	1.2	0.8

Mean  
prevalence (%)

Global

Western Africa

Southern Africa

Eastern Africa

Southern Asia

Region