


a) Global estimates




Global prevalence (%)

b) Point estimates

KL	Global	Western Africa	Southern Africa	Eastern Africa	Southern Asia
KL2	9	7.2	9.5	13.1	2.5
KL102	8.7	10.5	13.4	10.5	2.6
KL25	8.3	3.1	18.4	7.3	4.5
KL15	5.8	3.7	1.1	5.9	9.1
KL62	4.5	5.3	6.2	5.4	2
KL30	3.4	1.3	4.8	4.2	1.9
KL10	2.7	2.1	1.4	2.2	4.5
KL17	2.6	2.2	2.4	2.5	3
KL23	2.5	1.7	0.4	4.1	1.4
KL51	2.3	0.7	0.3	0.4	7
KL112	2.3	0.9	0.8	1.1	5.5
KL39	2.2	3.2	2.4	2.7	1.2
KL149	2	0.8	8	0.5	0.7
KL24	2	0.9	0.8	1.8	3.2
KL122	1.8	3	1.3	2.1	1.4
KL3	1.8	3.2	2.4	1.4	1.8
KL64	1.8	0.8	0.4	1.3	3.8
KL19	1.7	1.8	0.8	1.4	2.8
KL16	1.7	0.8	1.2	2.5	1
KL48	1.7	1.8	1.7	0.5	3.6
KL9	1.5	0.9	2.2	1.6	1
KL28	1.3	6.7	0.8	1.3	0.5
KL8	1.2	0.7	3.7	0.3	1.3
KL52	1.2	1.4	0.4	1.5	1.3
KL38	1.2	0.6	0.3	1.3	1.9
KL81	1.2	0.5	0.3	0.2	3.6
KL54	1.2	0.8	1.1	1.1	1.6
KL136	1	0.5	0.5	0.2	2.5
KL108	1	1.3	0.6	1.5	0.4
KL104	0.9	0.5	0.3	1.2	0.8

Mean prevalence (%)



Region