


a) Global estimates




Global prevalence (%)

b) Point estimates

KL2	9	7.3	9.5	13.2	2.6
KL102	8.7	10.5	13.4	10.4	2.6
KL25	8.6	3.1	19.7	7.3	4.5
KL15	5.4	3.7	1.1	5	9.3
KL62	4.7	5.3	6.2	5.6	2.1
KL30	3.3	1.3	4.1	4.1	1.9
KL10	2.7	2.1	1.4	2.3	4.2
KL17	2.5	2.1	1.9	2.5	3
KL23	2.5	1.7	0.4	4.3	1.4
KL51	2.4	0.7	0.3	0.5	7.1
KL112	2.4	0.9	0.8	1.2	5.6
KL24	2.3	1.1	1.8	2	3.3
KL149	2.2	0.9	8.7	0.5	0.7
KL39	2	3.1	1.8	2.5	1.1
KL64	1.9	0.8	0.4	1.4	3.9
KL122	1.9	3.1	1.3	2.2	1.5
KL3	1.8	3.1	2.4	1.3	1.8
KL48	1.8	1.8	1.7	0.5	3.7
KL19	1.6	1.7	0.8	1.4	2.5
KL9	1.6	0.9	2.7	1.7	1.1
KL16	1.5	0.8	1.1	2.1	1
KL28	1.4	6.8	0.8	1.4	0.5
KL38	1.3	0.7	0.3	1.3	1.9
KL52	1.3	1.5	0.4	1.6	1.3
KL81	1.3	0.5	0.3	0.2	3.7
KL54	1.3	0.8	1.1	1.1	1.7
KL8	1.1	0.7	3.1	0.3	1.3
KL108	1	1.3	0.6	1.6	0.4
KL136	1	0.5	0.5	0.2	2.6
KL104	0.9	0.5	0.3	1.2	0.8
Global					
Western Africa					
Southern Africa					
Eastern Africa					
Southern Asia					

Mean prevalence (%)



Region