

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата

**Ксимелин Эко с ментолом**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Ксимелин Эко с ментолом

**Международное непатентованное название:** ксилометазолин

**Лекарственная форма:** спрей назальный дозированный

**Состав:**

1 доза содержит:

*активное вещество:*

ксилометазолина гидрохлорид.....140 мкг

*вспомогательные вещества:*

сорбитол.....1,96 мг

касторовое масло гидрированное...350 мкг

левоментол.....42 мкг

цинеол (эвкалиптол).....28 мкг

натрия хлорид.....728 мкг

натрия гидрофосфата дигидрат.....280 мкг

натрия дигидрофосфата дигидрат.....280 мкг

динатрия эдетат.....70 мкг

вода очищенная.....до 140 мкл

**Описание**

Прозрачная до слегка непрозрачной, бесцветная до слегка окрашенной, жидкость с запахом ментола.

**Фармакотерапевтическая группа:** противоконгестивное средство-вазоконстриктор (альфа-адреномиметик)

**Код АТХ:** R01AA07

**Фармакологические свойства.**

Ксилометазолин относится к группе местных сосудосуживающих средств (деконгестантов) с альфа-адреномиметическим действием, вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой носа, устраняя, таким образом, отек и гиперемию слизистой оболочки носоглотки. Облегчает носовое дыхание при ринитах.

В терапевтических концентрациях не раздражает слизистую, не вызывает гиперемии. Действие наступает через несколько минут и продолжается в течение 10 - 12 часов.

**Фармакокинетика.** При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

**Показания к применению**

Острые респираторные заболевания с явлениями ринита (насморка), острый аллергический ринит, полиноз, синусит, евстахиит, средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки).

Подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, тиреотоксикоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), беременность, детский возраст до 10 лет.

**С осторожностью**

Сахарный диабет, стенокардия напряжения III – IV функционального класса, гиперплазия предстательной железы.

*Во время лактации* препарат должен применяться только после тщательной оценки соотношения пользы и риска для матери и ребенка, не допускается превышать рекомендуемую дозировку.

### **Способ применения и дозы**

Интраназально.

Для взрослых и детей старше 10 лет: По 1 впрыскиванию в каждый носовой ход (при необходимости можно повторить); не следует применять более 3 раз в день.

Продолжительность лечения - не более 10 дней.

### **Побочные эффекты**

При частом и/или длительном применении - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, парестезии, чиханье, гиперсекреция.

Редко - отек слизистой оболочки носа, сердцебиение, тахикардия, аритмии, повышение артериального давления, головная боль, рвота, бессонница, нарушение зрения; депрессия (при длительном применении высоких доз).

### **Передозировка**

Симптомы: усиление побочных эффектов.

Лечение симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Несовместим с ингибиторами моноаминоксидазы и трициклическими антидепрессантами.

### **Особые указания**

Не следует применять в течение длительного времени, например, при хроническом рините. Если симптомы заболевания ухудшаются или состояние больного не улучшается в течение 3-х дней приема Ксимелина Эко с ментолом, необходимо проконсультироваться с врачом.

**Влияние на способность управлять транспортным средством или оборудованием:** Ксимелин Эко с ментолом не влияет на способность управлять транспортным средством или оборудованием.

### **Форма выпуска.**

Спрей назальный дозированный 140 мкг/доза.

По 10 мл препарата (не менее 60 доз) в пластиковом флаконе, снабженном помповым дозирующим устройством с наконечником и защитным колпачком из полиэтилена. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

2,5 года. Не использовать по истечении срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

### **Производитель**

Такеда Никомед АС, Норвегия

Takeda Nycomed AS, Norway

Solbaerveien 5, N-2409 Elverum, Norway

Такеда ГмбХ, Германия

Takeda GmbH, Germany

Robert-Bosch-Str. 8, 78224 Singen, Germany

**Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:**

Такеда Фарма АБ, Швеция  
Box 3131, Björnstigen 87, 169 03 Solna, Sweden

**Претензии потребителей направлять по адресу:**

ООО «Такеда Фармасьютикалс»,  
Москва, 119048, ул. Усачева, д.2, стр.1.  
тел. + 7 (495) 933 55 11,  
факс + 7 (495) 502 16 25  
адреса в Интернете: [www.takeda.com.ru](http://www.takeda.com.ru), [www.xymelin.ru](http://www.xymelin.ru).