

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению

лекарственного препарата

КСИМЕЛИН

Регистрационный номер: П N015643/02

Торговое название препарата:

Ксимелин

Международное непатентованное

название: ксилометазолин

Лекарственная форма: спрей назальный

Состав:

1 мл спрея назального 0,05 % содержит:

активное вещество:

Ксилометазолина гидрохлорид 0,5 мг

вспомогательные вещества: динатрия

эдетат - 0,5 мг, натрия гидрофосфата

дигидрат - 2 мг, натрия дигидрофосфата

дигидрат - 2 мг, натрия хлорид - 7,4 мг,

бензалкония хлорид в виде 10 %

раствора бензалкония - 0,1 мг, вода

очищенная - 991,5 мг.

1 мл спрея назального 0,1 % содержит:

активное вещество:

Ксилометазолина гидрохлорид 1,0 мг

вспомогательные вещества: динатрия

эдетат - 0,5 мг, натрия гидрофосфата

дигидрат - 2 мг, натрия дигидрофосфата

дигидрат - 2 мг, натрия хлорид - 7,3 мг,

бензалкония хлорид в виде 10 %

раствора бензалкония - 0,1 мг, вода

очищенная - 991,1 мг.

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

противоконгестивное средство -

альфа-адреномиметик

Код АТХ: R01AA07

Фармакологические свойства.

Ксилометазолин относится к группе местных сосудосуживающих средств (деконгестантов) с альфа2-

адреномиметическим действием,

вызывает сужение кровеносных сосудов

слизистой оболочки носа, устраняя,

таким образом, отек и гиперемию

слизистой оболочки носоглотки.

Облегчает носовое дыхание при

ринитах.

В терапевтических концентрациях не

раздражает слизистую оболочку носа не

вызывает гиперемию. Действие наступает через несколько минут и продолжается в течение 10 - 12 часов.

Фармакокинетика.

При местном применении практически не абсорбируется, концентрации в плазме настолько малы, что их невозможно определить современными аналитическими методами.

Показания к применению

Острый ринит (в том числе на фоне острых респираторных заболеваний и аллергический ринит), поллиноз, синусит, евстахиит, средний отит (для уменьшения отека слизистой носоглотки).

Подготовка больного к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, тахикардия, выраженный атеросклероз, глаукома, атрофический ринит, тиреотоксикоз, хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе), беременность, детский возраст до 2 лет (для Ксимелина 0,05 %); детский возраст до 6 лет (для Ксимелина 0,1 %).

С осторожностью: сахарный диабет, стенокардия III – IV функционального класса, гиперплазия предстательной железы.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Во время беременности применение препарата противопоказано.

В период грудного вскармливания препарат должен применяться только после тщательной оценки соотношения пользы для матери и риска для ребенка, не допускается превышать рекомендуемую дозу.

Способ применения и дозы

Интраназально.

0,05 % спрей для детей от 2 до 6 лет:

по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 1-2 раза в день; не следует применять более 3 раз в день.
0,1 % спрей для взрослых и детей старше 6 лет: по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход (при необходимости можно повторить); не следует применять более 3 раз в день.

Препарат применяется не более 7 дней, далее по предписанию врача.

Одно впрыскивание Ксимелина 0,05% содержит около 35 мкг ксилометазолина гидрохлорида; одно впрыскивание Ксимелина 0,1% содержит около 140 мкг ксилометазолина гидрохлорида.

Побочные эффекты

При частом и/или длительном применении - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, парестезии, чихание, гиперсекреция. Редко - отек слизистой оболочки носа, сердцебиение, тахикардия, аритмии, повышение артериального давления, головная боль, рвота, бессонница, нарушение зрения; депрессия (при длительном применении высоких доз).

Передозировка

Симптомы: повышение артериального давления переходящее в снижение артериального давления, брадикардия, снижение температуры тела.
Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При совместном применении с ингибиторами моноаминоксидазы и трициклическими антидепрессантами может привести к повышению артериального давления.

Особые указания

Не следует самостоятельно превышать рекомендованные дозы и применять препарат более 7 дней. Если по истечении этого времени симптомы сохраняются, необходимо обратиться ко врачу.

Влияние на способность управлять транспортным средством или оборудованием

Препарат в рекомендуемых дозах не влияет на способность управлять

транспортными средствами.

Форма выпуска. Спрей назальный 0,05 % и 0,1 %.

По 10 мл, 15 мл препарата во флакон темного стекла, снабженный мультidosовым распылителем с наконечником и с защитным колпачком из полиэтилена.

По 1 флакону вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.
Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта

Название и адрес фирмы-производителя:

Никомед Фарма АС, Норвегия
Nycomed Pharma AS, Norway
Солбервейен 5, N-2409 Элверум, Норвегия
Solbærveien 5, N-2409 Elverum, Norway

Название и адрес фирмы, выпускающей контроль качества:

Никомед Дания АпС
Nycomed Danmark ApS
Лангебьерг 1, ДК-4000, Роскильде, Дания
Langebjerg 1, DK-4000, Roskilde, Denmark

Претензии по качеству направлять:
ООО «Никомед Дистрибьюшн Сентэ»,
Москва, 119048, ул. Усачева, д.2, стр.1.
тел. +7 (495) 933 55 11, факс +7 (495) 933 29 05.

адреса в Интернете: www.nycomed.ru,
www.xymelin.ru.