

# Сокращённая инструкция по медицинскому применению препарата

---

**Наименование лекарственного средства:** Називин®.

**Регистрационный номер:** П N012964/01 от 21.05.2007.

**Активное действующее вещество:** оксиметазолина гидрохлорид.

**Лекарственная форма:** капли назальные 0,01%, 0,025% и 0,05%.

## Показания

Лечение острых респираторных заболеваний, сопровождающихся насморком; аллергический ринит; вазомоторный ринит; для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух полости носа, евстахиите, среднем отите; для устранения отёка перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.

## Способ применения и дозы

Називин® 0,01%, 0,025% и 0,05% капли предназначены для применения в нос.

*Взрослые и дети старше 6 лет:* применять капли Називин® 0,05% по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день.

*Дети от 1 года до 6 лет:* применять капли Називин® 0,025% по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в день.

*Дети до 1 года:* детям в возрасте до 4 недель назначают по 1 капле Називин® 0,01% в каждый носовой ход 2–3 раза в день. С 5-й недели жизни и до 1 года – по 1–2 капли в каждую ноздрю 2–3 раза в день. Для обеспечения точности дозировки флакон Називин® 0,01% капель имеет градуированную пипетку с отметками количества капель. Доказана эффективность также и следующей процедуры: в зависимости от возраста, 1–2 капли 0,01% раствора наносят на вату и протирают носовые ходы.

Називин® 0,01%, 0,025% и 0,05% капли следует применять 3–5 дней. Дозы выше рекомендованных можно применять только под наблюдением врача.

## Противопоказания

Атрофический ринит; закрытоугольная глаукома; гиперчувствительность к компонентам препарата. Следует придерживаться рекомендуемых концентраций препарата, предназначенных для разных возрастных категорий (см. способы применения и дозы).

## Побочное действие

*Иногда:* жжение или сухость носовых оболочки, чихание.

*В редких случаях:* после того, как пройдет эффект от применения Називина®, сильное чувство «заложенности» носа. Многократная передозировка при местном назальном использовании приводит иногда к таким системным симпатомиметическим эффектам, как учащение пульса и повышение артериального давления.

*В очень редких случаях* наблюдались беспокойство, бессонница, усталость, головные боли и тошнота.

Длительное непрерывное использование сосудосуживающих препаратов может привести к тахифилаксии, атрофии слизистой оболочки полости носа и возвратному отёку слизистой носа.

## С осторожностью

У пациентов, принимающих ингибиторы моноаминоксидазы и другие препараты, способствующие повышению артериального давления в период до 10 дней после их применения; при повышенном внутриглазном давлении, в период беременности и лактации, при тяжелых формах сердечно-сосудистых заболеваний; при тиреотоксикозе и сахарном диабете.

## Применение при беременности и лактации

При применении в период беременности или грудного вскармливания не следует превышать рекомендуемую дозировку. Препарат должен применяться только после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и плода.

**Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению. Имеются противопоказания.**

**Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.**

**Наименование лекарственного средства:** Називин®.

**Регистрационный номер:** П N013921/01 от 27.12.2007.

**Активное действующее вещество:** оксиметазолина гидрохлорид.

**Лекарственная форма:** спрей назальный, 0,05%.

#### **Показания**

Лечение острых респираторных заболеваний, сопровождающихся насморком; аллергический ринит; вазомоторный ринит; для восстановления дренажа при воспалении придаточных пазух полости носа, евстахиите, среднем отите; для устранения отёка перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.

#### **Способ применения и дозы**

*Взрослым и детям старше 6 лет:* по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки. Препарат применяется 5–7 дней. Дозы выше рекомендованных можно применять только под наблюдением врача.

#### **Противопоказания**

Атрофический ринит; закрытоугольная глаукома; гиперчувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 6 лет.

#### **Побочное действие**

*Иногда:* жжение или сухость носовых оболочки, чихание.

*В редких случаях:* после того, как пройдет эффект от применения Називина®, сильное чувство «заложенности» носа. Многократная передозировка при местном назальном использовании приводит иногда к таким системным симптомам, как учащение пульса и повышение артериального давления.

*В очень редких случаях* наблюдались беспокойство, бессонница, усталость, головные боли и тошнота.

Длительное непрерывное использование сосудосуживающих препаратов может привести к тахифилаксии, атрофии слизистой оболочки полости носа и возвратному отёку слизистой носа.

#### **Применение с осторожностью**

У пациентов, принимающих ингибиторы моноаминоксидазы и другие препараты, способствующие повышению артериального давления в период до 10 дней после их применения; при повышенном внутриглазном давлении, выраженном атеросклерозе, тахикардии, феохромоцитоме, в период беременности и лактации, при тяжелых формах сердечно-сосудистых заболеваний; при тиреотоксикозе и сахарном диабете.

#### **Применение при беременности и лактации**

При применении в период беременности или грудного вскармливания не следует превышать рекомендуемую дозировку. Препарат должен применяться только после тщательной оценки соотношения риска и пользы для матери и плода.

**Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению. Имеются противопоказания.**

**Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.**