

Сокращённая инструкция по медицинскому применению препарата

Наименование лекарственного средства: Називин® Сенситив.

Регистрационный номер: ЛП-001156 от 11.11.2011.

Активное действующее вещество: оксиметазолина гидрохлорид.

Лекарственная форма: капли назальные.

Показания

Острые респираторные заболевания с явлениями ринита; острый аллергический ринит; обострение вазомоторного ринита; для облегчения оттока отделяемого из придаточных пазух носа при синуситах, евстахиите, среднем отите; для устранения отёка перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.

Способ применения и дозы

Називин® Сенситив капли назальные 0,01 % предназначены для применения в нос детям в возрасте до года. Детям в возрасте до 4 недель назначают по 1 капле Називин® Сенситив в каждую ноздрю 2–3 раза в день. С 5-й недели жизни и до 1 года – по 1–2 капли в каждую ноздрю 2–3 раза в день. 1 капля Називин® Сенситив 0,01 % содержит 2,8 мкг оксиметазолина гидрохлорида. Перед применением флакон следует перевернуть. Препарат следует закапывать, запрокинув голову ребёнка. Доказана эффективность также и следующей процедуры: в зависимости от возраста, 1–2 капли Називин® Сенситив наносят на вату и протирают каждую ноздрю. В рекомендованной дозе без консультации с врачом применять не более 5–7 дней. Если симптомы усиливаются или улучшение не наступает в течение 3 дней, необходимо проконсультироваться с врачом. Дозы выше рекомендованных можно применять только под наблюдением врача.

Противопоказания

Атрофический ринит; закрытоугольная глаукома; гиперчувствительность к компонентам препарата.

Побочное действие

Жжение или сухость слизистой оболочки полости носа, чихание, сильное чувство «заложенности» носа, повышение артериального давления, тахикардия, головная боль, бессонница. *Побочные эффекты, обусловленные системным действием препарата:* головокружение, ощущение сердцебиения, чувство тревоги, раздражительность, нарушение сна, тошнота, экзантема, нарушение зрения (при попадании в глаза). Длительное или непрерывное использование сосудосуживающих препаратов может привести к тахифилаксии, атрофии слизистой оболочки полости носа и возвратному отёку слизистой оболочки полости носа.

С осторожностью

При повышенном внутриглазном давлении, хронической сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, стенокардии; аритмии, хронической почечной недостаточности, у пациентов с гиперплазией предстательной железы с клиническими симптомами, выраженном атеросклерозе, при гипертиреозе, сахарном диабете, феохромоцитоме, а также у пациентов, принимающих ингибиторы моноаминоксидазы в течение предшествующих 2 недель и в течение 2 недель после их отмены, трициклические антидепрессанты, бромокриптин.

Применение при беременности и лактации

При применении в период беременности или грудного вскармливания не следует превышать рекомендуемую дозу. Препарат может применяться только в тех случаях, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребёнка.

Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.

Наименование лекарственного средства: Називин® Сенситив 11,25 мкг/доза и 22,5 мкг/доза.

Регистрационный номер: ЛП-000511 от 01.03.2011.

Активное действующее вещество: оксиметазолина гидрохлорид.

Лекарственная форма: спрей назальный дозированный.

Показания

Простудные заболевания или вирусные инфекции верхних дыхательных путей, сопровождающиеся насморком; синусит; евстахиит; средний отит; ринит любой этиологии; для устранения отёка перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.

Способ применения и дозы

Називин® Сенситив спрей назальный дозированный 11,25 мкг/доза и 22,5 мкг/доза предназначен для интраназального введения.

Детям в возрасте от 1 года до 6 лет: по 1 впрыскиванию Називин® Сенситив спрея назального дозированного 11,25 мкг/дозу в каждую ноздрю 2–3 раза в сутки. Препарат применяется 5–7 дней. Препарат можно назначать повторно только спустя несколько дней.

Взрослым и детям старше 6 лет: по 1 впрыскиванию Називин® Сенситив спрея назального дозированного 22,5 мкг/дозу в каждую ноздрю 2–3 раза в сутки. Если симптомы усиливаются или улучшение не наступает в течение 3 дней, необходимо проконсультироваться с врачом. В рекомендованной дозе без консультации с врачом применять не более 7 дней. Дозы, выше рекомендованных следует применять только по назначению врача.

Противопоказания

Атрофический ринит; закрытоугольная глаукома; гиперчувствительность к компонентам препарата; хирургические вмешательства на твердой мозговой оболочке. Для Називин® Сенситив спрей назальный дозированный 11,25 мкг/доза – детский возраст до 1 года; для Називин® Сенситив спрей назальный дозированный 22,5 мкг/доза – детский возраст до 6 лет.

Побочное действие

Нечасто: жжение или сухость слизистой оболочки полости носа, чихание, носовое кровотечение, отек Квинке, зуд.

В редких случаях: после того, как пройдет эффект от применения Називин® Сенситив, чувство «заложенности» носа.

Редко: повышение артериального давления, головная боль, головокружение, ощущение сердцебиения, тахикардия, чувство тревоги, раздражительность, нарушение сна, тошнота, бессонница, экзантема, нарушение зрения (при попадании в глаза).

Длительное непрерывное использование сосудосуживающих препаратов может привести к тахифилаксии, атрофии слизистой оболочки полости носа и возвратному отёку слизистой оболочки полости носа.

Применение с осторожностью

При повышенном внутриглазном давлении, хронической сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, стенокардии, аритмии, хронической почечной недостаточности, у пациентов с гиперплазией предстательной железы с клиническими симптомами, выраженном атеросклерозе, при гипертиреозе, сахарном диабете, феохромоцитоме, тахикардии, терапии МАО и трициклическими антидепрессантами, а также другими препаратами, повышающими артериальное давление, порфирии.

Применение при беременности и лактации

При применении в период беременности или грудного вскармливания не следует превышать рекомендуемую дозу. Препарат может применяться только в тех случаях, если потенциальная польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребёнка.

Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению. Имеются противопоказания.

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.