

Сокращённая инструкция по медицинскому применению препарата

Торговое название препарата: Кальций-Д₃ Никомед Форте.

Группировочное название: Кальция карбонат + Колекальциферол.

Лекарственная форма: таблетки жевательные (лимонные).

Показания к применению

Профилактика и лечение дефицита кальция и/или витамина D₃; профилактика и комплексная терапия остеопороза и его осложнений (переломы костей).

Противопоказания

Гиперкальциемия, гиперкальциурия, нефролитиаз, гипервитаминоз D, повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к сое или арахису, тяжелая почечная недостаточность, активный туберкулез, саркоидоз. Препарат в лекарственной форме таблетки не применяется у детей в возрасте до 3-х лет. Содержит аспартам, который в организме трансформируется в фенилаланин. Поэтому препарат не должны принимать пациенты с фенилкетонурией. Препарат содержит сорбитол, изомальт и сахарозу, поэтому его применение не рекомендовано пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией или сахарозно-изомальтазной недостаточностью.

Способ применения и дозы

Кальций-Д₃ Никомед Форте принимают внутрь. Таблетки можно разжевывать или рассасывать и принимать во время еды.

Взрослым: для профилактики остеопороза – по 1 таблетке 2 раза в день, или 2 таблетки один раз в день; в комплексной терапии остеопороза – по 1 таблетке 2–3 раза в день.

Для восполнения дефицита кальция и витамина D: взрослым и детям старше 12 лет – по 2 таблетки в день; детям с 3 до 12 лет – по 1 таблетке в день или по назначению врача.

При применении для профилактики и в комплексной терапии остеопороза длительность лечения определяется врачом индивидуально.

При применении для восполнения дефицита кальция и витамина D₃ средняя продолжительность курса лечения не менее 4–6 недель. Количество повторных курсов в течение года определяют индивидуально.

Побочное действие

Нечастые: гиперкальциемия, гиперкальциурия.

Редко: запор, метеоризм, тошнота, боль в животе, диарея, диспепсия.

Очень редко: зуд, сыпь, крапивница.

С осторожностью

Беременность, период лактации, почечная недостаточность.

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.