

100 SOAL BTCLS

Latihan Teori & Kasus • Bagian 1: Soal • Bagian 2: Kunci Jawaban & Pembahasan

Basis materi: Modul BTCLS Pro Emergency yang Anda upload. Soal disusun sebagai bahan belajar/latihan, bukan sebagai kisi-kisi resmi atau jaminan bentuk soal ujian.

Petunjuk: Pilih satu jawaban yang paling tepat (A-E). Untuk simulasi, kerjakan Bagian 1 terlebih dahulu sebelum membuka Bagian 2.

BAGIAN 1 — 100 SOAL BTCLS

Kerjakan tanpa melihat kunci jawaban.

A. BLS & CARDIAC ARREST

1. Seorang pasien ditemukan tidak responsif. Setelah memastikan keamanan penolong, tindakan berikutnya yang paling tepat adalah...

- A. Memasang infus
- B. Memeriksa tekanan darah
- C. Menilai respons pasien dan mengaktifkan bantuan sesuai sistem kegawatdaruratan
- D. Memberikan oksigen 15 L/menit
- E. Melakukan pemeriksaan pupil

2. Pada pasien dewasa yang tidak responsif dan dicurigai mengalami henti jantung, penilaian nadi dilakukan pada...

- A. Radialis
- B. Brachialis
- C. Femoral
- D. Karotis
- E. Dorsalis pedis

3. Dalam pelaksanaan RJP, salah satu prinsip utama adalah...

- A. Memaksimalkan jeda kompresi
- B. Memberikan kompresi dengan recoil dada yang baik
- C. Menghentikan kompresi setiap kali memberikan ventilasi selama mungkin
- D. Mengutamakan pemasangan infus sebelum kompresi
- E. Menunggu hasil EKG sebelum memulai RJP

4. Pada RJP dua penolong dewasa, rasio kompresi dan ventilasi yang digunakan dalam skenario dasar adalah...

- A. 5:1
- B. 10:1
- C. 15:2
- D. 30:2
- E. 50:2

5. Pasien tidak sadar, tidak bernapas normal dan tidak terdapat nadi. Tindakan paling tepat adalah...

- A. Observasi
- B. Memberikan cairan IV
- C. Memulai RJP
- D. Melakukan pemeriksaan CT scan
- E. Memberikan analgesik

6. Saat menggunakan AED, setelah alat menganalisis irama, penolong harus...

- A. Memegang pasien selama analisis
- B. Memastikan tidak ada yang menyentuh pasien
- C. Memberikan kompresi saat shock diberikan
- D. Melepaskan pad
- E. Memberikan ventilasi selama shock

7. Tujuan utama penggunaan AED pada pasien henti jantung adalah...

- A. Mengukur tekanan darah
- B. Mengukur saturasi oksigen
- C. Menganalisis irama dan memberikan defibrilasi bila diindikasikan
- D. Memberikan ventilasi
- E. Mengukur GCS

8. Dalam algoritme cardiac arrest, evaluasi irama dilakukan secara berkala. Menurut modul, interval evaluasi irama adalah...

- A. Setiap 30 detik
- B. Setiap 1 menit
- C. Setiap 2 menit
- D. Setiap 5 menit
- E. Setiap 10 menit

9. Saat melakukan evaluasi irama pada cardiac arrest, penghentian RJP untuk analisis sebaiknya...

- A. Selama 30–60 detik
- B. Selama 20–30 detik
- C. Tidak lebih dari sekitar 10 detik
- D. Selama 2 menit
- E. Sampai dokter datang

10. Irama berikut yang termasuk shockable rhythm adalah...

- A. Asystole
- B. PEA
- C. VF
- D. Sinus bradikardia
- E. Sinus takikardia

11. Irama berikut yang termasuk shockable rhythm adalah...

- A. Pulseless VT
- B. PEA
- C. Asystole
- D. Sinus rhythm

E. AF dengan nadi

12. Pasien menunjukkan irama terorganisasi pada monitor tetapi nadi tidak teraba. Kondisi ini paling sesuai dengan...

- A. VF
- B. Pulseless VT
- C. PEA
- D. ROSC
- E. Sinus rhythm

13. Pada PEA, tindakan utama adalah...

- A. Defibrilasi segera
- B. RJP berkualitas tinggi dan mencari penyebab reversibel
- C. Menunggu irama berubah spontan
- D. Kardioversi sinkron
- E. Menghentikan RJP

14. Pasien mengalami asistol. Langkah penting sebelum memastikan asistol adalah...

- A. Langsung melakukan defibrilasi
- B. Memastikan elektroda dan lead serta memastikan bukan fine VF
- C. Memberikan kardioversi
- D. Memberikan adenosin
- E. Memberikan amiodaron sebagai tindakan pertama

15. Pada asistol, terapi utama dalam algoritme cardiac arrest adalah...

- A. Defibrilasi
- B. Kardioversi sinkron
- C. RJP dan epinefrin sesuai algoritme
- D. Adenosin
- E. Digoksin

B. EKG & MEGACODE

16. Praktikum ECG Interpretation terutama bertujuan agar peserta mampu...

- A. Membaca hasil laboratorium
- B. Membaca EKG strip dan irama monitor
- C. Melakukan CT scan
- D. Melakukan echocardiography
- E. Melakukan kateterisasi jantung

17. Hal yang paling penting dalam menilai VT pada pasien henti jantung adalah...

- A. Warna kulit saja
- B. Ada atau tidaknya nadi

- C. Suhu tubuh
- D. GCS saja
- E. Frekuensi napas saja

18. VF pada monitor menunjukkan...

- A. Aktivitas listrik yang kacau tanpa kontraksi efektif
- B. Irama sinus normal
- C. Aktivitas listrik terorganisasi dengan nadi kuat
- D. Bradikardia sinus
- E. PEA

19. Dalam megacode, seorang anggota tim menerima instruksi dari team leader. Tindakan yang menunjukkan closed-loop communication adalah...

- A. Diam dan langsung pergi
- B. Mengulangi instruksi secara lisan
- C. Mengabaikan instruksi
- D. Menunggu instruksi berikutnya
- E. Menyerahkan tugas kepada orang lain tanpa komunikasi

20. Setelah menyelesaikan tugas dalam megacode, anggota tim sebaiknya...

- A. Meninggalkan ruangan
- B. Tidak perlu melapor
- C. Memberitahu team leader bahwa tugas telah selesai
- D. Mengganti tugas sendiri
- E. Menghentikan RJP

C. AIRWAY & BREATHING

21. Prioritas utama pada pasien trauma dengan masalah jalan napas adalah...

- A. Pemeriksaan laboratorium
- B. Memastikan airway terbuka
- C. Pemeriksaan radiologi
- D. Pemasangan kateter urin
- E. Pemeriksaan abdomen

22. Dalam BTCLS, airway management mencakup...

- A. Hanya intubasi
- B. Hanya suction
- C. Penanganan airway tanpa alat, alat sederhana hingga definitif
- D. Hanya pemberian oksigen
- E. Hanya pemasangan NGT

23. Pasien trauma mengalami sumbatan jalan napas total dan tidak mampu bernapas. Prioritas tindakan adalah...

- A. Mengatasi obstruksi jalan napas
- B. Mengukur suhu
- C. Pemeriksaan abdomen
- D. Mengukur urin output
- E. Melakukan secondary survey terlebih dahulu

24. Dalam penilaian breathing pada pasien trauma, pemeriksaan dada dapat mencakup...

- A. Inspeksi dan auskultasi saja
- B. Inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi
- C. Palpasi abdomen saja
- D. Pemeriksaan GCS saja
- E. Pemeriksaan pupil saja

25. Distensi vena jugularis pada trauma dada dapat mengarah pada kecurigaan...

- A. Gastritis
- B. Tension pneumothorax atau tamponade jantung
- C. Fraktur femur
- D. Hipoglikemia
- E. Stroke

26. Bunyi jantung yang jauh disertai nadi lemah pada pasien trauma dada dapat mengarah pada...

- A. Pneumonia
- B. Cardiac tamponade
- C. Fraktur pelvis
- D. Hipotermia
- E. Hiperglikemia

27. Pada trauma dada, inspeksi dilakukan untuk mencari antara lain...

- A. Open pneumothorax dan flail chest
- B. Fraktur radius saja
- C. Hipoglikemia
- D. Hematuria
- E. Meningismus

28. Tujuan pemberian oksigen pada pasien dengan gangguan breathing adalah...

- A. Menurunkan GCS
- B. Memperbaiki oksigenasi sesuai kondisi klinis
- C. Menghentikan perdarahan
- D. Mengobati fraktur
- E. Mengurangi edema tungkai

D. INITIAL ASSESSMENT

29. Urutan primary survey yang digunakan dalam modul adalah...

- A. ABCDE
- B. BACDE
- C. CABED
- D. DCBAE
- E. EDCBA

30. Tujuan primary survey adalah...

- A. Menentukan diagnosis definitif
- B. Menemukan dan menangani masalah yang mengancam nyawa
- C. Menyelesaikan seluruh pemeriksaan laboratorium
- D. Menentukan diagnosis penyakit kronis
- E. Menentukan terapi rawat jalan

31. Pada primary survey, setelah masalah ditemukan...

- A. Selalu tunggu secondary survey
- B. Tangani masalah sesuai prioritas
- C. Abaikan jika pasien masih sadar
- D. Tunggu hasil radiologi
- E. Pulangkan pasien

32. Pada bagian Disability, pemeriksaan yang penting adalah...

- A. GCS dan pupil
- B. Lingkar perut
- C. Suhu kulit saja
- D. Berat badan
- E. Tinggi badan

33. GCS terdiri dari...

- A. Eye, Verbal, Motor
- B. Eye, Voice, Pulse
- C. Glasgow, Voice, Motor
- D. Eye, Reflex, Motor
- E. Verbal, Pulse, Motor

34. Pada bagian Exposure, prinsip yang benar adalah...

- A. Membiarkan pasien terbuka tanpa perlindungan
- B. Membuka pakaian untuk mencari cedera dan mencegah hipotermia
- C. Tidak perlu memeriksa bagian tubuh lain
- D. Hanya memeriksa wajah
- E. Hanya memeriksa ekstremitas

35. Dalam primary survey pasien trauma, reevaluasi dilakukan...

- A. Hanya setelah pasien pulang
- B. Setiap tahapan intervensi
- C. Sekali saja
- D. Hanya setelah CT scan
- E. Hanya jika pasien meminta

36. Secondary survey bertujuan terutama untuk...

- A. Menilai masalah potensial yang belum ditemukan pada primary survey
- B. Menggantikan primary survey
- C. Menghentikan RJP
- D. Mengganti pemeriksaan airway
- E. Menentukan administrasi pasien

E. SHOCK

37. Salah satu tanda syok adalah...

- A. Akral hangat dan perfusi sangat baik
- B. Akral dingin
- C. Nadi selalu lambat
- D. Kesadaran selalu normal
- E. Kulit selalu merah

38. Tanda lain yang dapat ditemukan pada syok adalah...

- A. Nadi lemah
- B. Nafsu makan meningkat
- C. Penglihatan semakin tajam
- D. Suhu selalu meningkat
- E. Kesadaran selalu meningkat

39. Pada pasien trauma dengan perdarahan hebat, prioritas utama adalah...

- A. Mengontrol perdarahan dan menangani gangguan sirkulasi
- B. Pemeriksaan kulit
- C. Memberikan makanan
- D. Pemeriksaan mata
- E. Menunggu hasil laboratorium

40. Dalam modul, pemasangan akses IV pada pasien syok trauma dapat menggunakan...

- A. Dua jalur IV berukuran besar sesuai kondisi vena
- B. Satu jalur kecil saja
- C. Tidak perlu akses IV
- D. Hanya akses intraarterial

E. Hanya akses subkutan

41. Salah satu pemantauan penting pada pasien trauma adalah...

- A. Urine output
- B. Warna rambut
- C. Lingkar kepala
- D. Berat badan harian
- E. Tinggi badan

42. Menurut modul, urine output normal pada dewasa yang dicantumkan dalam konteks monitoring adalah sekitar...

- A. 0,1 cc/kgBB/jam
- B. 0,2 cc/kgBB/jam
- C. 0,5 cc/kgBB/jam
- D. 2 cc/kgBB/jam
- E. 5 cc/kgBB/jam

F. STOP BLEEDING

43. Tujuan utama stop bleeding adalah...

- A. Mengurangi nyeri saja
- B. Mengendalikan perdarahan dan menjaga sirkulasi
- C. Menurunkan suhu
- D. Meningkatkan nafsu makan
- E. Mengobati infeksi

44. Pada luka dengan perdarahan aktif, tindakan awal yang tepat adalah...

- A. Membiarkan darah keluar
- B. Melakukan kontrol perdarahan secara cepat dan tepat
- C. Menutup mata pasien
- D. Melakukan pemeriksaan CT terlebih dahulu
- E. Memberikan makanan

45. Stop bleeding, splinting and bandaging dalam modul merupakan...

- A. Materi teori saja
- B. Salah satu materi praktik
- C. Materi administrasi
- D. Materi farmakologi saja
- E. Materi radiologi

46. Pada amputasi traumatik, salah satu prioritas adalah...

- A. Membiarkan perdarahan
- B. Mengendalikan perdarahan dan melakukan pembalutan yang sesuai

- C. Langsung melakukan latihan gerak
- D. Mengabaikan bagian amputasi
- E. Memberikan makanan

G. MUSCULOSKELETAL & SPLINTING

47. Tujuan utama splinting pada fraktur adalah...

- A. Menambah gerakan tulang
- B. Mengurangi pergerakan dan membantu stabilisasi
- C. Menghilangkan kebutuhan pemeriksaan
- D. Menambah perdarahan
- E. Memperburuk deformitas

48. Pada ekstremitas yang mengalami fraktur, pemeriksaan penting sebelum dan sesudah splint adalah...

- A. Status neurovaskular
- B. Status rambut
- C. Lingkar pinggang
- D. Berat badan
- E. Tinggi badan

49. Trauma muskuloskeletal dalam modul mencakup...

- A. Fraktur, luka robek dan amputasi
- B. Hipertensi saja
- C. Diabetes saja
- D. Pneumonia saja
- E. Stroke saja

50. Pada fraktur terbuka, salah satu masalah penting yang harus diperhatikan adalah...

- A. Perdarahan dan kontaminasi luka
- B. Nafsu makan
- C. Gangguan penglihatan
- D. Hiperkolesterolemia
- E. Nyeri kepala kronis

H. HEAD & SPINAL TRAUMA

51. Pada trauma kepala, salah satu parameter neurologis penting adalah...

- A. GCS
- B. Berat badan
- C. Lingkar pinggang
- D. Suhu ruangan
- E. Tinggi badan

52. Perubahan ukuran dan kesimetrisan pupil merupakan bagian dari evaluasi...

- A. Neurologis
- B. Abdomen
- C. Musculoskeletal
- D. Respirasi saja
- E. Sirkulasi perifer saja

53. Pasien trauma dicurigai mengalami cedera cervical spine. Prinsip penting adalah...

- A. Memaksa leher ke posisi hiperfleksi
- B. Memaksa leher ke posisi hiperekstensi
- C. Menghindari gerakan leher yang tidak perlu
- D. Memutar leher untuk mencari nyeri
- E. Mengabaikan posisi kepala

54. Imobilisasi spinal harus memperhatikan...

- A. Kepala, leher, torso dan pelvis
- B. Tangan saja
- C. Kaki saja
- D. Kepala saja
- E. Leher saja

55. Tujuan utama spinal stabilization adalah...

- A. Membuat pasien nyaman saja
- B. Mencegah pergerakan yang dapat menyebabkan cedera sekunder
- C. Mempercepat pasien berjalan
- D. Mengurangi kebutuhan monitoring
- E. Mengurangi suhu tubuh

56. Pada pasien trauma dengan paraparesis atau tetraparesis, kondisi tersebut dapat menjadi petunjuk awal adanya...

- A. Instabilitas servikal
- B. Hipertensi
- C. Gastritis
- D. Hipoglikemia
- E. Pneumonia

I. THORACIC TRAUMA

57. Trauma dada dapat berupa...

- A. Tumpul dan tembus
- B. Hanya tembus
- C. Hanya tumpul
- D. Hanya thermal

E. Hanya kimia

58. Pada tension pneumothorax, masalah utama berkaitan dengan...

- A. Gangguan ventilasi dan sirkulasi akibat tekanan intratorakal
- B. Fraktur tangan
- C. Gangguan ginjal
- D. Hipoglikemia
- E. Infeksi kulit

59. Open pneumothorax merupakan...

- A. Cedera dada yang menyebabkan komunikasi antara rongga pleura dan lingkungan luar
- B. Fraktur kepala
- C. Cedera abdomen
- D. Cedera pelvis
- E. Luka bakar

60. Flail chest berkaitan dengan...

- A. Cedera dinding dada dengan instabilitas segmen dada
- B. Fraktur tengkorak
- C. Cedera abdomen
- D. Luka bakar
- E. Cedera mata

J. ABDOMINAL & PELVIC TRAUMA

61. Trauma abdomen dapat berupa...

- A. Tumpul dan tembus
- B. Hanya tumpul
- C. Hanya thermal
- D. Hanya kimia
- E. Hanya listrik

62. Pasien trauma dengan hipotensi yang tidak jelas penyebabnya harus dicurigai mengalami...

- A. Perdarahan internal
- B. Gastritis ringan
- C. Flu biasa
- D. Dermatitis
- E. Rhinitis

63. Salah satu tanda yang dapat mengarah pada fraktur pelvis adalah...

- A. Ekimosis pada daerah pelvis/perineum
- B. Batuk

- C. Nyeri tenggorokan
- D. Sakit kepala ringan
- E. Hidung tersumbat

64. Pada trauma abdomen dan pelvis, pemeriksaan harus mempertimbangkan...

- A. Cedera internal dan perdarahan
- B. Hanya luka kulit
- C. Hanya nyeri
- D. Hanya suhu
- E. Hanya tekanan darah

K. BURN / THERMAL TRAUMA

65. Penilaian luka bakar mencakup...

- A. Luas dan kedalaman
- B. Warna rambut
- C. Tinggi badan
- D. Berat badan saja
- E. Lingkar kepala

66. Dalam penanganan trauma thermal, salah satu prioritas adalah...

- A. Airway
- B. Diet
- C. Latihan fisik
- D. Pemeriksaan mata
- E. Pemeriksaan pendengaran

67. Luas luka bakar biasanya dinilai sebagai...

- A. Persentase luas permukaan tubuh
- B. Berat badan
- C. Tekanan darah
- D. GCS
- E. Frekuensi nadi saja

68. Modul BTCLS membahas penggunaan rumus...

- A. Parkland/Baxter
- B. Apgar
- C. Glasgow
- D. Wells
- E. Child-Pugh

69. Salah satu prinsip penting pada pasien luka bakar adalah...

- A. Mencegah hipotermia

- B. Membiarkan pasien hipotermia
- C. Tidak perlu monitoring
- D. Mengabaikan airway
- E. Tidak perlu resusitasi

70. Trauma thermal dapat disebabkan oleh...

- A. Suhu ekstrem dan bahan kimia
- B. Hanya trauma tumpul
- C. Hanya fraktur
- D. Hanya infeksi
- E. Hanya hipertensi

L. BIOMECHANICAL TRAUMA

71. Biomekanik trauma digunakan untuk...

- A. Memprediksi kemungkinan cedera berdasarkan mekanisme kejadian
- B. Mengukur kadar gula
- C. Mengukur berat badan
- D. Menentukan golongan darah
- E. Menentukan status imunisasi

72. Contoh informasi penting dalam biomekanik trauma adalah...

- A. Kecepatan kendaraan dan ketinggian jatuh
- B. Makanan terakhir
- C. Warna pakaian
- D. Hobi pasien
- E. Riwayat pendidikan

73. Klasifikasi mekanisme trauma yang dibahas meliputi...

- A. Tumpul, tembus, thermal dan blast
- B. Infeksi, alergi dan autoimun
- C. Metabolik dan endokrin
- D. Neurologis saja
- E. Kardiologis saja

74. Mengapa mekanisme trauma penting?

- A. Membantu memperkirakan cedera yang mungkin terjadi
- B. Hanya untuk dokumentasi
- C. Tidak memiliki manfaat
- D. Hanya untuk menentukan biaya
- E. Hanya untuk administrasi

M. TRIAGE

75. Tujuan utama triage pada mass casualty adalah...

- A. Menangani pasien berdasarkan siapa yang datang pertama
- B. Menentukan prioritas berdasarkan kegawatan dan sumber daya
- C. Menunggu semua pasien terkumpul
- D. Mengutamakan pasien yang paling banyak berbicara
- E. Mengutamakan pasien yang paling muda

76. Dalam kondisi bencana dengan banyak korban, petugas harus...

- A. Menghabiskan seluruh sumber daya pada satu pasien
- B. Memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat kegawatan dan kemungkinan manfaat tindakan
- C. Mengabaikan pasien ringan
- D. Tidak melakukan triage
- E. Menunggu rumah sakit

77. Triage merupakan bagian penting dari...

- A. Sistem penanggulangan kegawatdaruratan
- B. Administrasi keuangan
- C. Pelayanan rawat jalan rutin
- D. Program imunisasi
- E. Pemeriksaan laboratorium

N. LIFTING, MOVING & EXTRICATION

78. Tujuan ekstrikasi pasien trauma adalah...

- A. Mengeluarkan pasien dari situasi berbahaya dengan memperhatikan cedera
- B. Membuat pasien berjalan
- C. Mengurangi kebutuhan stabilisasi
- D. Mempercepat pemeriksaan laboratorium
- E. Menghentikan monitoring

79. Sebelum transportasi pasien trauma, hal penting adalah...

- A. Stabilisasi sesuai kondisi
- B. Melepaskan semua imobilisasi
- C. Membiarkan pasien bergerak bebas
- D. Menghentikan oksigen
- E. Menghentikan monitoring

80. Pada pasien yang dicurigai mengalami cedera servikal, stabilisasi terutama bertujuan...

- A. Mencegah gerakan yang memperburuk cedera
- B. Membuat pasien mengantuk
- C. Meningkatkan perdarahan
- D. Mengurangi GCS

E. Meningkatkan nyeri

O. SPECIAL POPULATION

81. Special population dalam modul mencakup pasien...

- A. Hamil, pediatrik dan lanjut usia
- B. Hanya dewasa
- C. Hanya lansia
- D. Hanya anak
- E. Hanya ibu hamil

82. Pada populasi khusus, pendekatan trauma tetap berlandaskan...

- A. Initial Assessment
- B. Pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu
- C. CT scan terlebih dahulu
- D. Diagnosis definitif terlebih dahulu
- E. Rawat jalan

P. TEAM DYNAMIC

83. Dalam team dynamic, komunikasi yang baik harus...

- A. Panjang dan rumit
- B. Ringkas dan jelas
- C. Menggunakan istilah yang tidak dipahami tim
- D. Dilakukan dengan berteriak
- E. Tidak perlu dikonfirmasi

84. Closed-loop communication berarti...

- A. Instruksi diberikan tanpa konfirmasi
- B. Anggota tim mengulang instruksi untuk memastikan pemahaman
- C. Semua anggota berbicara bersamaan
- D. Team leader bekerja sendiri
- E. Tidak perlu laporan

85. Setelah resusitasi selesai, debriefing berguna untuk...

- A. Menyalahkan anggota tim
- B. Mengevaluasi proses dan mengidentifikasi hal yang dapat diperbaiki
- C. Menghentikan pelatihan
- D. Menghindari diskusi
- E. Menghapus dokumentasi

Q. SOAL KASUS TERINTEGRASI

86. Seorang korban kecelakaan motor ditemukan tidak responsif. Tidak bernapas normal dan nadi karotis tidak teraba. Tindakan paling tepat adalah...

- A. Secondary survey
- B. RJP
- C. CT scan
- D. Pemeriksaan abdomen
- E. Pemasangan kateter urin

87. Pasien trauma mengalami perdarahan ekstremitas aktif dan tanda syok. Prioritas Anda adalah...

- A. Pemeriksaan radiologi
- B. Kontrol perdarahan dan resusitasi sesuai prioritas
- C. Menanyakan riwayat penyakit dahulu secara lengkap
- D. Memberikan makanan
- E. Menunggu hasil laboratorium

88. Pasien trauma dada mengalami sesak berat, suara napas menurun unilateral dan kondisi hemodinamik memburuk. Diagnosis yang harus sangat dicurigai adalah...

- A. Tension pneumothorax
- B. Gastritis
- C. Fraktur tangan
- D. Hipoglikemia
- E. Stroke

89. Pasien kecelakaan memiliki GCS menurun dan pupil tidak simetris. Prioritas evaluasi adalah...

- A. Neurologis sambil tetap memastikan ABC
- B. Pemeriksaan kulit
- C. Pemeriksaan nutrisi
- D. Pemeriksaan mata rutin
- E. Pemeriksaan ortopedi saja

90. Pasien jatuh dari ketinggian dan mengalami nyeri leher serta kelemahan keempat ekstremitas. Tindakan paling tepat adalah...

- A. Meminta pasien memutar leher
- B. Mempertahankan stabilisasi spinal dan menghindari pergerakan yang tidak perlu
- C. Meminta pasien berdiri
- D. Melakukan latihan ROM
- E. Memijat leher

91. Pada megacode, monitor menunjukkan VF. Nadi tidak teraba. Tindakan utama adalah...

- A. Defibrilasi sesuai algoritme dan lanjutkan RJP
- B. Memberikan adenosin
- C. Menghentikan semua tindakan
- D. Memberikan cairan oral

E. Melakukan kardioversi elektif

92. Pada megacode, monitor menunjukkan PEA dan nadi tidak teraba. Tindakan yang tepat adalah...

- A. Defibrilasi
- B. RJP dan mencari penyebab reversibel
- C. Kardioversi
- D. Menghentikan RJP
- E. Observasi

93. Pasien luka bakar luas datang dengan tanda gangguan jalan napas. Prioritas adalah...

- A. Menghitung luas luka bakar terlebih dahulu
- B. Menilai dan mengelola airway
- C. Mengukur berat badan
- D. Memberikan makanan
- E. Mengobati luka kulit dahulu

94. Pasien trauma mengalami penurunan kesadaran. Dalam primary survey, setelah airway dan breathing dinilai, berikutnya adalah...

- A. Circulation
- B. CT scan
- C. Secondary survey
- D. Riwayat lengkap
- E. X-ray

95. Pasien trauma setelah dilakukan tindakan menunjukkan kondisi memburuk. Prinsip BTCLS yang harus diterapkan adalah...

- A. Menunggu sampai pemeriksaan selesai
- B. Melakukan reevaluasi ABCD dan intervensi kembali sesuai temuan
- C. Menghentikan monitoring
- D. Memulangkan pasien
- E. Mengabaikan perubahan

96. Pasien dengan fraktur ekstremitas telah dipasang bidai. Hal yang penting dilakukan setelah pembidaian adalah...

- A. Mengevaluasi kembali status neurovaskular
- B. Membuka bidai segera
- C. Memijat ekstremitas
- D. Meminta pasien berjalan
- E. Mengabaikan ekstremitas

97. Dalam skenario kecelakaan mobil dengan deformitas kendaraan berat, informasi tersebut terutama berguna untuk...

- A. Biomekanik trauma dan prediksi cedera

- B. Menentukan kadar gula
- C. Menentukan diet
- D. Menentukan status imunisasi
- E. Menentukan diagnosis infeksi

98. Dalam sebuah megacode, team leader memberikan instruksi: 'Pasang monitor.' Anggota menjawab, 'Siap, saya pasang monitor.' Hal tersebut merupakan contoh...

- A. Closed-loop communication
- B. Triage
- C. Secondary survey
- D. Debridement
- E. Exposure

99. Setelah monitor terpasang dalam skenario cardiac arrest, team leader meminta evaluasi irama. RJP dihentikan sementara untuk analisis dan segera dilanjutkan. Prinsip yang benar adalah...

- A. Analisis irama dilakukan selama mungkin
- B. Jeda RJP harus diminimalkan
- C. RJP dihentikan sampai diagnosis pasti
- D. Kompresi tidak diperlukan
- E. Evaluasi cukup setiap 30 menit

100. Seorang pasien trauma datang dengan perdarahan aktif, sesak, dan penurunan kesadaran. Prinsip paling tepat dalam BTCLS adalah...

- A. Menentukan diagnosis definitif terlebih dahulu
- B. Melakukan tindakan berdasarkan prioritas masalah yang mengancam nyawa
- C. Melakukan secondary survey lengkap sebelum tindakan
- D. Menunggu pemeriksaan penunjang
- E. Menunggu dokter spesialis

BAGIAN 2 — KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN

Gunakan bagian ini setelah menyelesaikan Bagian 1.

A. BLS & CARDIAC ARREST

1. Jawaban: C

Pembahasan: Pastikan keselamatan penolong, nilai respons, lalu aktifkan bantuan sesuai sistem kegawatdaruratan.

2. Jawaban: D

Pembahasan: Pada dewasa tidak responsif dengan kecurigaan cardiac arrest, nadi dinilai pada karotis.

3. Jawaban: B

Pembahasan: RJP berkualitas membutuhkan kompresi efektif dan recoil dada yang baik.

4. Jawaban: D

Pembahasan: Rasio dasar kompresi dan ventilasi yang digunakan adalah 30:2.

5. Jawaban: C

Pembahasan: Tidak sadar, napas tidak normal/tidak bernapas, dan tidak ada nadi merupakan indikasi memulai RJP.

6. Jawaban: B

Pembahasan: Saat AED menganalisis atau memberikan shock, pasien tidak boleh disentuh.

7. Jawaban: C

Pembahasan: AED menganalisis irama dan memberikan defibrilasi bila ritmenya shockable.

8. Jawaban: C

Pembahasan: Modul mencantumkan evaluasi irama setiap 2 menit.

9. Jawaban: C

Pembahasan: Jeda untuk analisis irama harus diminimalkan, sekitar tidak lebih dari 10 detik.

10. Jawaban: C

Pembahasan: VF termasuk shockable rhythm.

11. Jawaban: A

Pembahasan: Pulseless VT termasuk shockable rhythm.

12. Jawaban: C

Pembahasan: Aktivitas listrik terorganisasi tanpa nadi sesuai dengan PEA.

13. Jawaban: B

Pembahasan: PEA merupakan non-shockable rhythm; lakukan RJP berkualitas tinggi dan cari penyebab reversibel.

14. Jawaban: B

Pembahasan: Pada asistol, pastikan elektroda/lead baik dan bukan fine VF.

15. Jawaban: C

Pembahasan: Asistol merupakan non-shockable rhythm; lanjutkan RJP dan epinefrin sesuai algoritme.

B. EKG & MEGACODE

16. Jawaban: B

Pembahasan: Praktikum ECG Interpretation mencakup kemampuan membaca ECG strip dan irama monitor.

17. Jawaban: B

Pembahasan: VT dibedakan menjadi pulseless atau dengan nadi karena tata laksananya berbeda.

18. Jawaban: A

Pembahasan: VF merupakan aktivitas listrik yang kacau dan tidak menghasilkan kontraksi efektif.

19. Jawaban: B

Pembahasan: Closed-loop communication mencakup pengulangan instruksi oleh penerima.

20. Jawaban: C

Pembahasan: Setelah tugas selesai, anggota tim melaporkannya kepada leader.

C. AIRWAY & BREATHING

21. Jawaban: B

Pembahasan: Airway merupakan prioritas awal dalam pendekatan ABCDE.

22. Jawaban: C

Pembahasan: Modul mencakup airway tanpa alat, alat sederhana, sampai definitive airway.

23. Jawaban: A

Pembahasan: Obstruksi total adalah ancaman langsung terhadap kehidupan dan harus segera ditangani.

24. Jawaban: B

Pembahasan: Pemeriksaan dada pada trauma mencakup inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

25. Jawaban: B

Pembahasan: Distensi vena jugularis dapat mengarah pada tension pneumothorax atau tamponade.

26. Jawaban: B

Pembahasan: Bunyi jantung jauh dan nadi lemah dapat mengarah pada cardiac tamponade.

27. Jawaban: A

Pembahasan: Inspeksi dada mencari antara lain open pneumothorax dan flail chest.

28. Jawaban: B

Pembahasan: Oksigen diberikan untuk memperbaiki oksigenasi sesuai kondisi klinis.

D. INITIAL ASSESSMENT

29. Jawaban: A

Pembahasan: Primary survey menggunakan pendekatan ABCDE.

30. Jawaban: B

Pembahasan: Primary survey bertujuan menemukan dan menangani masalah yang mengancam nyawa.

31. Jawaban: B

Pembahasan: Temuan yang mengancam nyawa ditangani sesuai prioritas, tidak ditunda sampai secondary survey.

32. Jawaban: A

Pembahasan: Disability mencakup evaluasi neurologis seperti GCS dan pupil.

33. Jawaban: A

Pembahasan: GCS terdiri dari Eye, Verbal, dan Motor.

34. Jawaban: B

Pembahasan: Exposure membantu mencari cedera sekaligus mencegah hipotermia.

35. Jawaban: B

Pembahasan: Modul menekankan reevaluasi pada setiap tahapan intervensi.

36. Jawaban: A

Pembahasan: Secondary survey mengevaluasi masalah lain yang belum ditemukan/ditangani pada primary survey.

E. SHOCK

37. Jawaban: B

Pembahasan: Akral dingin merupakan tanda perfusi perifer buruk yang dapat ditemukan pada syok.

38. Jawaban: A

Pembahasan: Nadi lemah merupakan salah satu tanda perfusi buruk pada syok.

39. Jawaban: A

Pembahasan: Perdarahan harus dikontrol dan sirkulasi ditangani segera.

40. Jawaban: A

Pembahasan: Modul mencantumkan dua jalur IV berukuran besar sesuai kondisi vena.

41. Jawaban: A

Pembahasan: Urine output merupakan parameter pemantauan perfusi.

42. Jawaban: C

Pembahasan: Modul mencantumkan sekitar 0,5 cc/kgBB/jam pada dewasa.

F. STOP BLEEDING

43. Jawaban: B

Pembahasan: Stop bleeding bertujuan mengendalikan perdarahan dan menjaga sirkulasi.

44. Jawaban: B

Pembahasan: Perdarahan aktif harus dikontrol secara cepat dan tepat.

45. Jawaban: B

Pembahasan: Stop Bleeding, Splinting and Bandaging tercantum sebagai materi praktik.

46. Jawaban: B

Pembahasan: Pada amputasi, kontrol perdarahan dan pembalutan merupakan prioritas.

G. MUSCULOSKELETAL & SPLINTING

47. Jawaban: B

Pembahasan: Splinting membatasi pergerakan dan membantu stabilisasi.

48. Jawaban: A

Pembahasan: Status neurovaskular dinilai sebelum dan sesudah splint.

49. Jawaban: A

Pembahasan: Materi musculoskeletal mencakup fraktur, luka robek, dan amputasi.

50. Jawaban: A

Pembahasan: Fraktur terbuka berisiko perdarahan dan kontaminasi luka.

H. HEAD & SPINAL TRAUMA

51. Jawaban: A

Pembahasan: GCS merupakan parameter penting dalam evaluasi trauma kepala.

52. Jawaban: A

Pembahasan: Pupil merupakan bagian dari evaluasi neurologis.

53. Jawaban: C

Pembahasan: Pada kecurigaan cedera servikal, hindari gerakan leher yang tidak perlu.

54. Jawaban: A

Pembahasan: Imobilisasi spinal memperhatikan kepala, leher, torso, dan pelvis.

55. Jawaban: B

Pembahasan: Stabilisasi bertujuan mencegah gerakan yang dapat menyebabkan cedera sekunder.

56. Jawaban: A

Pembahasan: Paraparesis/tetraparesis dapat menjadi petunjuk cedera/instabilitas servikal.

I. THORACIC TRAUMA

57. Jawaban: A

Pembahasan: Trauma dada dapat berupa tumpul maupun tembus.

58. Jawaban: A

Pembahasan: Tension pneumothorax dapat mengganggu ventilasi dan sirkulasi.

59. Jawaban: A

Pembahasan: Open pneumothorax adalah komunikasi rongga pleura dengan lingkungan luar.

60. Jawaban: A

Pembahasan: Flail chest merupakan cedera dinding dada dengan segmen yang tidak stabil.

J. ABDOMINAL & PELVIC TRAUMA

61. Jawaban: A

Pembahasan: Trauma abdomen dapat berupa tumpul maupun tembus.

62. Jawaban: A

Pembahasan: Hipotensi pada trauma tanpa penyebab jelas harus menimbulkan kecurigaan perdarahan internal.

63. Jawaban: A

Pembahasan: Ekimosis pelvis/perineum merupakan temuan yang perlu dicari pada trauma pelvis.

64. Jawaban: A

Pembahasan: Trauma abdomen/pelvis dapat menyebabkan cedera internal dan perdarahan.

K. BURN / THERMAL TRAUMA

65. Jawaban: A

Pembahasan: Penilaian luka bakar mencakup luas dan kedalaman.

66. Jawaban: A

Pembahasan: Airway merupakan prioritas penting pada trauma thermal.

67. Jawaban: A

Pembahasan: Luas luka bakar dinyatakan sebagai persentase luas permukaan tubuh.

68. Jawaban: A

Pembahasan: Modul mencantumkan rumus Baxter untuk resusitasi cairan luka bakar.

69. Jawaban: A

Pembahasan: Pencegahan hipotermia merupakan prinsip penting pada pasien luka bakar.

70. Jawaban: A

Pembahasan: Trauma thermal dapat berkaitan dengan suhu ekstrem dan bahan kimia.

L. BIOMECHANICAL TRAUMA

71. Jawaban: A

Pembahasan: Biomekanik membantu memperkirakan cedera berdasarkan mekanisme kejadian.

72. Jawaban: A

Pembahasan: Kecepatan kendaraan dan ketinggian jatuh merupakan informasi penting tentang energi trauma.

73. Jawaban: A

Pembahasan: Modul membahas trauma tumpul, tembus, thermal, dan blast.

74. Jawaban: A

Pembahasan: Mekanisme trauma membantu memperkirakan pola cedera.

M. TRIAGE

75. Jawaban: B

Pembahasan: Triage menentukan prioritas berdasarkan kegawatan dan sumber daya.

76. Jawaban: B

Pembahasan: Pada mass casualty, sumber daya diprioritaskan untuk memaksimalkan manfaat.

77. Jawaban: A

Pembahasan: Triage merupakan bagian dari sistem penanggulangan kegawatdaruratan.

N. LIFTING, MOVING & EXTRICATION

78. Jawaban: A

Pembahasan: Ekstrikasi mengeluarkan pasien dari situasi berbahaya dengan memperhatikan cedera.

79. Jawaban: A

Pembahasan: Pasien perlu distabilkan sesuai kondisi sebelum transportasi.

80. Jawaban: A

Pembahasan: Stabilisasi servikal mencegah gerakan yang dapat memperburuk cedera.

O. SPECIAL POPULATION

81. Jawaban: A

Pembahasan: Special population mencakup hamil, pediatrik, dan lansia.

82. Jawaban: A

Pembahasan: Pendekatan pada populasi khusus tetap berlandaskan Initial Assessment.

P. TEAM DYNAMIC

83. Jawaban: B

Pembahasan: Komunikasi tim harus ringkas dan jelas.

84. Jawaban: B

Pembahasan: Closed-loop communication berarti penerima mengulang instruksi untuk memastikan pemahaman.

85. Jawaban: B

Pembahasan: Debriefing mengevaluasi proses dan mengidentifikasi hal yang dapat diperbaiki.

Q. SOAL KASUS TERINTEGRASI

86. Jawaban: B

Pembahasan: Tidak responsif + tidak bernapas normal + tidak ada nadi → RJP.

87. Jawaban: B

Pembahasan: Perdarahan aktif dan syok ditangani segera sesuai prioritas.

88. Jawaban: A

Pembahasan: Sesak berat, suara napas unilateral menurun, dan perburukan hemodinamik sangat mencurigakan tension pneumothorax.

89. Jawaban: A

Pembahasan: Penurunan GCS dan pupil tidak simetris adalah masalah neurologis, dengan ABC tetap dipastikan.

90. Jawaban: B

Pembahasan: Nyeri leher dan kelemahan empat ekstremitas memerlukan proteksi spinal dan menghindari gerakan tidak perlu.

91. Jawaban: A

Pembahasan: VF tanpa nadi adalah shockable rhythm → defibrilasi sesuai algoritme dan lanjutkan RJP.

92. Jawaban: B

Pembahasan: PEA adalah non-shockable rhythm → RJP dan pencarian penyebab reversibel.

93. Jawaban: B

Pembahasan: Gangguan airway pada luka bakar merupakan prioritas segera.

94. Jawaban: A

Pembahasan: Setelah airway dan breathing, primary survey berlanjut ke circulation.

95. Jawaban: B

Pembahasan: Perburukan pasien menuntut reevaluasi ABCD dan intervensi kembali sesuai temuan.

96. Jawaban: A

Pembahasan: Setelah splint, status neurovaskular perlu dievaluasi kembali.

97. Jawaban: A

Pembahasan: Deformitas kendaraan dan mekanisme benturan membantu prediksi pola cedera.

98. Jawaban: A

Pembahasan: Penerima mengulang instruksi → closed-loop communication.

99. Jawaban: B

Pembahasan: Analisis irama harus dilakukan dengan jeda RJP seminimal mungkin.

100. Jawaban: B

Pembahasan: Prinsip BTCLS adalah menangani masalah yang mengancam nyawa berdasarkan prioritas.

PANDUAN MENILAI HASIL LATIHAN

[illegible]

Nilai di atas adalah indikator belajar yang dibuat untuk latihan ini, bukan passing grade resmi BTCLS.

Prioritas review: BLS/RJP, EKG, Megacode, Airway & Breathing, Initial Assessment, Stop Bleeding, Splinting, Spinal Stabilization, dan Extrication.