


Trigonometry Basics



$\sin \alpha = \frac{AB}{OA}, \quad \cos \alpha = \frac{OB}{OA},$   
 $\tan \alpha = \frac{AB}{OB}, \quad \cot \alpha = \frac{OB}{AB},$   
 $\sec \alpha = \frac{OA}{OB}, \quad \csc \alpha = \frac{OA}{AB}$

Trigonometry Basic Formulas

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$   
 $\tan \alpha = \frac{1}{\cot \alpha}$   
 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$   
 $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$   
 $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$   
 $\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$   
 $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} = \sec^2 \alpha$   
 $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} = \csc^2 \alpha$

Popular Angles

	0	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{2}$ (90°)
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$
cot	$+\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
sec	1	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	2	$\pm\infty$
csc	$+\infty$	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	1

Double-Angle

$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$   
 $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$   
 $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$   
 $\sin 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$   
 $\tan \alpha + \cot \alpha = \frac{2}{\sin 2\alpha}$   
 $1 - \tan^2 \alpha = \frac{\cos 2\alpha}{\cos^2 \alpha}$   
 $\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$

$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$   
 $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$   
 $\cot 2\alpha = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}$   
 $\cos 2\alpha = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$   
 $\cot \alpha - \tan \alpha = \frac{2}{\tan 2\alpha}$   
 $1 - \cot^2 \alpha = -\frac{\cos 2\alpha}{\sin^2 \alpha}$   
 $\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$

Half-Angle

$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$   
 $\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$   
 $\tan \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$   
 $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$   
 $\cot \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}$   
 $\tan \alpha \tan \frac{\alpha}{2} = \sec \alpha - 1 = \frac{1 - \cos \alpha}{\cos \alpha}$   
 $1 + \sin \alpha = 2 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2})$   
 $1 - \sin \alpha = 2 \sin^2(\frac{\pi}{4} - \frac{\alpha}{2})$   
 $1 + \tan \alpha = \sqrt{2} \frac{\sin(\frac{\pi}{4} + \alpha)}{\cos \alpha}$   
 $1 - \tan \alpha = \sqrt{2} \frac{\sin(\frac{\pi}{4} - \alpha)}{\cos \alpha}$

$\cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$   
 $\cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$   
 $\tan \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$

Sums of Angles


$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$   
 $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$   
 $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$   
 $\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \alpha \pm \cot \beta}$   
 $\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$   
 $\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta$

Phase Shift

	$-\alpha$	$\frac{\pi}{2} - \alpha$	$\frac{\pi}{2} + \alpha$	$\pi - \alpha$	$\pi + \alpha$	$\frac{3\pi}{2} - \alpha$	$\frac{3\pi}{2} + \alpha$	$2\pi - \alpha$
sin	$-\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\sin \alpha$
cos	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$
tan	$-\tan \alpha$	$\cot \alpha$	$-\cot \alpha$	$-\tan \alpha$	$\tan \alpha$	$\cot \alpha$	$-\cot \alpha$	$-\tan \alpha$
cot	$-\cot \alpha$	$\tan \alpha$	$-\tan \alpha$	$-\cot \alpha$	$\cot \alpha$	$\tan \alpha$	$-\tan \alpha$	$-\cot \alpha$
	$\cos(\alpha + \pi n) = (-1)^n \cos \alpha$							
	$\sin(\alpha + \pi n) = (-1)^n \sin \alpha$							

Sine/Cosine Theorem

$\frac{BC}{\sin \widehat{BAC}} = \frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = 2R$   
 $\sin \frac{\widehat{BAC}}{2} = \sqrt{\frac{(P-AC)(P-AB)}{AB \ AC}}, \quad P = \frac{AB+AC+BC}{2}$   
 $\cos \frac{\widehat{BAC}}{2} = \sqrt{\frac{P(P-BC)}{AB \ AC}}$   
 $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2 \ AC \ AB \cos \widehat{BAC}$



$S_{ABC} = \frac{1}{2} BC \ AC \sin \widehat{ACB} = 2R^2 \sin \widehat{BAC} \sin \widehat{ABC} \sin \widehat{ACB} =$   
 $= \sqrt{P(P-BC)(P-AC)(P-AB)} = \frac{AC \ AB \ BC}{4R} = Pr$   
 $m_{BC} = \sqrt{\frac{BC^2}{4} + AB^2 - BC \ AB \cos \widehat{ABC}} = \frac{1}{2} \sqrt{2AB^2 + 2AC^2 - BC^2}$   
 $\beta_{BC} = \frac{\sin \widehat{ABC}}{\sin \frac{\widehat{BAC}}{2}} \frac{AB \ BC}{AC + AB} = \sqrt{AC \ AB - DB \ DC}$

Inverse Trigonometric Functions

$\sin(\arcsin \alpha) = \alpha \quad \cos(\arccos \alpha) = \alpha$   
 $\tan(\arctan \alpha) = \alpha \quad \arcsin(\sin \alpha) = \pi k + (-1)^k \alpha$   
 $\arcsin a = \arccos \sqrt{1 - a^2} = \arctan \sqrt{\frac{a^2}{1 - a^2}}$   
 $\arccos a = \arcsin \sqrt{1 - a^2} = \cot^{-1} \sqrt{\frac{a^2}{1 - a^2}}$   
 $\arctan a = \cot^{-1} \frac{1}{a} = \arcsin \sqrt{\frac{a}{1 + a^2}}$   
 $\arcsin a + \arccos a = \frac{\pi}{2} = \arctan a + \cot^{-1} a$