

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DU NORD DE LA FRANCE



Photo de couverture : *Galeruca (Galeruca) interrupta* Illiger, 1802

Bilan de la S.E.N.F. année 2012	
Dépenses	
Frais d'impression du bulletin	414,33
Frais d'impression catalogue Curculionidae	560,00
Frais d'affranchissement bulletin	339,5
Frais d'affranchissement catalogue Curculionidae	189,85
Achat d'ouvrages	326,5
Frais de gestion CCP	19,26
Composition florale (décès Michel Huchette)	40,00

Total des dépenses :	1889,44
-----------------------------	----------------

Recettes	
Cotisations (46 x 25, 2 x 30)	1210,00
Vente bulletins	79,4
Vente catalogue Curculionidae (23 x 9,25, 3 x 20, 2 x 10, 3 x 6)	310,75
Remboursement achat d'ouvrages	141,5

Total des recettes :	1741,65
-----------------------------	----------------

Solde au 31/12/2011	463,91
Recettes	1741,65
Dépenses	1889,44
Solde au 31/12/2012	316,12
Conforme au relevé n° 1 au 2/1/2013	

Les Ichneumoninae des départements français du Nord et du Pas-de-Calais (Hymenoptera).



Par Joël Valemberg et Jean-Luc Vago

II – Tribus Trogusini et Protichneumonini

Ce travail fait suite à l'article paru dans le BSENF n° 338 (VALEMBERG & VAGO, 2011) qui concernait la tribu Platylabini. Nous avons conservé une conception classique du point de vue de la reconnaissance de ces tribus Trogusini et Protichneumonini, tout en sachant que des travaux récents de cladistique ont établi le doute sur leur validité (par exemple SIME & al., 2002) et en attendant des réponses plus claires, par exemple sur la position du genre *Heresiarches* Wesmael, 1859. Sauf mention contraire, les exemplaires indiqués comme appartenant à la Collection Valemberg ont été capturés par J. Valemberg. *Trogus lapidator* est parasite dans les chrysalides du *Papilio machaon* ; nous n'avons que des captures anciennes à signaler. Les espèces des genres *Callajoppa*, *Protichneumon* et *Amblyjoppa* sont parasites dans les chrysalides de Sphingidae ; là encore, nous n'avons pas de captures récentes à signaler pour ces genres, dont les espèces paraissent donc se raréfier. Nous serions reconnaissants envers nos membres capables de nous donner des renseignements sur ces espèces qui ne passent pas inaperçues, étant parmi nos plus grands ichneumons (16 à 32 mm). On trouve sur le net de nombreuses photos de ces insectes, ce qui permet de se faire une idée de leur habitus. À part *Lymantrichneumon disparis*, qui fait exception, ces espèces n'hibernent pas à l'état adulte.

Tribu Trogusini Förster, 1869

Genre *Trogus* Panzer, 1806

Trogus lapidator (Fabricius, 1787) – Nord : 1 ♀, Bugnicourt, 4. IX. 1904 (CAVRO, 1954) ; 1 ♀, Féchain, 2. VIII. 1911 (CAVRO, 1954) ; 5 ex. Féchain, VI. 1942, éclos de chrysalide de *Papilio machaon* (CAVRO, 1954) ; 1 ♂, Ronchin, 14. III. 1961, éclos de chrysalide de *Papilio machaon* (Coll. Goulliart, Fréchin leg., examiné) ; 1 ♀, Lille, éclosion 19. III. 1961, de chrysalide de *Papilio machaon* (Coll. Goulliart, examiné) ; 1 ♀, Ronchin, 14. III. 1961, éclos de chrysalide de *Papilio machaon* (Coll. J. Valemberg, Fréchin leg.).

Genre *Callajoppa* Cameron, 1903

***Callajoppa cirrogaster* (Schrank, 1781)** – Nord : 1 ♀, Féchain, marais, 6. VIII. 1909 (CAVRO, 1954, det. J. Leclercq) ; 1 ♂, Féchain, 28. VII. 1926, jardin (CAVRO, 1954, det. Granger) ; 1 ex., Rombies, 6. VII. 1902 (CAVRO, 1954, Van Oye leg.) ; 1 ♀, Lille (Coll. Goulliart, examiné) ; 1 ♂, Cambrai, ex. Chrysalide de *Sphingidae* 22. VI. 1970 (Coll. Valemberg, Vago leg.).

***Callajoppa exaltatoria* (Panzer, 1804)** – Nord : 1 ex., Wattrelos, VI. 1930, éclos de *Sphinx ligustri* (CAVRO, 1954, Deschamps leg.) ; 1 ex., Wattrelos, VII. 1938, éclos de *Sphinx ligustri* (CAVRO, 1954, Deschamps leg.) ; 1 ex., Hem, 13. VII. 1946, de chrysalide de *Sphinx ligustri* (CAVRO, 1954, Sequedin leg.) ; 1 ♀, Féchain, 25. VIII. 1926, jardin (CAVRO, 1954) ; 1 ♀, Féchain, 25. VIII. 1953, marais (CAVRO, 1954, Rousselle leg., det. J. Leclercq) ; 1 ♀, Douai, 30. VII. 1952, 22 heures (CAVRO, 1954, Théry leg.) ; 1 ♀, Lille, 8. VII. 1958, éclos de *Sphinx ligustri* (Coll. Goulliart, Fréchin leg., examiné) ; 1 ♂, Lille, 10. VII. 1958, éclos de *Sphinx ligustri* (Coll. Goulliart, Fréchin leg., examiné) ; 1 ♀, Lille, 1. VIII. 1960, (Coll. Goulliart, examiné) ; 4 ♀, 1 ♂, Lille, V. 1961, éclos de *Sphinx ligustri* (Coll. Goulliart, Fréchin leg., examiné) ; 3 ♂, Lille, 27. VI. 1961, éclos de *Sphinx ligustri* (Coll. Goulliart, Fréchin leg., examiné) ; 1 ♂, Wasnes-au-Bac, 8. VII. 1972 (Vago leg., examiné). 1 ♀ Lille, 05. VII. 1962, friches Porte de Béthune, prit au vol sur Troène (Coll. Valemberg) ; 1 ♀ Malo-les-Bains, 15. IV. 1963, pris au vol dans les dunes, au-dessus de buissons d'arbousiers (Coll. Valemberg) ; 1 ♀, Croix, 20. VII. 1946 (Coll. Valemberg, Derveaux leg.) ; 1 ♀, Lambersart, 15. VII. 1978, ex chrysalide de *Sphinx ligustri* (Coll. Valemberg, Wambeke leg.) ; 1 ♂, Lille, 30. IV. 1961, ex chrysalide provenant de chenille de *Sphinx ligustri* récoltées sur Troènes autoroute A. 25 (Coll. Valemberg) ; 1 ♂, Lille, 15. VII. 1961, ex chrysalide provenant de chenille de *Sphinx ligustri* récoltées sur Troènes autoroute A. 25 (Coll. Valemberg) ; 1 ♀, 1 ♂, Lille, 28. IV. 1961, ex chrysalide provenant de chenille de *Sphinx ligustri* récoltées sur Troènes autoroute A. 25 (Coll. Valemberg) ; 1 ♂, Loos-les-lille, 05. VIII. 1962, pris au vol sur buissons (Coll. Valemberg).

Tribu *Protichneumonini* Heinrich, 1934

Genre *Protichneumon* Thomson, 1893

***Protichneumon fusorius* (Linnaeus, 1761)** – Nord : 1 ♂, Forêt de Nieppe, 16. VIII. 1920 (CAVRO, 1954, det. Granger).

***Protichneumon pisorius* (Linnaeus, 1758)** – Nord : 1 ♂, Féchain, 19. VIII. 1908, sur *Heracleum spondylium* (CAVRO, 1954).

***Protichneumon similatorius* (Fabricius, 1798)** – Nord : 1 ♂, Gruson, VIII. 1944, ombelle (CAVRO, 1954, det. Teunissen).

Genre **Amblyjoppa** Cameron, 1902

Amblyjoppa fuscipennis (Wesmael, 1845) – Nord : 1 ♂, Féchain, marais, 10. IX. 1908 (CAVRO, 1954) ; 2 ♂, 1 ♀, Féchain VIII. 1920, VIII. 1925, VIII. 1944 (CAVRO, 1954, det. Perkins) ; 1 ♀, Forêt de Trélon, 20. VIII. 1982 (Coll. Valemberg, det. Valemberg, Huchette leg.).

Amblyjoppa proteus (Christ, 1791) – Nord : 2 ♀, environs de Roubaix, 1931 (CAVRO, 1954, det. J. Leclercq) ; 1 ex. , Lille-Arbonnoise, 27. VII. 1909 (CAVRO, 1954, Van Oye leg.) ; 1 ♂ Marcq-en-Baroeul, 31. V. 1985 (Coll. Valemberg, det. Valemberg, Wambeke leg.). Pas-de-Calais : 6 ♀, Havrincourt, 10. VIII. 1896, sur *Salix viminalis* (CAVRO, 1954, Godon leg.).

Genre **Coelichneumon** Thomson, 1893

Coelichneumon biannulatus (Gravenhorst, 1820) = Coelichneumon auspex (Müller, 1776) sensu PERKINS (1959) et VALEMBERG (2011) – Nord : 1 ♂, Lambersart, 15. VII. 1979 (Valemberg leg. , examiné).

Coelichneumon bilineatus (Gmelin, 1790) – Nord : 1 ♂, Loos, bois Danel, sur *Clematis vitalba* 24. VI. 1964 (Coll. Goulliart, capture Valemberg, étiquetté E. Fréchin, examiné). Pas-de-Calais : 1 ♀, Hamel 12. IV. 1950 (CAVRO, 1954, Théry leg.).

Coelichneumon cyaniventris (Wesmael, 1859) – Nord : 1 ♂, Watten, bord de l'étang 19. V. 1983 (Coll. Valemberg, examiné). 1 ♂, Féchain, 29. VII. 1951, sur herbe, marais (CAVRO, 1954) ; 1 ♂, Phalempin, V. 1952 (Coll. Goulliart, examiné) ; 1 ♀, Cambrai, jardin, 15. VII. 1969 (Vago leg. , coll. Valemberg, examiné) ; 1 ♀, Cambrai, jardin, 27. VI. 1970 (Vago leg. , coll. Valemberg, examiné) ; 1 ♀, Forêt de Mormal, sur ombellifères, 15. VI. 1982 (Coll. Valemberg, examiné). Pas-de-Calais : Trescault, VIII. 1909 et VIII. 1912 (CAVRO, 1954, Parent leg.) ; 1 ♀, Ecourt-St-Quentin, VI. 2005 (Vago leg. , examiné).

Coelichneumon comitator (Linnaeus, 1758) – Nord : 1 ♀, Leers, haie, VII. 1907 (CAVRO, 1954) ; 1 ♀, Féchain, mur ensoleillé, 29. IX. 1948 (CAVRO, 1954, det. J. Leclercq) ; 1 ♀, Féchain, mur ensoleillé, 29. IX. 1948 (CAVRO, 1954, det. Perkins). Variété (sous-espèce ?) **ferreus** (Gravenhorst, 1829) : 1 ♀, Wasnes-au Bac, ombelle, VIII. 1906 (CAVRO, 1954) ; 1 ♀, Ronchin, V. 1930 (Coll. Goulliart, examiné).

Coelichneumon consimilis (Wesmael, 1845) – 1 ♂, Nord : Bourghelles, VII. 1952 ; prairie, sur Berce (CAVRO, 1954, Théry leg. , dét. Aerts) ; 1 ♂, Bouchain, 11. VI. 1970 (Coll. Goulliart, examiné) ; 1 ♂, Loos, 25. VI. 1964 (Coll. Goulliart, capture Valemberg, étiquetté E. Fréchin, examiné).

Coelichneumon desinatorius (Thunberg, 1822) – Nord : 1 ♂, Loos, bois Danel, 24. VI. 1964 (Capture Valemberg, prêté à Fréchin, non rendu et non retrouvé dans la

collection Goulliart). Pas-de-Calais : Trescault, 1909 (CAVRO, 1954, d'après O. Parent).

Coelichneumon erythromerus (Rudow, 1888) – Nord : 1 ♂, Baisieux, 15. VII. 1971, f. i. *bimaculatus* Valemberg (Coll. Valemberg, examiné) ; 1 ♀, Cambrai (59), 06. V. 1997, f. i. *subrufus* Valemberg. (Vago leg. , coll. Valemberg, examiné). Pas-de-Calais : Dunes d'Ecault, 50°39'10. 8"N – 01°34'54. 2"E, 9. VI. 2010 (P. De Bleeckere leg. , examiné).

Coelichneumon falsificus (Wesmael, 1845) – Nord : ♂♂, Féchain, jardin, 14-15 et 22. VIII. 1910 (CAVRO, 1954).

***Coelichneumon funebrator* Hortsmann, 2006** – Nord : Fressain, 12. VIII. 1908 (CAVRO, 1954).

***Coelichneumon haemorrhoidalis* (Gravenhorst, 1820)** – Nord : 1 ♀, Cambrai, VI. 1962 (Coll. CAVRO, d'après Valemberg, in litt.). Pas-de-Calais : 1 ♀, Fampoux, 12. VII. 1910 (CAVRO, 1954 : *I. castaneiventris* Grv. (*haemorrhoidalis* Grv.), rectifié Valemberg, in litt.).

Coelichneumon leucocerus (Gravenhorst, 1820) – Nord : 1 ♀, Féchain, 14. VIII. 1910 (CAVRO, 1954) ; 2 ♀, Villers-au-Tertre, 5. IX. 2010 (CAVRO, 1954) ; 1 ♀, Marcoing, IX. 1970 (Coll. Valemberg, Vago Leg.).

Coelichneumon nigerrimus (Stephens, 1835) – Nord : 2 ♀, Hem-Lenglet, 17. IX. 1905 (CAVRO, 1954, det. J. Leclercq).

Coelichneumon bohemani (Holmgren, 1864) – Nord : 1 ♂, Loos, 8. VI. 1964, au vol sur *Clematis vitalba* (Coll. Goulliart, capture Valemberg, étiquetté E. Fréchin, examiné).

Genre ***Lymantrichneumon*** Heinrich, 1968

***Lymantrichneumon disparis* (Poda, 1761)** – Nord : 1 ♂, Ostricourt, 20. VIII. 1904, éclos de *Liparis monacha* (CAVRO, 1954, Declercq leg.) ; 2 ex. , Abscon, 10. VIII. 1907 (CAVRO, 1954, un ex. examiné : coll. Goulliart) ; 1 ♂, Hasnon, 15. VIII. 1920 (CAVRO, 1954) ; 4 ex. Forêt de Nieppe, 16. VIII. 1920 (CAVRO, 1954) ; 2 ♀, Féchain, VIII. 1949 et VIII. 1950 (CAVRO, 1954) ; 5 ♂, Mormal, 19. IV. 1952, racine d'arbre renversé (CAVRO, 1954, Rousselle leg.) (Remarque : donnée douteuse, car les mâles n'hibernent pas) ; 1 ♀, Forêt de Mormal, 27. II. 1988, hibernant sous écorces (coll. Valemberg) ; 2 ♀, Forêt de Fourmies, 19. II. 1989, hibernant sous écorces (Coll. Valemberg).

Bibliographie

CAVRO E. , 1954. – Catalogue des Hyménoptères du département du Nord et régions limitrophes III, Térébrants. - Bull. Soc. Entomol. Nord Fr. , n° 75, Suppl. , 134 pages.

SIME K. R. , **WAHL D. B.** , 2002. - The cladistics and biology of the *Callajoppa* genus-group

(Hymenoptera : Ichneumonidae, Ichneumoninae). Zoological Journal of the Linnean Society, 134, 1–56.

VAGO J. -L. , VALEMBERG J. , 2011. - Les Ichneumoninae des départements français du Nord et du Pas-de-Calais (Hymenoptera). I – Tribu Platylabini-Bull. Soc. Entomol. Nord Fr. , n° 338, 1-10

BSENF (2013) 348:0-0

Baris (Baris) analis Olivier 1790 (Coléoptère Curculionidae Baridinae), retrouvé dans le Pas-de-Calais.



Par Dominique MENET

L'étude d'une série de Curculionidae, récoltés durant l'année 2012 par D. Lohez a révélé quelques captures intéressantes qu'il me paraît utile de citer dans le bulletin.

Il faut principalement noter la présence de *Baris (Baris) analis* Olivier 1790, capturé au Fort Vert le 12. IV. 2012, au bord d'une mare ouverte, légèrement saumâtre. L'espèce, récoltée en une seule station (Saméon) avant 1950, n'avait pas été retrouvée récemment dans notre région (Menet 2012).

Cette espèce est signalée, assez commune en France, bien que rare dans notre région. Elle se rencontre dans toute la France et la Corse, sur *Pulicaria dysenterica* (L.), Bernh. (Hoffmann 1954), au bord des fossés, marais, au bord de l'eau.

Outre l'insecte cité précédemment, il faut aussi noter la capture de *Pelenomus commari* Panzer 1794 à Beuvry Bellenville (62) le 13. VI. 2012, sur les berges d'une mare ombragée. Cette espèce très commune avant 1950 s'est raréfiée dans la région et n'était signalée, récemment, que par les captures de François Burle du Nord (forêts de Marchiennes et de Raismes/St Amand).

Bibliographie

HOFFMANN. , 1954 - Coléoptères Curculionides, 2e partie. Faune de France n° 59, 721p.

MENET D. , 2012. - Coléoptères Curculionoidea , hors Scolytidae, du Nord de la France. Supplément au bulletin n°342 de la Société Entomologique du Nord de la France, 101 p.

Insectes et forêts



Par Michel Debuyser

Introduction :

● Le regard du naturaliste :

Forêts : Formations végétales où dominent les arbres. Dans son sens le plus strict, la forêt est une biocénose naturelle qui doit se maintenir en équilibre sous l'action prépondérante des facteurs du milieu. Le terme de bois, synonyme de surface boisée, aurait un sens plus général englobant les peuplements artificiels.

Dans notre région les forêts appartiennent au grand type des forêts feuillues caducifoliées constituées d'essences à feuilles caduques comme les Chênaies et les Hêtraies.

● Le regard du Forestier :

Forêts : Domaine de production de bois. Bois de chauffage, Bois d'oeuvre...

La forêt, lieu de biodiversité :

La répartition des Insectes en forêt n'est pas uniforme. Elle varie à la fois dans l'espace et dans le temps. Elle est conditionnée par deux ensembles de facteurs, le comportement trophique et les exigences vis-à-vis des éléments du microclimat.

● Variations spatiales : L'espace (3D) fait ici référence à la végétation (Producteurs primaires).

Si l'on se place au niveau trophique « Consommateur primaire », on peut établir un certain nombre de subdivisions ou « Guildes¹ ».

- ◆ Espèces frondicoles, vivent dans le feuillage, ensemble hétérogène :

Des chenilles de Lépidoptères.

Des larves d'Hyménoptères Tenthredes.

Des Coléoptères Chrysomélides.

Les jeunes feuilles sont riches en eau et en protéines, par contre elles sont pauvres en tanins. Les feuilles âgées plus coriaces sont pauvres en eau et en protéines, mais enrichies en tanins. Les tanins réduisent la digestibilité des végétaux en particulier celle des protéines.

- ◆ Les espèces défoliatrices communes sont des espèces printanières, leur développement est rapide. Par contre les chenilles se nourrissant de feuilles

¹ Guilde = Ensemble d'espèces qui cohabitent et exploitent les mêmes ressources écologiques.

âgées ont une croissance ralentie. En élevage, il a été constaté une diminution de 30% de la fécondité chez *Lymantria dispar* dont les chenilles ont été nourries de feuilles âgées !

- ◆ Espèces des méristèmes qui vivent soit dans les bourgeons (Microlépidoptères, Diptères Cecydomyides) soit dans le cambium.
- ◆ Espèces mangeuses de racines qui sont peu nombreuses, ce sont essentiellement des larves de Coléoptères (*Melolontha*).
- ◆ Espèces suceuses de sève qui sont des Homoptères, des Hémiptères.
- ◆ Espèces gallicoles qui sont surtout des Hyménoptères Cynipides, des Homoptères, ainsi que de rares Coléoptères.
- ◆ Espèces mangeuses de graines, de fruits qui sont essentiellement des Coléoptères Charançons et des Microlépidoptères, ainsi que des Diptères.
- ◆ Espèces corticoles, ce sont des Coléoptères Scolytides, Curculionides.
- ◆ Espèces xylophages parmi lesquels de nombreux Coléoptères, quelques Hyménoptères, Lépidoptères et Diptères.
- ◆ Espèces mycétophages celles qui mangent les carpophores, Coléoptères, Diptères....
- ◆ Espèces de la litière, essentiellement des Aptérygotes (Collemboles), accompagnés de Coléoptères et Diptères caractéristiques des milieux forestiers.
- ◆ Espèces des cavités d'arbres formant une faune originale qualifiable de « microcavernicole ».

● Variations temporelles (Phénologie) :

L'entomologiste adapte ses recherches en forêt en fonction de la période de l'année. Les chercheurs de Carabes par exemple profitent des « chasses d'hiver » lorsque leurs insectes préférés sont en loge d'hibernation soit dans la terre des talus soit dans le bois mort, souches ou grosses branches gisant sur le sol.

◆ Cas d'une Hêtraie

- **novembre-début mars** : Les arbres sont en état de dormance, l'activité des Arthropodes est réduite.
- **Mars à mi-avril** : Si les conditions climatiques sont favorables, quelques espèces reprennent leurs activités. Ce sont essentiellement des espèces inféodées aux bourgeons comme le Coléoptère Cucurlionide *Rynchaenus fagi*.
- **Mi-avril à début mai** : les bourgeons s'ouvrent. On observe la remontée d'insectes arboricoles depuis le sol qui leur a servi d'abri

hivernal : *Rynchaenus fagi*, *Phyllobius argentaeus*, *P. mollis*, *P. undatus*....
Écllosion massive de la Cécydonomie gallicole *Mikiola fagi* qui peut former de véritables essaims.

- **Mai** : plein développement des feuilles et maximum d'abondance des phyllophages Chenilles d'*Operophtera fagata*, adultes de *Rynchaenus fagi* et *Phyllobius argentaeus*.
- **Juin** : L'activité des espèces défoliatrices se ralentit en raison de la sclérification du feuillage. Les espèces prédatrices comme *Athous sp.* et des Cantharides comme *Cantharis sp.* et *Malthodes sp.* sont abondants dans le feuillage.
- **Juillet** : Les chenilles de Tortricides, de Géométrides, les suceurs de sève *Phyllaxis fagi* et *Typhlocyba cruenta* sont abondants.
- **août à mi-septembre** : diapause estivale, le forficule *Chelidurella acanthopygia* qui se nourrit de végétaux épiphytes est à son maximum d'activité aérienne.
- **Mi-septembre-fin octobre** : Chute des feuilles. Les espèces hivernant à l'état adulte redescendent au niveau du sol dans lequel elles s'endogent..

◆ Cas d'une Chênaie Charmaie

Globalement il existe un maximum d'abondance au printemps, ce qui correspond à la reprise de la croissance des arbres et à leur époque de floraison. Il faut noter que certaines espèces comme le Coléoptère Scarabéide *Geotrupes stercorosus* sont présentes toute l'année sans maximum.

- Le maximum d'abondance correspond à la période du 15 mai au 15 juillet.
- Pendant la période estivale, les captures se font plus rares (diapause).
- Une reprise d'activité (second pic d'abondance) se situe entre le 15 août et le 15 septembre. Entre le 15 septembre et le 15 mai période d'hibernation. Activité réduite ou plus discrète (stades larvaires). Noter le cas du Coléoptères Scarabéide *Typhoeus typhoeus* dont l'activité des adultes est vernale.

La forêt, lieu de productivité :

Les Insectes peuvent dans certains cas porter atteinte à la productivité, ce qui fait que l'on peut parler d'espèces « nuisibles » et inclure dans la gestion des espaces forestiers des pratiques visant à limiter, voire éliminer ces espèces.

On peut recenser 4 types d'atteintes à la productivité :

❶ Pertes de production liée à la réduction de croissance des arbres en raison de défoliations successives :

La défoliation réduit la photosynthèse, diminue la résistance de l'arbre ce qui permet les attaques des xylophages, et empêche la formation des organes reproducteurs, ce qui peut compromettre la régénération naturelle.

Deux groupes d'insectes interviennent :

- ◆ Les Lépidoptères : Les chenilles (larves) de Géométrides *Thaumetopoea pytocampa*, *Lymantria dispar*, *Tortrix viridana*. (Les attaques des chenilles de *Tortrix viridana* réduisent la production de glands).
- ◆ Les fausses chenilles (larves) d'Hyménoptères Tenthredinidés = « Mouches à scie » (la femelle possède une tarière de ponte en forme de scie, qui lui permet d'insérer ses oeufs dans le parenchyme des feuilles).

En période de pullulation, ils peuvent consommer la totalité du feuillage disponible. En période normale la consommation n'excède pas 10%. La consommation de nourriture ingérée journalièrement est comprise entre 0,5 et 1,5 fois leur masse corporelle.

❷ Dépérissement et mort des arbres du fait d'attaques massives

Le bois des arbres atteints est tout de même exploité, mais étant dégradé il perd beaucoup de sa valeur. Les dégâts sont causés par des insectes xylophages, en particulier les Scolytes. À signaler la cochenille du Hêtre (*Cercopis fagacearum*).

❸ Dépérissement par inoculation de virus ou de champignons pathogènes :

La maladie hollandaise de l'Orme transmise par les Scolytes (*S. multistriatus* et *S. scolytus*) provoquée par un champignon *Ceratocystis ulmi*.

La nécrose du phloème de l'Orme, affection à virus transmise par la cicadelle *Scaphoideus luteolus*.

La chalarose du Frêne récemment introduite dans nos boisements et qui inquiète beaucoup nos forestiers régionaux.

❹ Dépréciation des qualités technologiques du bois-matériau après exploitation :

Les bois d'œuvre peuvent être la cible du Cérambycide *Hylotrupes bajulus*, le « capricorne des maisons », d'Anobiides « vrillettes » ce qui entraîne la dépréciation.

La forêt lieu de recyclage de la biomasse :

◆ Litière :

La litière correspond à l'accumulation, à la surface du sol, des débris végétaux

(feuilles, brindilles, branches mortes...) qui ne sont pas encore altérés et qui vont jouer un rôle important dans les processus de pédogenèse.

Le sol des forêts de feuillus est généralement caractérisé par un humus doux ou « mull ». Sa macrofaune est riche en Lombricides et Enchytréides, larves de Diptères, sa microfaune étant constituée par des Insectes Collembolés. La décomposition de la litière est rapide et l'horizon a peu épais.

Humification et minéralisation sont assurées par les microorganismes (Bactéries, Champignons). Les animaux du sol préparent le substrat en le fragmentant et en le mélangeant. Toute la litière forestière transite au moins une fois par le tube digestif des animaux.

Collembolés et Diptères sont les principaux responsables de la fragmentation de la litière, ils préparent activement la voie aux Enchytréides et Lombricides.

Les Collembolés : dominent largement la faune du sol par leur nombre : on estime dans une Hêtraie, leur densité à 60 000 collembolés/m². Ce sont rarement des prédateurs, ils se nourrissent de divers débris végétaux (feuilles mortes, brindilles), des filaments mycéliens, du pollen, des algues unicellulaires, et même de l'humus. Ils réalisent une fragmentation mécanique importante de la litière.

Les Diptères : Les larves saprophages des Diptères du sol consomment beaucoup de litière qu'elles mélangent activement à la partie minérale du sol. On en rencontre en moyenne de 250 à 1000 individus/m². Deux familles interviennent, les Tipulidés et les Bibionidés (ex. : la mouche de la St Marc, *Bibio marci*). D'autres familles jouent un rôle dans la formation du sol en tant que mycétophages (mangeurs de champignons).

◆ Bois mort :

La composition chimique du bois (lignine) en fait un matériau peu dégradé. Sa décomposition prend du temps : des années, voire des décennies.

Les milieux saproxyliques présentent donc une stabilité dans le temps ce qui permet une succession de faunes (cohortes) en fonction de l'état de décomposition du matériel ligneux. La composition des cohortes est fonction des conditions climatiques et des essences forestières.

Dans nos régions essentiellement des feuillus : Chênes, Hêtres (Peupliers), auxquels il faut adjoindre quelques résineux : Pins, Sapins.

La majorité des Insectes saproxyliques ont un stade adulte indépendant du bois mort, les adultes sont floricoles (*Cétoines*, *Leptures*, *Buprestes*), ou ne s'alimentent pas. Ce sont donc les larves qui interviennent dans la décomposition du bois mort, creusant leurs galeries à l'aide de puissantes mandibules et se nourrissant des débris ligneux. Il faut remarquer la particularité de leurs tubes digestifs : ils présentent des

mycétomes, cryptes remplies de levures symbiontes. Les levures ayant le pouvoir de sécréter la lignase indispensable à la digestion de la lignine!

Les trous de sorties et galeries abandonnées peuvent être utilisés par des espèces non xylophages (Hyménoptères *Mégachiles*, *Osmies*) pour abriter leurs larves.

Décomposition d'un tronc de Hêtre :

Stade 1 : Stade à Buprestides et Cérambycides

1 à 4 ans

Les premiers coléoptères qui s'installent sous l'écorce sont des Buprestides (*Chrysobothris affinis*, *Agrilus viridis*), de rares Scolytes (*Taphrorychus bicolor*), et le Cérambycide *Rhagium bifasciatum*. On peut noter que leurs prédateurs arrivent en même temps : des Clérides (*Pseuderops mutillarius*), des Cucujides (*Laemophloeus*), des Colydiides (*Bitoma crenata*)

À ce stade les seuls coléoptères à pénétrer dans le bois sont *Rhagium* et *Xylotrechus*

Stade 2 : Stade à Cérambycides et Anobiides

3 à 7 ans

Le milieu sous-cortical est occupé par des larves de Cérambycides (*Rhagium*, *Leptura*, *Grammoptera*)

Leurs prédateurs deviennent nombreux (Clérides, Cucujides, Trogositides). Mais c'est à l'intérieur du bois que la faune devient plus nombreuse : Anobiides et Cérambycides (*Leptura*, *Strangalia*, *Rhagium*)

Stade 3 : Stade à Lucanides, Ténébrionides et Cérambycides

6 à 10 ans

Sous les écorces les larves de Pyrochroa et d'Elaterides (*Ampedus*, *Melanotus*, *Athous*) abondent. Dans le bois pénètrent des Lucanides (*Dorcus parallelipipedus*), des Ténébrionides (*Uroma culinaris*, *Helops coeruleus*)

Stade 4 : Stade à Lombricides.

3 à 4 ans

Les coléoptères ne sont plus le groupe dominant. Ce sont les Oligochètes (Lumbricides et Enchytréides, Crustacés Oniscoïdes (Cloportes), larves de Diptères...)

Durée totale : 15 ans

Décomposition d'un tronc de Chêne :

Stade 1 : Décomposition par les Bactéries et les Champignons

1 an

Stade 2 : Stade à Cérambycides

3 à 5 ans

(*Leptura aurulenta*, *Plagionotus arcuatus*, *Plagionotus detritus*, *Saperda scalaris*)

Stade 3 : Stade à Lucanides (*Dorcus*, *Sinodendron*)

2 à 5 ans

Dans les galeries creusées par les larves on trouve des larves d'Elatérides qui sont leurs prédateurs. On trouve aussi des larves de Diptères dont les espèces sont fonction du degré d'hygrométrie du bois. Ainsi dans le bois sec on trouve les larves de Diptères Syrphides, Muscides... En milieu humide des larves de Diptères Xylophagides, Asilides...

Stade 4 : Stade à Fourmis (*Lasius niger*, *L. fuliginosus*, *Myrmica rubra*) 4 ans

Les fourmis installent leurs colonies dans les galeries creusées par les larves de Coléoptères, étant prédatrices elles éliminent la plupart des espèces de coléoptères. Quelques espèces dites myrmécophiles peuvent subsister.

Stade 5 : Stade à Lombricides (Diplopoètes, Lombrics) à 4 ans

Les Coléoptères ne sont plus le groupe dominant. Ce sont les Oligochètes (Lumbricides et Enchytréides, Crustacés Oniscoïdes (Cloportes), larves de Diptères terricoles...)

Durée totale : 15 ans

Un biotope forestier remarquable : Les arbres creux.

Les cavités d'arbres constituent des habitats à répartition discontinue et à existence souvent éphémère. Elles renferment des espèces dont la biologie originale mérite que leurs biotopes fassent l'objet de mesure de conservation.

● **Les cavités sèches remplies de terreau :**

Le terreau qui remplit les cavités provient de la décomposition du bois sous l'action de champignons (Polypores) responsables de pourriture brune ou carie. Sa composition se rapproche de celle d'un humus doux (mull). Les larves de Coléoptères peuvent y abonder, Cétonides (*Cetonia aurata*, *Gnorimus nobilis*), Scarabéides (*Sericea brunnea*) et celles de leurs prédateurs Elaterides (*Ampedus sp*, *Elater sp*), mais aussi des microcoléoptères : Histerides, Psélaphides, Cryptophagides...

Les cavités situées en hauteur et ne s'ouvrant pas vers le haut présentent une plus grande variété spécifique.

● **Les cavités remplies d'eau ou dendrotelmes :**

Les dendrotelmes se forment dans des arbres au bois dur et compact, dans la partie axiale du tronc ou au niveau d'une bifurcation. Hêtre et chênes sont des espèces susceptibles de développer ce type de cavité.

Les espèces inféodées à ce type de milieu sont presque exclusivement des Diptères, « Mouches et Moustiques » : Culicides, Chironomides, Cératopogonides, Syrphides.

Compte-rendu de la Réunion du 17 novembre 2013, au Musée d'Histoire Naturelle de LILLE

Présents : M.M. BIZET André, DE BLECKEERE Pascal, DEBUYSER Michel, HOTOMME Robert, LOHEZ Daniel, NICOLAS Bruno, VAGO Jean-Luc, VALEMBERG Joël, VENS Joseph.

① Co-Organisation des «Journées de la Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles»,

Jean-Luc VAGO rappelle qu'elles ont lieu depuis quelques années dans diverses régions de France, associant communications en salle et visites sur le terrain. Pour 2014 elles sont prévues les 4, 5, 6 avril 2014 dans le Nord, et la FFSSN a souhaité que notre société entomologique se charge de leur organisation.

Le Président Jean-Luc VAGO a rencontré dernièrement à Lille Jean-Loup D'HONDT qui se charge de la communication entre notre Société et la FFSSN. À partir de cette entrevue, les points suivants sont abordés :

Vendredi 4 avril : Journée en salle. La FFSSN avait pensé au Centre International de Phytosociologie de Bailleul, malheureusement, la salle Flahaut est indisponible ce jour-là. Alain PROUMEN se propose pour prospecter à Bailleul, deux salles pourraient convenir et recevoir la cinquantaine de participants prévus. La SENF amènerait son vidéoprojecteur et aiderait à la mise en place. Jean-Luc précise qu'il est prévu 4 communications pour la matinée et 3 l'après-midi. La participation de la Société de Botanique du Nord de la France qui a été contactée (Président : Daniel Petit) est envisagée. Au titre de la Société, sont envisagées les communications suivantes :

Guillaume LEMOINE : Pelouses calaminaires, flore, faune.

Jean-Luc VAGO : Hyménoptères

Daniel LOHEZ : Coléoptères aquatiques

Benoit VANHEE (sou -réserve : à contacter) : Faune du sol Collembolles

Daniel PETIT : la Flore (à préciser)

Le président Jean-Luc est chargé de prendre contact avec les conférenciers et la FFSSN pour assurer la coordination et le choix des communications. Dans la discussion Michel DEBUYSER propose de profiter de l'occasion pour rendre hommage à Edmont AUVERLOT en exposant quelques boîtes de sa collection, en particulier les boîtes «diaporamas». Celles-ci ne faisant pas partie du leg à la SENF, Jean-Luc VAGO contactera Mme AUVERLOT.

Samedi 5 avril :

Matinée : Visite du Musée Depuydt à Bailleul ou Musée d'Histoire naturelle de Lille

Après-midi : excursion, à définir. Deux possibilités sont envisagées, le terroir Sainte Marie, d'Auberchicourt sur lequel Jean-Luc VAGO a conduit une étude ou le parc de la fondation Marguerite Yourcenar au Mont Noir avec la participation des écogardes.

Dimanche 6 avril :

Matin : Le Mont St Frieux avec Eden 62

Après-midi : Le marais de Roussent avec CEN Nord - Pas de Calais

Pour clore le sujet, il est prévu la réalisation d'un livret avec le Musée d'Elbeuf auquel la SENF va contribuer. Sont envisagés, une présentation de notre Société Entomologique, les livrets-guides des excursions, la présentation des grands Entomologistes du Nord de la France (Giard, De Norguet, Dutertre, Macquart, Leroy...).

② Participation de la SENF à l'étude sur la Biodiversité lancée par la Communauté Urbaine de Dunkerque.

Guillaume LEMOINE a informé notre Président d'une opportunité à répondre à l'appel d'offres. Après discussion entre les membres présents, il est décidé d'y répondre positivement en proposant des devis pour les déplacements.

③ Évolution du Bulletin SENF :

Avec le développement de l'informatique et l'augmentation des frais postaux, et après discussion, il est décidé de proposer aux membres le choix entre un tarif **version pdf**, et un tarif **pdf + bulletin papier**.

Il a aussi été décidé de diminuer le nombre de photos couleurs. En effet, ces photographies représentent une part importante du prix de revient du Bulletin. Notamment, les photographies qui ne montrent que l'habitus d'un insecte sans apport supplémentaire par rapport au texte ne seront plus imprimées,

Seront conservées les photographies qui apportent un supplément scientifique au texte.

Exemples :

Photographies de biotopes, insectes rares dont les bonnes photographies sont absentes ou peu nombreuses sur internet, insectes montrant des caractéristiques morphologiques discutés dans le texte etc...

④ Bulletins en PDF sur CD : Pascal De Bleeckere a réalisé un CD avec les PDF de tous les Bulletins réalisés en livret, ce qui permet une consultation des plus faciles,

soit les numéros 314 à 347. Si vous êtes intéressé par ce CD, prière de l'indiquer au Président, afin de voir le nombre de CD à graver.

⑤ Vote du budget 2012 :

Le quorum n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée du 12 mai 2013, il est procédé au vote du budget après sa lecture par le trésorier Daniel LOHEZ. (CF Document joint) Le budget est adopté à l'unanimité des membres présents.

⑥ Renouvellement du e^r Tiers du Bureau :

En l'absence de nouvelles candidatures, les sortants sont réélus à l'unanimité des présents.

Vice-Présidents Scientifique : M. D'HONDT Jean-Loup,

Secrétaire : M. DEBUYSER Michel,

Conseiller : M. MENET Dominique,

Conseiller : M. PROUMEN Alain.

La réunion se termine par une présentation d'ouvrages reçus suivie d'une visite de la bibliothèque, ce qui permet à ceux qui le souhaitent d'emprunter des ouvrages.

Le secrétaire Michel DEBUYSER

BSENF (2013) 148:15-24

Une remarquable sous-famille d'hyménoptères : les Gonatopinae (Chrysidoidea, Dryinidae), avec une liste des Dryinidae du Nord – Pas-de-Calais.



Par Jean-Luc Vago

C'est en baie de Somme, près de Du Crotoy, que j'ai fait la première fois connaissance avec un hyménoptère du genre **Gonatopus** Ljungh, le 4 août 1975, en fauchant la végétation herbacée dans la dune grise. Il appartient à une sous-famille des hyménoptères dont les femelles ne peuvent être confondues avec celles d'aucune autre : les Gonatopinae. L'unique exemplaire récolté, conservé maintenant dans la collection de Joël Valemberg, appartient à l'espèce **Gonatopus clavipes** (Thunberg, 1827) et il est représenté sur la figure 1. Cette figure correspond plus précisément à la combinaison de 24 photographies, réalisée par le logiciel Combine ZP.

Les caractéristiques morphologiques remarquables de cet insecte sont :

- ❶ Aptérisme
- ❷ Transformation de l'extrémité des tarsi antérieurs en pinces
- ❸ Trochanters des pattes antérieures très allongés
- ❹ Fémurs des pattes antérieures fortement élargis
- ❺ Thorax fortement modifié, avec une réduction importante du mésothorax permettant une mobilité importante du prothorax par rapport à la partie postérieure du corps
- ❻ Développement important des yeux donnant un aspect particulier à la tête, notamment la partie supérieure entre les yeux (front et vertex) fortement concave.

Ces caractéristiques font que ces insectes sont de remarquables machines adaptées à la chasse de leurs proies, des Cicadelles (Homoptera Auchenorrhyncha). Après une approche de la Cicadelle, où la vue doit jouer un rôle important, elle est saisie par les pinces et solidement maintenue par les pattes antérieures ; la proie peut alors être consommée par l'hyménoptère, comme le font les mantes religieuses, ou alors un œuf va y être déposé, permettant le développement d'une larve.

Chez beaucoup d'insectes à pattes antérieures ravisseuses, mantes, mantispes, ranatres, c'est une grande partie de la patte qui participe à la réalisation de l'organe préhensile. Ici, seuls le dernier article du tarse et les parties qui le prolongent sont concernés par la réalisation de la pince, qui ressemble donc plus à celle des crabes ou écrevisses. Dans le Bulletin 199 de la SENF (VAGO, 1976) j'avais relaté la capture de ce *Gonatopus* de la Somme, sans mentionner de nom d'espèce, car à l'époque on ne disposait que de l'ouvrage de BERLAND (1928) pour l'identification, considéré à juste titre comme obsolète ; à cette occasion, j'avais réalisé un dessin du tarse antérieur, reproduit ici (figure 2).

Le premier article du tarse est allongé dans le sens longitudinal, ainsi que le quatrième. Le cinquième article est lui aussi allongé, mais latéralement, formant l'un des mors de la pince ; il porte des expansions lamelleuses. L'autre mors de la pince est formé par une griffe articulée sur le cinquième article. L'article cinq présente en outre un petit appendice et une griffe réduite. Il est raisonnable de penser que la grande griffe mobile, la griffe réduite, et le petit appendice correspondent à la modification des deux griffes terminales du tarse et de l'arolium des autres hyménoptères.

Chez certaines espèces, comme chez *Haplogonatopus oratorius* (Westwood), les lamelles sont plus longues et apparaissent sur la griffe mobile, assurant probablement une meilleure prise de la proie (Figure 3). Chez *Gonatopus lunatus*



Figure 1 - *Gonatopus clavipes* ♀, exemplaire de la Baie de Somme.




Figure 2 - *Gonatopus clavipes* ♀, tarse antérieur.

Klug, le thorax est encore plus allongé que chez les espèces citées précédemment, permettant une mobilité encore plus importante de la partie antérieure du corps (Figure 4).

À quoi pouvaient bien ressembler ces insectes avant cette importante transformation ? Il est possible de répondre à cette question (les idées qui suivent sont un résumé d'Olmi (1994)). Les particularités morphologiques des Gonatopinae décrites précédemment ne concernent que les femelles : les mâles sont très différents, ils ressemblent aux mâles et aux femelles d'une sous-famille proche, les Aphelopinae (figure 5). Dans cette sous-famille les femelles ne sont pas munies de pinces et il y a très peu de dimorphisme sexuel. On peut donc en conclure que les femelles Gonatopinae devaient ressembler initialement aux femelles Aphelopinae avant l'acquisition de leurs particularités morphologiques les différenciant de leurs mâles. Ces derniers sont d'ailleurs très rares, la reproduction étant souvent parthénogénétique.

Cependant cela amène à d'autres questionnements. En effet, le mode de reproduction des Aphelopinae et des Gonatopinae est peu différent : l'œuf est pondu sur une Cicadelle, et après une paralysie fugace la Cicadelle reprend une vie normale. La larve pénètre dans l'hôte et se nourrit de l'hémolymphe et des tissus. À partir d'un certain stade, la larve de l'hyménoptère fait saillie entre deux segments de l'hôte, protégée par une enveloppe dont l'origine n'est pas claire (figure 6). Elle quittera ensuite l'hôte pour se nymphoser à l'extérieur, dans un cocon.




Figure 3 – *Haplogonatopus oratorius* ♀, exemplaire de l'Aveyron et dessin de la pince. L'échelle se réfère à l'insecte entier.

Comment expliquer que la femelle d'Aphelopinae, sans pinces et d'habitus classique pour un hyménoptère, parvient à parasiter la Cicadelle ? Probablement parce que les modifications morphologiques acquises par les Gonatopinae lors de l'évolution ont, au moins en grande partie, une autre raison d'être.

Alors que les femelles Aphelopinae se nourrissent des solutions sucrées produites par les végétaux ou leurs hôtes, comme le font la plupart des adultes d'hyménoptères, les femelles Gonatopinae sont prédatrices. Seule une partie des Cicadelles capturée par les femelles reçoit un oeuf ; une autre partie est dévorée par la femelle. Il est estimé que le nombre de Cicadelles tuées de cette façon est au moins équivalent au nombre tué par le parasitisme.

Ainsi, il apparaît que la prédation sur les Cicadelles est associée avec les caractéristiques morphologiques de femelle Gonatopinae. Il existe d'ailleurs un groupe de Dryinidae aux moeurs et à la morphologie intermédiaire entre celle




Figure 4 - *Ganotopus lunatus* ♀, exemplaire de l'Aude.
Seuls les appendices situés du côté droit du corps
sont représentés.



Figure 5 – *Aphelopus atratus* (Aphelopinae),
exemplaire d'Auberchicourt.




Figure 6 - Nympe de *Deltocephalus inimicus* parasitée par *Gonatopus erythrode* d'après FENTON (1918)

un peu d'hémolymphe, et la Cicadelle n'est pas tuée.

L'observation des Aphelopinae, de ces deux espèces du genre *Anteon*, permet de se faire une idée de la façon dont la morphologie s'est transformée, en relation avec le développement de la prédation, atteignant son climax chez les Gonatopinae.

À noter qu'une autre espèce du genre *Gonatopus* est signalée de la Baie de Somme (TUSSAC & OLMÍ, 1998) : *Gonatopus dromedarius* (A. Costa, 1882), Le Crotoy, détermination vérifiée par Olmi. Par contre, je n'ai pas connaissance de citations de Gonatopinae pour le Nord – Pas-de-Calais.

Liste des Dryinidées du Nord – Pas-de-Calais :

Aphelopinae

Genre *Aphelopus* Dalman, 1823 : CAVRO (1950) cite deux espèces, *A. metaleucus* (Dalman, 1818) de Wimereux, d'après Giard, et *A. piceipes* Kieffer, 1905, de Lille, localité du type. La seconde espèce est énigmatique, non reconnue par les auteurs contemporains. Un exemplaire de l'espèce *Aphelopus atratus* (Dalman, 1863) a été trouvé sur le terail Sainte-Marie d'Auberchicourt (F-59), le 6.VI.2006 (Vago leg.). *A. metaleucus* (Dalman, 1818) est confirmé du Nord, Lille, (MNHN) et du Pas-de-Calais, Wimereux, (A. Giard, MNHN) par TUSSAC & OLMÍ (1998).

Anteoninae

Lonchodryinus ruficornis (Dalman, 1818) : cité de Lille par BERLAND (1928), coll.

des Aphelopinae et des Gonatopinae : les Anteoninae. Chez certaines espèces de ces insectes, la morphologie reste proche de celle des Aphelopinae, mais on note la présence de petites pinces aux pattes antérieures, simplement constituées d'une griffe qui se replie contre le cinquième article non développé latéralement (figure 7 : *Anteon jurineanum* Latreille, 1809) ; chez d'autres espèces, la pince présente la même structure que chez les Gonatopus, le trochanter s'allonge ainsi que le prothorax, alors que le mésothorax se raccourcit, le fémur antérieur s'épaissit, on est sur la voie de la morphologie si particulière des Gonatopinae (figure 8 : *Anteon fulviventre* (Haliday, 1828). Les Anteoninae se nourrissent sur leurs proies, mais uniquement en prélevant




Figure 7 – *Anteon jurineanum* (Anteoninae), exemplaire d'Auberchicourt et schéma de la pince.




Figure 8 – *Anteon fulviventre* (Anteoninae), exemplaire de la Forêt de Saint-Amand et schéma de la pince.

de Gaulle, MNHN ; donnée reprise par CAVRO (1950) et confirmée par TUSSAC & OLM I (1998). L'espèce est assez commune en Europe occidentale et du nord.

Anteon flavicorne (Dalman, 1818) : cité de Lille par BERLAND (1928), coll. de Gaulle, MNHN ; donnée reprise par CAVRO (1950) et confirmée par TUSSAC & OLM I (1998). Retrouvé à Wasnes-au-Bac (F-59), 1.VII.1997, 1 ♀ (Vago leg.).

Anteon jurineanum Latreille, 1809 : cité de Lille, MNHN par TUSSAC & OLM I (1998). Retrouvé à Auberchicourt (F-59), terril Sainte-Marie, 18.IV.2006, 1 ♀ (Vago leg.).

Anteon gaullei Kieffer, 1905 : baie d'Authie (F-62), 24.V.1998, 1 ♀ (Vago leg.).

Anteon fulviventre (Haliday, 1828) : Forêt de St-Amand (F-59), 17.VI.2000, 1 ♀ (Vago leg.).

Anteon infectum (Haliday, 1837) : Provill, (F-59), sur chênes, 2 ♀. 12.V.2011 ; idem, 2 ♀, 3.VI.2011 (Vago leg.).

Pour comparaison, PAULY & OLM I (1988) citent 29 espèces de Belgique, dont beaucoup ne sont connues que par une ou quelques localités. ROND (2004) cite 40 espèces des Pays-Bas. TUSSAC & OLM I (1998) citent 60 espèces pour la France, mais seulement 9 au nord de Paris, et nous en ajoutons 3. Il y a donc probablement encore beaucoup d'espèces à trouver dans la partie nord de la France. La chasse à vue est très peu productive, sauf pour les Cicadelles parasitées qui sont parfois très nombreuses alors que les adultes sont très peu contactés. Elles peuvent s'élever dans un simple tube bouché de coton. C'est le filet fauchoir et le piégeage, notamment avec la tente Malaise, qui sont le plus efficace pour la capture des imagos.

BERLAND (1928) cite 49 espèces dans la Faune de France, mais ce chiffre est exagéré, car plusieurs formes que Berland considère comme distinctes se sont révélées appartenir à la même espèce. La Faune de France de Berland ne peut donc plus servir de base aux identifications. Il faut utiliser les clefs d'OLMI (1984, 1994, 1999). Le travail de PERKINS (1976) peut encore servir, les clefs étant très bien construites, mais il faut tenir compte des importants changements dans la nomenclature.

Travaux cités

BERLAND, L. 1928 – Hyménoptères Vespiformes II (Eumenidae, Vespidae, Masaridae, Bethy-lidae, Dryinidae, Embolemidae). – Faune de France 19 : 1-208.

CAVRO, E. 1950 – Catalogue des hyménoptères du Département du Nord et régions limitrophes. I. Aculéates. Supplément au *Bulletin de la Société entomologique du Nord de la France*, 52 : 1-86.

OLMI, M. 1984 – A revision of the world Dryinidae (Hymenoptera). – *Memoirs of the American Entomological Institute* 37: 1-946.

- OLMI, M.** 1994 – The Dryinidae and Embolemidae (Hymenoptera : Chrysidoidea) of Fennoscandia and Denmark. – *Fauna Entomologica Scandinavica* 30: 1-100.
- OLMI, M.** 1999 – Hymenoptera, Dryinidae-Embolemidae. – *Fauna d'Italia*, Edizione Calderini Bologna 37: 1-425. Pauly, A. & Olmi, M. 1988 – Les Dryinidae de Belgique. *Notes fauniques de Gembloux*, 17 : 15-27.
- PERKINS, J.F.** 1976 – Hymenoptera Bethyloidea (excluding Chrysidae). *Handbooks for the Identification of British Insects* 6 : 1-38.
- ROND, J. DE.** 2004 – Dryinidae. De Wespen en Mieren van Nederland (Hymenoptera : Aculeata). *Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis*, pp. 201-224.
- TUSSAC, H. & OLMI, M.** 1998 – Contribution à l'inventaire des Dryinidae de France métropolitaine (Hymenoptera, Chrysidoidea). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 103(5) : 483-492.
- VAGO, J.-L.** 1976 – Remarques sur quelques Hyménoptères capturés récemment dans le Nord de la France. *B.S.E.N.F.*, 199 : 5-7.



Appel à cotisation 2014



Chèque de 25 Euros à l'ordre de la S. E. N. F à envoyer au plus tôt au Trésorier :

Daniel LOHEZ
147, rue du Temple
62000 ARRAS

Société entomologique du Nord de la France (S. E. N. F.)

Fondée en 1937 par M. Derveaux, E. Cavro et M. Goulliart

Association « Loi de 1901 » déclarée primitivement en Préfecture de Lille le 24 juin 1937 sous le n° 3486, actuellement en Sous-Préfecture de Cambrai sous le n° W593000769 – CCP. n° 7. 445. 22. H, Centre de LILLE (RIP: 20041-01005 – 0744522H026-14). IBAN : FR49. 2004 1010 05070445202H02 614 – BIC : PSSFRPPLIL.

Présidents d'honneur : J. Valemberg

Président : J. -L. Vago

Vice-Président Scientifique : J. -L. D'Hondt

Vice-Président Administratif : R. Talleux

Secrétaire : M. Debuyser

Trésorier : D. Lohez

Bibliothécaire : P. De bleekere

Conseillers : O. Boilly, P. François, D. Menet, A. Proumen, C. Vanappelghem, S. Wambeke.

Siège social et correspondance :

433 Rue de Landrecies – 59400 CAMBRAI

Cotisations : D. Lohez – 147 rue du Temple – 62000 ARRAS

France 25 €

5 € pour moins de 18 ans et étudiants

Étranger 25 €.

CCP Lille n° 7. 445. 22. H.

Les propositions d'articles sont à envoyer à :

M. Debuyser – 471 rue des Moulins – 62610 AUTINGUES.

Les assertions, conjectures, opinions, points de vue scientifiques publiés dans les Bulletins de la S. E. N. F. le sont sous la responsabilité unique de leurs auteurs. **Par ailleurs ces articles, protégés par le dépôt légal, ne peuvent être reproduits, intégralement ou partiellement et sous quelque procédé que ce soit (photocopie, décalque, tous systèmes de duplication, microfilm) sans le consentement, par autorisation écrite, de l'auteur ou de ses ayants droit, ou ayant cause (loi du 11. 02. 1957, alinéa 1^{er} de l'article 40) ;** cette contrefaçon serait sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Par cette même loi, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41 une copie ou reproduction ne peut être acceptée que si elle est strictement réservée à l'usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective. De même, ne sont possibles que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'utilisation.



Sommaire

<i>Galeruca interrupta</i> (Linnaeus 1758).....	Photo de couverture
Vago Jean-Luc et Valemberg Joël – Les Ichneumoninae des départements français du Nord et du Pas-de-Calais (Hymenoptera).	1-5
Menet Dominique – <i>Baris (Baris) analis</i> Olivier 1790 (Coléoptère Curculionidae Baridinae), retrouvé dans le Pas-de Calais.....	5
Debuyse Michel – Insectes et forêts	6-12
Vago Jean-Luc – Une remarquable sous-famille d'hyménoptères : les Gonatopinae (Chrysidoidea, Dryinidae), avec une liste des Dryinidae du Nord – Pas-de-Calais.	15-24

La Société entomologique du Nord de la France est membre de la Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles.

