

ПРАВИЛА **пользования результатом стоматологических услуг**

1. При любом виде стоматологических услуг

- 1.1. Выполнять план лечения, все рекомендации и назначения лечащего врача, в том числе домашних условиях, своевременно являться на назначенный приём для начала/продолжения лечения;
- 1.2. Посещать контрольные (профилактические) осмотры в процессе лечения и после его завершения не реже 1 раза в 6 месяцев;
- 1.3. Посещать стоматолога и(или) гигиениста для профессиональной гигиены полости рта 1 раз в год.

2. Терапевтическое лечение, восстановление зуба(ов) прямым или косвенным методом

- 2.1. Запломбированные зубы, зубы восстановленные вкладкой (накладкой, виниром, короной, полукоронкой) необходимо чистить зубной щеткой с пастой так же, как естественные зубы - два раза в день. После еды следует полоскать рот для удаления остатков пищи;
- 2.2. Для чистки межзубных промежутков можно использовать зубные нити (флоссы), ирригатор после обучения их применению и по рекомендации врача-стоматолога;
- 2.3. При возникновении кровоточивости при чистке зубов нельзя прекращать гигиенические процедуры. Если кровоточивость не проходит в течение 7 дней, необходимо обратиться к стоматологу-терапевту;
- 2.4. Если после пломбирования и окончания действия анестезии пломба, вкладка, накладка, винир, корона, полукоронка мешает смыканию зубов, то необходимо в ближайшее время обратиться к лечащему врачу-стоматологу;
- 2.5. При пломбах из композитных материалов не следует принимать пищу, содержащую естественные и искусственные красители (например: чернику, чай, кофе и т.п.), в течение первых 2-х суток после пломбирования зуба;
- 2.6. Возможно временное появление боли (повышенной чувствительности) в пролеченном зубе во время приема и пережевывании пищи. Если указанные симптомы не проходят в течение 1-2 недель, необходимо обратиться к лечащему стоматологу;
- 2.7. Во избежание сколов, трещин, выпадения пломбы, вкладки, накладки, винира и прилегающих к ним твердых тканей зуба не рекомендуется принимать и пережевывать очень жесткую пищу (например: орехи, сухари), откусывать от больших кусков (например: от цельного яблока), не открывать зубами бутылки и т.д., избегать острых травм, способных привести как к сколу реставрации, так и к сколу здорового зуба;
- 2.8. Следует воздержаться от приёма пищи, содержащей естественные и искусственные красители (например: чернику, крепкий чай, кофе, соки из ягод, свеклу и т.п.), в течение первых 3-х суток после установки вкладки (накладки, винира), так как они способны изменить цвет;
- 2.9. В случае нарушения герметизма пломба подлежит замене; временная пломба подлежит обязательной замене на постоянную в установленный лечащим врачом срок; после истечения срока службы замена пломбы осуществляется за дополнительную оплату за счет пациента;

3. Хирургическое лечение

- 3.1. За сутки до операции нельзя принимать алкоголь и кофе (повышает кровяное давление)
- 3.2. На следующий день после операции может появиться небольшой отек мягких тканей лица, прилегающих к месту операции. Возможно небольшое повышение температуры, а также онемение в отдельных участках кожи - это нормальная реакция организма на хирургическое вмешательство. Последующие 3-4 дня отек и другие симптомы могут держаться, постепенно исчезая. Необходимо строго соблюдать назначения врача. Если на 4-е сутки вышеуказанные симптомы не проходят необходимо связаться с лечащим врачом Исполнителя.
- 3.3. В день операции необходимо прикладывать холод на 10-15 минут к прооперированной области каждые 1-1,5 часа.
- 3.4. В первые 24 часа после операции нельзя употреблять горячую пищу, принимать горячую ванну, париться в бане, заниматься физическими упражнениями. Спать следует на противоположной стороне или на спине.
- 3.5. В течение послеоперационного периода необходимо избегать переохлаждения.
- 3.6. Необходимо использовать новую зубную щетку для чистки зубов. Область проведенной операции до восстановления целостности ткани нельзя травмировать зубной щеткой.
- 3.7. Необходимо очищать спину языка от налета.
- 3.8. При возникновении воспаления в области проведенного хирургического вмешательства, усиления отека, болевых ощущений, появлении гнойного отделяемого, запаха изо рта необходимо незамедлительно обратиться к лечащему врачу Исполнителя

4. Ортопедическое лечение, восстановление зуба(ов) и зубного ряда зубным протезом, короной, в т.ч. на имплантате

- 4.1. Несъемные зубные протезы (мостовидные протезы и коронки) необходимо чистить зубной щеткой с пастой так же, как естественные зубы два раза в день, продолжительностью не менее 5 минут. Для ежедневной чистки зубов рекомендуется использовать ирригатор. В качестве дополнительного средства гигиены обязательно использовать зубную нить. После еды полость рта следует полоскать для удаления остатков пищи;
- 4.2. Съемные зубные протезы необходимо чистить зубной щеткой с пастой или с зубным порошком два раза в день (утром и вечером), а также после еды по мере возможности. После еды полость рта следует полоскать для удаления остатков пищи. В ночное время, если пациент снимает протезы, их нельзя держать во влажной среде (после чистки завернуть протезы в салфетку) либо в заранее подготовленный контейнер.

- 4.3. При возникновении кровоточивости при чистке зубов нельзя прекращать гигиенические процедуры. Если кровоточивость не исчезла в течение 7 дней, необходимо обратиться в стоматологическую клинику, изготовившую протез;
- 4.4. Временный пластмассовый протез в обязательном порядке подлежит замене на постоянный; средний срок службы временного протеза 6 месяцев;
- 4.5. Если протез зафиксирован на временный цемент, не рекомендуется жевать жевательную резинку и другие вязкие пищевые продукты, атак же необходимо в указанный врачом срок явиться на прием для фиксации его на постоянный цемент;
- 4.6. Во избежание поломки протеза, скола облицовочного материала, а также повреждения слизистой оболочки полости рта не рекомендуется принимать и пережевывать очень жесткую пищу (например, сухари), откусывать от больших кусков (например, от цельного яблока), перекусывать проволоку, кусать твердые предметы, грызть орехи, семечки и т.п.
- 4.7. Во избежание поломки съёмного протеза не допускайте их падения на кафельный пол, в раковину и на другие твердые поверхности;
- 4.8. При нарушении фиксации протеза необходимо обратиться в клинику, изготовившую протез; признаками нарушения фиксации могут быть "хлюпанье" протеза и д.р.;
- 4.9. При нарушении фиксации съёмного протеза, в том числе на балке, фиксирующегося на дентальных имплантатах, что может быть связано с ослаблением замковых и фиксирующих элементов (кламмера, крючки, кнопки, резинки), необходимо обратиться в клинику, изготовившую протез, для замены; рекомендуемая периодичность замены 1 раз в 6 месяцев. Активация и замена расходных фиксирующих элементов и замковых креплений съёмного протеза, а так же его перебазировка не включена в стоимость протезирования и осуществляется за дополнительную плату за счет пациента;
- 4.10. В случае поломки или возникновении трещины в базисе съёмного протеза пациенту необходимо срочно обратиться в клинику ортопедической стоматологии для починки протеза; Починка съёмного протеза не включена в стоимость услуг по протезированию и осуществляется за дополнительную плату;
- 4.11. В случае скола облицовочного материала нужно обратиться в клинику, изготовившую протез;
- 4.12. При появлении болезненных ощущений под коронками, в области коронок, воспаления десны вокруг коронки (кровоточивость десны) срочно обратитесь в клинику, изготовившую протез;
- 4.13. По мере образования жесткого зубного налета на протезах их необходимо очищать специальными средствами, которые продаются в аптеках;
- 4.14. Запрещено при любых обстоятельствах пытаться самостоятельно провести исправления, починку или другие воздействия на протез;
- 4.15. По истечении срока службы протезы и коронки необходимо заменить на новые (изготовление новых коронок и протезов по истечении срока службы осуществляется на возмездной основе);

5. Профессиональная гигиена

- 5.1. В первые 24 часа после процедуры исключить из рациона продукты питания, напитки, лекарственные препараты, содержащие интенсивные красители;

С правилами пользования результатом стоматологических услуг ознакомлен(а), на руки получил(а):

Потребитель _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (дата)