Содержание

1	Парабола	2
2	Заметай	2
3	Дели, Коси и Заметай	3
4	Эллипс	3
5	Экспонента и логарифм	3
6	Косинус и синус	3
7	Загоночная работа	3
8	Лог. КЛШ-2022 8.1 Плакат	4
9	Решения	4
10	Источники мудрости	4

Анонс

• • •

1. Парабола

Три алгебраических вида. Важно уметь быстро строить из любого вида!

$$y = ax^{2} + bx + c$$

 $y = a(x - x_{B}) + y_{B}$
 $y = a(x - x_{1})(x - x_{2})$

Совет: рисуйте сразу, не переводя из одного вида в другой.

Вопрос: правда ли, что все круги одинаковой формы, но разного размера?

Вопрос: правда ли, что все параболы одинаковой формы, но разного размера?

Подумайте о $y = x^2$ и $y = 6x^2$.

Два геометрических определения.

Парабола — множество точек, находящихся на одинаковом расстоянии от заданной точки F и заданной прямой d. Точка F называется фокусом, а прямая d — директрисой.

Упражнение. Даны фокус F и директриса d. Как геометрически построить какую-нибудь точку на параболе?

Парабола — кривая, отражающая параллельно идущие лучи в одну точку F.

Доказательство того, определение через множество точек обладает свойством фокусировки лучей.

Шок-контент. Все параболы одинаковой формы! Ведь при увеличении можно произвольным образом менять расстояние между фокусом и директрисой, а именно им всё и определяется. Алгебраически, $y=6x^2, 6y=6^2x^2, \, \tilde{y}=\tilde{x}^2.$

Упражнение. Дан фокус F и директриса d. Как наиболее просто выбрать оси? Запишите уравнение параболы в выбранных осях.

Упражнение. Дана парабола $y=x^2$. Найдите фокус и директрису.

Упражнение. Дана парабола $y = 2x^2 + 6x + 7$. Найдите фокус и директрису.

О школьниках: на первом занятии было 17 человек.

2. Заметай

Вспоминаем, что парабола сама построится в виде огибающей, если нарисовать все касательные.

Вопрос: как можно описать прямую?

Ответ (дали школьники): с помощью двух точек.

Вопрос: как можно описать дружное семейство прямых?

Здесь школьники четкого ответа не придумали.

Прямая определяется двумя точками. Если добавить параметр a в координаты этих двух точек, то получится семейство прямых! А можно добавить и несколько параметров.

Как убить время и заработать деньги с помощью параболы?

Упражнение. Нарисуйте семейство прямых, проходящих через $L(0,a)-R(10-a,0), a\in\mathbb{R}$. Запишите формулой это семейство. Найдите (п)огибающую визуально и аналитически. Находить уравнение огибающей проще в новых координатах, x'=y-x, y'=x+y.

google: envelope / string art / огибающая / изонить

Рисуем прямые или отрезки в любом количестве. Размечаем все прямые с равным шагом на каждой прямой. Соединяем размеченные точки на паре прямых семейством прямых, получаем огибающую семейства. Повторяем с разными парами прямых, получаем разные огибающие.

Упражнение. Нарисуйте семейство прямых, проходящих через $L(a,a)-R(10-a,0), a\in\mathbb{R}$. Запишите формулой это семейство. Найдите (п)огибающую визуально и аналитически. Подумайте, в каких ортогональных координатах удобнее находить уравнение огибающей.

Снова шок-контент: форма огибающей семейства не зависит от того, взяты ли ортогональные оси или прямые под углом в один градус для построения семейства огибающих.

doodle: параболы между лучами пучка прямых, параболы в шестигольнике.

Можно делать поделки или NFT:)

О школьниках: на занятии было 17 человек.

3. Дели, Коси и Заметай

аддитивность, принцип Кавальери, принцип Мамикона

Площадь окружности с помощью разрезов.

Коси

Скошенная колода карт.

Эллипс. Определение как растянутой окружности. Уравнение эллипса, площадь эллипса.

Заметай.

Вопрос. Кто вел палкой вдоль забора?

Площадь кольца — два способа. Можно вычесть окружности, можно обойти касательным отрезком меньшую окружность.

Аргументация метода: через приближение окружности многоугольником.

Важно! «Палка» должна быть касательной к «забору», осталось в задаче увидеть «забор».

Вопрос. Кто тащил игрушку на веревочке?

Трактриса.

Вопрос. Кто на велике специально заезжал в лужу?

Площадь между следами колес велосипеда при повороте.

О школьниках: на занятии было 17 человек.

4. Площадь под параболой

Упражнение. Обходим половину эллипса касательным отрезком, даны длины полуосей и длина отрезка. Находим площадь.

Вопрос. Как меняется формула параболы $y=x^2$ при сжатии вдоль горизонтальной оси в 3 раза?

Школьники дают ответы: $y = 3x^2$ и $y = 9x^2$. Разбираем, где верный.

Упражнение. Параболы $y=x^2$ и $y=4x^2$. Горизонтальная линия параллельная оси x. Как связаны площади над левой параболой и между левой и правой параболой?

Ответ. По принципу Кавальери «коси» площади равны.

Упражнение. Парабола $y=x^2$. Касательная в точке a. Где она пересечет ось x?

Алгебраическое решение: находим уравнение прямой, проходящей через (a,a^2) , затем находим условие единственности решения системы из параболы и прямой. Наклон при этом равен 2a, и далее находим точку пересечения a/2.

Геометрическое решение. P — точка на параболе, F — фокус, T — точка на директрисе, ближайшая к P. Строим серединный перпендикуляр к FT, он будет касательной в P. Горизонтальная ось проходит через середину FT, следовательно касательная пересекает ось x в точке a/2.

Совместное действие. Сравниваем площадь «лепестка» между $y=4x^2$ и секущей, и криволинейного треугольника между $y=x^2$, касательным отрезком в точке a и горизонтальной осью. Они равны. Акку-

ратно переносим типичный «заметающий» отрезок LR, $(b/2,0)-(b,b^2)$, так чтобы точка L переехала в начало координат, получаем L'R', $(0,0)-(b/2,b^2)$. Обнаруживаем, что L'R' в точности лежит в «лепестке» между $y=4x^2$ и секущей. Обнаруживаем, что площади лепестка и криволинейного треугольника равны. Обнаруживаем, что площадь на левой параболой, площадь между левой и правой параболой и площадь под правой параболой равны по 1/3 от площади прямоугольника a^3 .

Далее ищем площадь под $y=5x^2$, $y=6x^2+17$. Проще всего нарисовать прямоугольник с вершиной параболы в вершине и поделить его площадь на три. Можно и растягивать параболу $y=x^2$ по вертикали в нужное число раз, но это дольше.

5. Эллипс

6. Экспонента и логарифм

7. Косинус и синус

Формула для косинуса

8. Неразобрано

Вывод уравнения параболы в плохих координатах. L(a,0) - R(0,10-a).

Алгоритм: находим точку пересечения двух отрезков LR(a) и LR(b). Находим предел $b \to a$, хватает естественного определения предела. Получается что-то типа $\sqrt{x} + \sqrt{y} = c$.

Огибающая прямоугольных треугольников. Гипербола.

Огибающая скользящей лестницы. Астроида.

Огибающая треугольников с постоянным периметром. Окружность.

9. Загоночная работа

10. Лог. КЛШ-2022

1.

В теховском файле \newpage стоит, чтобы легко было скопировать секцию, для печати двух копий подряд на одном листе. Это позволяет экономить бумагу и время при печати :)

10.1. Плакат

11. Решения

12. Источники мудрости

передалать потом в bib-файл

- 1. https://math.stackexchange.com/questions/475666/
- 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Parabola
- 3. http://www.physicsinsights.org/
- 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbola
- 5. https://www.mathed.page/parabolas/geometry/
- 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Ellipse