

Inverse z-transform for multiple-order pole

Consider the difference equation:

$$y(n) - y(n-1) - y(n-2) + y(n-3) = x(n)$$

The z-transform is:

$$\begin{aligned} Y(z) - z^{-1}Y(z) - z^{-2}Y(z) + z^{-3}Y(z) &= X(z) \\ (1 - z^{-1} - z^{-2} + z^{-3})Y(z) &= X(z) \end{aligned}$$

The transfer function is:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - z^{-1} - z^{-2} + z^{-3}} = \frac{z^3}{z^3 - z^2 - z + 1}$$

The denominator can be factored as:

$$H(z) = \frac{z^3}{z^3 - z^2 - z + 1} = \frac{z^3}{(z-1)(z^2-1)} = \frac{z^3}{(z+1)(z-1)^2}$$

so, there is a 2nd-order pole at $z = 1$.

The partial fraction expansion is:

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z^2}{(z+1)(z-1)^2} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{(z-1)^2}$$

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z^2}{(z+1)(z-1)^2} = \frac{A(z-1)^2 + B(z+1)(z-1) + C(z+1)}{(z+1)(z-1)^2}$$

To solve for A , B , and C :

$$z^2 = A(z-1)^2 + B(z+1)(z-1) + C(z+1)$$

$$\text{Set } z = -1: (-1)^2 = A(-1-1)^2 + B(-1+1)(-1-1) + C(-1+1) = 4A \Rightarrow A = \frac{1}{4}$$

$$\text{Set } z = 1: (1)^2 = A(1-1)^2 + B(1+1)(1-1) + C(1+1) = 2C \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

Differentiate the equation:

$$2z = A2(z-1) + B[1(z-1) + (z+1)1] + C = 1 = 2A(z-1) + 2zB + C$$

$$\text{Set } z = 1: 2 = 2A(1-1) + 2B + \frac{1}{2} \Rightarrow 2B = 2 - \frac{1}{2} \Rightarrow B = \frac{3}{4}$$

The partial fraction expansion is:

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{1}{4} \frac{1}{z+1} + \frac{3}{4} \frac{1}{z-1} + \frac{1}{2} \frac{1}{(z-1)^2}$$



$$H(z) = \frac{1}{4} \frac{z}{z+1} + \frac{3}{4} \frac{z}{z-1} + \frac{1}{2} \frac{z}{(z-1)^2}$$

Using the entries in the z-transform table:

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z}{z-a} \right] = a^n u(n) \quad \text{and} \quad \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{az}{(z-a)^2} \right] = na^n u(n)$$

$$h(n) = \left[\frac{1}{4} (-1)^n + \frac{3}{4} (1)^n + \frac{1}{2} n (1)^n \right] u(n)$$

$$h(n) = \frac{1}{4} \left[(-1)^n + 2n + 3 \right] u(n)$$



Note that the impulse response for a single pole at $z=1$ does not blow up.

