

FELIZ SIN TIROIDES · RECURSO EDUCATIVO

12 errores que pueden alterar la absorción de tu levotiroxina

Marca lo que necesitas revisar y lleva tus preguntas a tu médico o farmacéutico. Este checklist no indica cambios de dosis.

Idea clave: la constancia importa. Sigue la indicación específica de tu prescripción y consulta antes de cambiar horario, presentación o forma de administración.

☐

1. Tomarla junto con el desayuno

Los alimentos pueden reducir o volver irregular la absorción. La recomendación habitual es administrarla en ayunas y esperar el tiempo indicado antes de comer.

☐

2. No mantener un horario consistente

Cambiar frecuentemente entre mañana, noche o con alimentos dificulta mantener condiciones similares de absorción.

☐

3. Beber café demasiado pronto

El café puede interferir con la absorción cuando se consume cerca de la dosis. Pregunta cuál intervalo es adecuado para tu caso.

☐

4. Tomarla cerca de suplementos de calcio

El calcio puede unirse al medicamento. Las fuentes oficiales recomiendan separar el carbonato de calcio al menos cuatro horas.

☐**5. Tomarla cerca de suplementos de hierro**

El hierro también puede disminuir la absorción. La separación habitual indicada es de al menos cuatro horas.

☐**6. Ignorar antiácidos, fibra y multivitamínicos**

Algunos antiácidos, suplementos de fibra, multivitamínicos y medicamentos que se unen a ácidos biliares requieren separación. Revisa toda tu lista con un profesional.

☐**7. No informar todos los medicamentos y suplementos**

Los productos de venta libre, vitaminas y preparaciones herbales también pueden importar. Lleva una lista completa a cada consulta.

☐**8. Cambiar dosis por síntomas o por un resultado aislado**

La dosis debe ajustarse con valoración clínica y resultados interpretados por el profesional tratante. No la modifiques por cuenta propia.

☐**9. Suspenderla cuando te sientes mejor**

Sentirte mejor no significa que ya no la necesites. La levotiroxina controla la falta de hormona; no debe suspenderse sin indicación.

☐**10. Cambiar de marca o presentación sin avisar**

Informa cualquier cambio de producto. El equipo tratante puede decidir si requiere seguimiento adicional de tus niveles.

☐**11. Improvisar qué hacer ante una dosis olvidada**

No dupliques ni ajustes por tu cuenta. Sigue las instrucciones de tu prescripción o consulta al médico o farmacéutico.

☐**12. No comunicar embarazo, cirugía o cambios importantes de salud**

El embarazo y otras situaciones clínicas pueden cambiar las necesidades de seguimiento. Informa oportunamente al equipo tratante.

Preguntas para tu próxima consulta

- ¿Cuál es el mejor horario para mí y cuánto debo esperar antes de comer?
- ¿Qué medicamentos o suplementos de mi lista debo separar?
- ¿Qué debo hacer si olvido una dosis?
- ¿Cuándo debo repetir mis controles y qué síntomas debo reportar?

Fuentes para ampliar:

- [MedlinePlus: información sobre levotiroxina](#)
- [American Thyroid Association: guía para pacientes con hipotiroidismo](#)
- [American Thyroid Association: enfermedad tiroidea y embarazo](#)

Aviso: contenido educativo. No reemplaza valoración, diagnóstico, tratamiento ni seguimiento profesional. No modifiques dosis, marca u horario prescrito sin consultar al profesional tratante.