## B4B01DMA

Jakub Adamec Domácí úkol č. 9A

8. 12. 2024

Tento úkol vypracujte a pak přineste na cvičení č. 10.

- 1. Uvažujte funkci zadanou f(0) = 1, f(1) = 2 a f(n+1) = f(n) + 2f(n-1) pro  $n \in \mathbb{N}$ .
- a) Spočítejte několik prvních hodnot této funkce a odhadněte obecný vzorec pro f(n).
- b) Dokažte indukcí, že váš odnadnutý vzorec je správně.
- **2.** Uvažujte funkci zadanou f(1) = 0 a f(n+1) = f(n) + n pro  $n \in \mathbb{N}$ .

Dokažte indukcí, že takto zadaná funkce splňuje nerovnost  $f(n) \leq n^2$  pro  $n \in \mathbb{N}$ .

## **Bonus:**

Nechť  $\mathcal{R}$  je relace na A. Dokažte:

Je-li  $\mathcal{R}$  antisymetrická, tak je i  $\mathcal{R}^{-1}$  antisymetrická.

Použijte strukturu důkazu, kdy je závěr brán jako cesta.

1.

a) 
$$f(2) = 2 + 2 = 4$$
,  $f(3) = 4 + 2 \cdot 2 = 8$ ,  $f(4) = 8 + 2 \cdot 4 = 16$ ,  $f(5) = 16 + 2 \cdot 8 = 32$ .

$$f(n) = 2^n, n \in \mathbb{N}$$

b)

(0) 
$$n = 1$$
:  $2^1 = 2 = f(1)$ .

(1) 
$$n \ge 1$$
: IP:  $f(n) = 2^n$ ,  $f(n-1) = 2^{n-1}$ .

Pak 
$$f(n+1) = f(n) + 2f(n-1) \stackrel{\text{IP}}{=} 2^n + 2 \cdot 2^{n-1} = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$$
.

2.

(0) 
$$n = 1$$
:  $f(1) = \frac{(1-1)\cdot 1}{2} = 0 \le 1^2$ .

(1) 
$$n \ge 1$$
: IP:  $f(n) \le n^2$ .

(0) 
$$n = 1$$
:  $f(1) = \frac{(n-2)^2}{2} = 0 \le 1^2$ .  
(1)  $n \ge 1$ : IP:  $f(n) \le n^2$ .  
Pak  $f(n+1) = f(n) + n \le n^2 + n \le n^2 + 1 \le (n+1)^2$ .

## Bonus.

$$\forall a, b \in A$$
.

předpoklad 
$$(a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a) \Rightarrow a = b$$
.

$$a\mathcal{R}b \iff b\mathcal{R}^{-1}a \wedge b\mathcal{R}a \iff a\mathcal{R}^{-1}b.$$

z předpokladu tedy platí:  $(b\mathcal{R}^{-1}a \wedge a\mathcal{R}^{-1}b) \Rightarrow a = b$ .

což je přesná definice antisymetrie pro  $\mathcal{R}^{-1}$ .