距離空間の間の連続性は ε - δ と同値だよ

定義 0.1

 $(X,\mathcal{O}_X),(Y,\mathcal{O}_Y)$ を位相空間とする. $f:X\to Y$ が連続関数 であるとは、

$$\forall U \in \mathcal{O}_Y, f^{-1}(U) \in \mathcal{O}_X$$

が成り立つことである.

まずは ε - δ を距離空間の言葉から位相っぽく言い換えよう.

$$\forall y \in X, d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

$$\iff y \in N(x, \delta) \implies f(y) \in N(f(x), \varepsilon$$

$$\iff y \in N(x, \delta) \implies y \in f^{-1}(N(f(x), \varepsilon))$$

$$\iff N(x, \delta) \subset f^{-1}(N(f(x), \varepsilon))$$

 $f(x) \in B \iff x \in f^{-1}(B)$ であることに注意されたい.そこがミソ である¹. さて次の命題を示せば,距離空間での話が位相の言葉に直 されたたことになる.

 $^{^{1}}$ ちなみに $f(x) \in f(A)$ の同値な言い換えは $\exists x' \in A \text{ s.t. } f(x') = f(x)$ である. 不便だね. なお逆像の便利な性質は写像の well-defined 性に起因しているから,f に 単射性を課せば $f(x) \in f(A) \iff x \in A$ となる.嬉しいね.

命題 0.2

距離空間 $(X,d_X),(Y,d_Y)$ の間の写像 $f:X\to Y$ に関して, ε - δ 式の連続性は位相空間の間の写像の連続性と同値である.すなわち

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ s.t. } N_X(x, \delta) \subset f^{-1}(N_Y(f(x), \varepsilon))$$

$$\iff \forall O' \in \mathfrak{N}_Y(f(x)), \exists O \in \mathfrak{N}_X(x) \text{ s.t. } O \subset f^{-1}(O')$$

が成り立つ.

証明 (\Longrightarrow) 任意の $O' \in \mathfrak{N}_Y(f(x))$ を取る. O' は f(x) を含み開だから, $f(x) \in O'$ について $\exists \overline{\varepsilon}$ s.t. $N_X(x, \overline{\varepsilon}) \subset O'$ が言える. 仮定より得られた δ について $N_Y(f(x), \delta) \in \mathfrak{N}_X(x)$ である.

位相の連続写像の定義の正当性がこれで納得できると思う.