
a

Vraie pour chaque échantillon

Vraie pour la loi


C1 Locale linéaire



$A\mathbf{x} = 0$

$\nabla\cdot\mathbf{u} = 0$, $\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$
Conditions aux limites linéaires homogènes


C2 Locale non linéaire



$c(\mathbf{x}) = 0$

Résidu d'EDP stationnaire


C3 Symétrie



$g_{\#}\mu = \mu$

$\mathbf{B} \mapsto -\mathbf{B}$
Rotation R_π (VKS)

C4 Statistique en loi



$\mathbb{E}_\mu[\mathcal{L}\varphi] = 0$

Bilan d'énergie
$\mathbb{E}[\varepsilon] = \mathbb{E}[P]$


Mécanisme adapté

Potentiels $\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A}$ *ou* Projection de Leray	Projection non linéaire *ou* Pénalité, guidage	v_θ équivariant *et* Loi de base invariante	Perte de stationnarité *ou* Inclinaison exponentielle


b

Bilan d'énergie (C4) *Allures illustratives*


Loi vraie



Projection par échantillon




Correction en loi









$\mathbb{E} = 0$, Var > 0	$\mathbb{E} = 0$, Var = 0	$\mathbb{E} = 0$, Var > 0