

The Barthel Index of Activities of Daily Living

Patient Name

Date of Birth (DD/MM/YYYY):

Age

HN : VN /AN :.....

Visit/ Admit Date :..... Gender:

Allergies:.....

กิจกรรม / คะแนน	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
1. Feeding (การรับประทานอาหารเมื่อเตรียมสำหรับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า) 0 = ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อนให้ 5 = ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้ หรือตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ไว้ล่วงหน้า 10 = ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกติ				
2. Transfers (ลูกนั่งจากพื้นนอนหรือจากเตียงไปยังเก้าอี้) 0 = ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) 5 = สามารถนั่งได้ แต่ต้องการความช่วยเหลือมากจากคน 1-2 คนพยุงหรือดันขึ้นมา จึงจะนั่งอยู่ได้ 10 = ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่นบอกให้ทำตามหรือช่วยพยุงเล็กน้อย 15 = ทำได้เอง รวมทั้งสามารถถอดครกเช็นและยกที่วางเท้าขึ้น				
3. Grooming (ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวดในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงที่ผ่านมา) 0 = ต้องการความช่วยเหลือ 5 = ทำได้เอง (รวมทั้งที่ทำได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้)				
4. Toilet Use (การใช้ห้องส้วม) 0 = ช่วยตัวเองไม่ได้ 5 = ต้องการความช่วยเหลือ แต่สามารถทำบางอย่างได้เอง 10 = ช่วยตัวเองได้ดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถส้วมได้เอง ทำความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จธุระแล้ว ใส่เสื้อผ้าได้เรียบร้อย)				
5. Bathing (การอาบน้ำ) 0 = ต้องมีคนช่วยหรือทำให้ 5 = อาบน้ำได้เอง (อาบน้ำฝักบัวได้เอง)				
6. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน) 0 = นั่งบนรถเข็น แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ 5 = นั่งบนรถเข็นแล้วเคลื่อนที่เองได้ ไม่ต้องมีคนเข็นให้ และจะต้องเข้าออกมุมห้องหรือประตูได้ 10 = เดินหรือเคลื่อนที่ได้โดยมีคนช่วย 1 คน โดยบอกให้ทำตามหรือช่วยพยุง 15 = เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง (อาจใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน)				
7. Stairs (การขึ้น-ลงบันได) 0 = ไม่สามารถทำได้ 5 = ต้องการคนช่วยเหลือ 10 = ขึ้น-ลงได้เอง (ถ้าต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น Walker จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย)				
8. Dressing (การสวมใส่เสื้อผ้า) 0 = ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองไม่ได้เลยหรือนิดหน่อย 5 = ช่วยตัวเองได้ราวร้อยละ 50 ที่เหลือต้องมีคนช่วย 10 = ช่วยตัวเองได้ดี รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิปหรือใส่เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เหมาะสมได้				
9. Bowels (การกลั้นอุจจาระในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา) 0 = กลั้นไม่ได้ 5 = กลั้นไม่ได้เป็นบางครั้ง (น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์) หรือต้องการช่วยโดยการสวนหรือเหน็บยา 10 = กลั้นได้เป็นปกติ สามารถใช้การสวนหรือเหน็บยาเมื่อต้องการ				
10. Bladder (การกลั้นปัสสาวะในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา) 0 = กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลเองได้ 5 = กลั้นไม่ได้เป็นบางครั้ง (น้อยกว่าวันละ 1 ครั้ง) 10 = กลั้นได้เป็นปกติ				
คะแนนรวม				

The Barthel Index of Activities of Daily Living



Patient Name
 Date of Birth (DD/MM/YYYY):
 Age
 HN : VN /AN :
 Visit/ Admit Date : Gender:
 Allergies:.....

คะแนนรวม (0-100) : การแปลผลของคะแนน

0 – 20	=	สูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันมากที่สุด
25 – 45	=	สูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันมาก
50 – 70	=	สูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันปานกลาง
75 – 95	=	สูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันน้อย
100	=	ทำกิจวัตรประจำวันได้เอง ไม่ต้องมีคนช่วย