



FACULTY OF MATHEMATICS,  
PHYSICS AND INFORMATICS

Comenius University  
Bratislava

Rozpoznávanie Obrázcov

## 2. Cvičenie - Štatistika

Ing. Viktor Kocur, PhD.

22.2.2022



## Klasická

Pravdepodobnosť javu  $A$  je jeho relatívna početnosť v pokusoch:

$$P(A) = \frac{N_A}{N}$$

## Limitná

Pravdepodobnosť javu  $A$  je jeho relatívna početnosť v nekonečne pokusov:

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_A}{N}$$



## $\sigma$ -algebra

Pole javov  $\mathcal{A}$  je  $\sigma$ -algebra na  $\Omega$  teda preň platia:

$$\Omega \in \mathcal{A} \quad (1)$$

$$A \in \mathcal{A} \implies A^c \in \mathcal{A} \quad (2)$$

$$(\forall n \in \mathbb{N})(A_n \in \mathcal{A}) \implies \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A} \quad (3)$$

## Elementárny jav

Elementárny jav je taký jav z  $\Omega$ , ktorý sa nedá rozložiť na iné javy.



## Pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť je funkcia  $P : \mathcal{A} \rightarrow \langle 0, 1 \rangle$ , taká že spĺňa:

$$P(\Omega) = 1 \quad (4)$$

$$P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n), \quad (5)$$

ak  $A_n$  je postupnosť po dvoch disjunktných javov.

## Pravdepodobnostný priestor

Pravdepodobnostný priestor je trojica  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ .



## Zjednotenie

Zjednotenie  $A \cup B$  nastane ak nastane aspoň jeden z javov.

## Prienik

Prienik  $A \cap B$  nastane ak nastanú oba javy.

## Opačný jav

Opačný jav k  $A$  je  $A^c$ .

## Nezlučiteľné javy

Ak  $A \cap B = \emptyset$  tak sú to nezlučiteľné javy.



Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou:

- Padne číslo  $X$

- ▶ počet priaznivých elementárnych javov
- ▶ celkový počet elementárnych javov

- Padne nepárne číslo

- ▶ počet priaznivých elementárnych javov
- ▶ celkový počet elementárnych javov



Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou:

- Padne číslo X

- ▶ počet priaznivých elementárnych javov = 1
- ▶ celkový počet elementárnych javov = 6

- Padne nepárne číslo

- ▶ počet priaznivých elementárnych javov
- ▶ celkový počet elementárnych javov



Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou:

- Padne číslo  $X = \frac{1}{6}$ 
  - ▶ počet priaznivých elementárnych javov = 1
  - ▶ celkový počet elementárnych javov = 6
- Padne nepárne číslo
  - ▶ počet priaznivých elementárnych javov
  - ▶ celkový počet elementárnych javov





Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou:

- Padne číslo  $X = \frac{1}{6}$ 
  - ▶ počet priaznivých elementárnych javov = 1
  - ▶ celkový počet elementárnych javov = 6
- Padne nepárne číslo
  - ▶ počet priaznivých elementárnych javov = 3
  - ▶ celkový počet elementárnych javov = 6



Aká je pravdepodobnosť, že pri hode kockou:

- Padne číslo  $X = \frac{1}{6}$ 
  - ▶ počet priaznivých elementárnych javov = 1
  - ▶ celkový počet elementárnych javov = 6
- Padne nepárne číslo =  $\frac{1}{2}$ 
  - ▶ počet priaznivých elementárnych javov = 3
  - ▶ celkový počet elementárnych javov = 6



Dodávka obsahuje 50 matíc a 150 skrutiek. Polovica matíc a polovica skrutiek je hrdzavá. Ak náhodne vyberieme jednu súčiastku, aká je pravdepodobnosť, že to bude matica alebo, že to bude hrdzavá súčiastka?



Dodávka obsahuje 50 matíc a 150 skrutiek. Polovica matíc a polovica skrutiek je hrdzavá. Ak náhodne vyberieme jednu súčiastku, aká je pravdepodobnosť, že to bude matica alebo, že to bude hrdzavá súčiastka?

Pokus má 200 možných výsledkov.



Dodávka obsahuje 50 matíc a 150 skrutiek. Polovica matíc a polovica skrutiek je hrdzavá. Ak náhodne vyberieme jednu súčiastku, aká je pravdepodobnosť, že to bude matica alebo, že to bude hrdzavá súčiastka?

Pokus má 200 možných výsledkov.

- Označme  $A$  súčiastka je hrdzavá - 100.
- Označme  $B$  súčiastka je matica - 50.



Dodávka obsahuje 50 matíc a 150 skrutiek. Polovica matíc a polovica skrutiek je hrdzavá. Ak náhodne vyberieme jednu súčiastku, aká je pravdepodobnosť, že to bude matica alebo, že to bude hrdzavá súčiastka?

Pokus má 200 možných výsledkov.

- Označme  $A$  súčiastka je hrdzavá - 100.
- Označme  $B$  súčiastka je matica - 50.
- Označme  $A \cap B$  súčiastka je hrdzavá matica - 25.



Dodávka obsahuje 50 matíc a 150 skrutiek. Polovica matíc a polovica skrutiek je hrdzavá. Ak náhodne vyberieme jednu súčiastku, aká je pravdepodobnosť, že to bude matica alebo, že to bude hrdzavá súčiastka?

Pokus má 200 možných výsledkov.

- Označme  $A$  súčiastka je hrdzavá - 100.
- Označme  $B$  súčiastka je matica - 50.
- Označme  $A \cap B$  súčiastka je hrdzavá matica - 25.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{100}{200} + \frac{50}{200} - \frac{25}{200} = \frac{5}{8}$



## Podmienená pravdepodobnosť

Pravdepodobnosť že nastane jav  $A$  za podmienky, že nastal jav  $B$ :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$





Ovca porodila dve jahniatka. Určite pravdepodobnosť, že obe sú barani, ak vieme, že jedno z detí je baran.



Ovca porodila dve jahniatka. Určite pravdepodobnosť, že obe sú barani, ak vieme, že jedno z detí je baran.

■  $\Omega = \{(b, b), (b, o), (o, b), (o, o)\}$



Ovca porodila dve jahniatka. Určite pravdepodobnosť, že obe sú barani, ak vieme, že jedno z detí je baran.

- $\Omega = \{(b, b), (b, o), (o, b), (o, o)\}$
- Označme  $A$  obe deti sú barani  $\{(b, b)\}$ .
- Označme  $B$  aspoň jedno dieťa je baran  $\{(b, b), (b, o), (o, b)\}$



Ovca porodila dve jahniatka. Určite pravdepodobnosť, že obe sú barani, ak vieme, že jedno z detí je baran.

- $\Omega = \{(b, b), (b, o), (o, b), (o, o)\}$
- Označme  $A$  obe deti sú barani  $\{(b, b)\}$ .
- Označme  $B$  aspoň jedno dieťa je baran  $\{(b, b), (b, o), (o, b)\}$
- $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$



## Rozklad výberového priestoru

Množiná navzájom disjunktných javov  $\{B_1, \dots, B_n\}$  z  $\Omega$  tvorí rozklad výberového priestoru ak  $\bigcup_{i \in \hat{n}} B_i = \Omega$ .

## Veta o úplnej pravdepodobnosti

Nech  $\{B_1, \dots, B_n\}$  tvorí rozklad výberového priestoru  $\Omega$ . Porom pre jav  $A \in \Omega$  platí:

$$P(A) = \sum_{k \in \hat{n}} P(A|B_i)P(B_i)$$



Elektrické žiarovky sú vyrábané 3 závodmi. Prvý dodáva 25%, druhý 40% a tretí 35% celej dodávky. Z celkovej produkcie 1. závodu je 88%, 2. závodu 75%, 3. závodu 85% štandardných. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná žiarovka je štandardná?



Elektrické žiarovky sú vyrábané 3 závodmi. Prvý dodáva 25%, druhý 40% a tretí 35% celej dodávky. Z celkovej produkcie 1. závodu je 88%, 2. závodu 75%, 3. závodu 85% štandardných. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná žiarovka je štandardná?

- $B_i$  je pravdepodobnosť, že žiarovka bola vyrobená v  $i$ -tom závode



Elektrické žiarovky sú vyrábané 3 závodmi. Prvý dodáva 25%, druhý 40% a tretí 35% celej dodávky. Z celkovej produkcie 1. závodu je 88%, 2. závodu 75%, 3. závodu 85% štandardných. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná žiarovka je štandardná?

- $B_i$  je pravdepodobnosť že žiarovka bola vyrobená v  $i$ -tom závode
- $P(B_1) = 0.25, P(B_2) = 0.4, P(B_3) = 0.35$





Elektrické žiarovky sú vyrábané 3 závodmi. Prvý dodáva 25%, druhý 40% a tretí 35% celej dodávky. Z celkovej produkcie 1. závodu je 88%, 2. závodu 75%, 3. závodu 85% štandardných. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná žiarovka je štandardná?

- $B_i$  je pravdepodobnosť že žiarovka bola vyrobená v i-tom závode
- $P(B_1) = 0.25, P(B_2) = 0.4, P(B_3) = 0.35$
- $P(A|B_1) = 0.88, P(A|B_2) = 0.75, P(A|B_3) = 0.85$



Elektrické žiarovky sú vyrábané 3 závodmi. Prvý dodáva 25%, druhý 40% a tretí 35% celej dodávky. Z celkovej produkcie 1. závodu je 88%, 2. závodu 75%, 3. závodu 85% štandardných. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná žiarovka je štandardná?

- $B_i$  je pravdepodobnosť že žiarovka bola vyrobená v  $i$ -tom závode
- $P(B_1) = 0.25, P(B_2) = 0.4, P(B_3) = 0.35$
- $P(A|B_1) = 0.88, P(A|B_2) = 0.75, P(A|B_3) = 0.85$
- $P(A) = \sum_{k \in \hat{\Omega}} P(A|B_i)P(B_i)$



Elektrické žiarovky sú vyrábané 3 závodmi. Prvý dodáva 25%, druhý 40% a tretí 35% celej dodávky. Z celkovej produkcie 1. závodu je 88%, 2. závodu 75%, 3. závodu 85% štandardných. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná žiarovka je štandardná?

- $B_i$  je pravdepodobnosť že žiarovka bola vyrobená v  $i$ -tom závode
- $P(B_1) = 0.25, P(B_2) = 0.4, P(B_3) = 0.35$
- $P(A|B_1) = 0.88, P(A|B_2) = 0.75, P(A|B_3) = 0.85$
- $P(A) = \sum_{k \in \hat{\Omega}} P(A|B_i)P(B_i)$
- $P(A) = 0.88 \cdot 0.25 + 0.75 \cdot 0.4 + 0.85 \cdot 0.35 = 0.8175$



Elektrónka zapojená v televízore môže byť od 4 rôznych výrobcov s pravdepodobnosťami 0,2; 0,3; 0,35; 0,15 pre jednotlivých výrobcov. Pravdepodobnosti, že elektrónky od jednotlivých výrobcov vydržia predpísaný počet hodín sú postupne 0,45; 0,60; 0,75; 0,30. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybratá elektrónka vydrží predpísaný počet hodín?



Elektrónka zapojená v televízore môže byť od 4 rôznych výrobcov s pravdepodobnosťami 0,2; 0,3; 0,35; 0,15 pre jednotlivých výrobcov. Pravdepodobnosti, že elektrónky od jednotlivých výrobcov vydržia predpísaný počet hodín sú postupne 0,45; 0,60; 0,75; 0,30. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybratá elektrónka vydrží predpísaný počet hodín?

- $B_i$  je pravdepodobnosť že žiarovka bola vyrobená v  $i$ -tym výrobcom



Elektrónka zapojená v televízore môže byť od 4 rôznych výrobcov s pravdepodobnosťami 0,2; 0,3; 0,35; 0,15 pre jednotlivých výrobcov. Pravdepodobnosti, že elektrónky od jednotlivých výrobcov vydržia predpísaný počet hodín sú postupne 0,45; 0,60; 0,75; 0,30. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybratá elektrónka vydrží predpísaný počet hodín?

- $B_i$  je pravdepodobnosť že žiarovka bola vyrobená v  $i$ -tym výrobcom
- $P(B_1) = 0.2, P(B_2) = 0.3, P(B_3) = 0.35, P(B_4) = 0.15$



Elektrónka zapojená v televízore môže byť od 4 rôznych výrobcov s pravdepodobnosťami 0,2; 0,3; 0,35; 0,15 pre jednotlivých výrobcov. Pravdepodobnosti, že elektrónky od jednotlivých výrobcov vydržia predpísaný počet hodín sú postupne 0,45; 0,60; 0,75; 0,30. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybratá elektrónka vydrží predpísaný počet hodín?

- $B_i$  je pravdepodobnosť že žiarovka bola vyrobená v  $i$ -tym výrobcovi
- $P(B_1) = 0.2, P(B_2) = 0.3, P(B_3) = 0.35, P(B_4) = 0.15$
- $P(A|B_1) = 0.45, P(A|B_2) = 0.6, P(A|B_3) = 0.75, P(A|B_4) = 0.3$



Elektrónka zapojená v televízore môže byť od 4 rôznych výrobcov s pravdepodobnosťami 0,2; 0,3; 0,35; 0,15 pre jednotlivých výrobcov. Pravdepodobnosti, že elektrónky od jednotlivých výrobcov vydržia predpísaný počet hodín sú postupne 0,45; 0,60; 0,75; 0,30. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybratá elektrónka vydrží predpísaný počet hodín?

- $B_i$  je pravdepodobnosť že žiarovka bola vyrobená v  $i$ -tym výrobcovi
- $P(B_1) = 0.2, P(B_2) = 0.3, P(B_3) = 0.35, P(B_4) = 0.15$
- $P(A|B_1) = 0.45, P(A|B_2) = 0.6, P(A|B_3) = 0.75, P(A|B_4) = 0.3$
- $P(A) = \sum_{k \in \hat{4}} P(A|B_i)P(B_i)$





Elektrónka zapojená v televízore môže byť od 4 rôznych výrobcov s pravdepodobnosťami 0,2; 0,3; 0,35; 0,15 pre jednotlivých výrobcov. Pravdepodobnosti, že elektrónky od jednotlivých výrobcov vydržia predpísaný počet hodín sú postupne 0,45; 0,60; 0,75; 0,30. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybratá elektrónka vydrží predpísaný počet hodín?

- $B_i$  je pravdepodobnosť že žiarovka bola vyrobená v  $i$ -tym výrobcovi
- $P(B_1) = 0.2, P(B_2) = 0.3, P(B_3) = 0.35, P(B_4) = 0.15$
- $P(A|B_1) = 0.45, P(A|B_2) = 0.6, P(A|B_3) = 0.75, P(A|B_4) = 0.3$
- $P(A) = \sum_{k \in \hat{4}} P(A|B_i)P(B_i)$
- $P(A) = 0.45 \cdot 0.2 + 0.6 \cdot 0.3 + 0.75 \cdot 0.35 + 0.3 \cdot 0.15 = 0.5775$



V terénnej súťaži spoľahlivosti zostalo 10 motocyklov prvej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť jazdy 85%, 8 motocyklov druhej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 75%, 5 motocyklov tretej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 60%. Aká je pravdepodobnosť, že nasledujúci deň náhodne vybraný motocykel nedošiel?



V terénnej súťaži spoľahlivosti zostalo 10 motocyklov prvej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť jazdy 85%, 8 motocyklov druhej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 75%, 5 motocyklov tretej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 60%. Aká je pravdepodobnosť, že nasledujúci deň náhodne vybraný motocykel nedošiel?

- Označíme ako  $A$  pravdepodobnosť že motorka dojde.



V terénnej súťaži spoľahlivosti zostalo 10 motocyklov prvej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť jazdy 85%, 8 motocyklov druhej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 75%, 5 motocyklov tretej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 60%. Aká je pravdepodobnosť, že nasledujúci deň náhodne vybraný motocykel nedošiel?

- Označíme ako  $A$  pravdepodobnosť že motorka dojde.
- $B_i$  je spoľahlivosť motorky  $i$ -tej série.



V terénnej súťaži spoľahlivosti zostalo 10 motocyklov prvej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť jazdy 85%, 8 motocyklov druhej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 75%, 5 motocyklov tretej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 60%. Aká je pravdepodobnosť, že nasledujúci deň náhodne vybraný motocykel nedošiel?

- Označíme ako  $A$  pravdepodobnosť že motorka dojde.
- $B_i$  je spoľahlivosť motorky  $i$ -tej série.
- $P(A) = \sum_{k \in \hat{\Omega}} P(A|B_i)P(B_i)$



V terénnej súťaži spoľahlivosti zostalo 10 motocyklov prvej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť jazdy 85%, 8 motocyklov druhej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 75%, 5 motocyklov tretej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 60%. Aká je pravdepodobnosť, že nasledujúci deň náhodne vybraný motocykel nedošiel?

- Označíme ako  $A$  pravdepodobnosť že motorka dojde.
- $B_i$  je spoľahlivosť motorky  $i$ -tej série.
- $P(A) = \sum_{k \in \hat{\Omega}} P(A|B_i)P(B_i)$
- $P(A) = 0.85 \cdot \frac{8}{23} + 0.75 \cdot \frac{8}{23} + 0.6 \cdot \frac{5}{23} = 0.24$



V terénnej súťaži spoľahlivosti zostalo 10 motocyklov prvej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť jazdy 85%, 8 motocyklov druhej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 75%, 5 motocyklov tretej série, ktoré vykazovali spoľahlivosť 60%. Aká je pravdepodobnosť, že nasledujúci deň náhodne vybraný motocykel nedošiel?

- Označíme ako  $A$  pravdepodobnosť že motorka dojde.
- $B_i$  je spoľahlivosť motorky  $i$ -tej série.
- $P(A) = \sum_{k \in \hat{\Omega}} P(A|B_i)P(B_i)$
- $P(A) = 0.85 \cdot \frac{8}{23} + 0.75 \cdot \frac{8}{23} + 0.6 \cdot \frac{5}{23} = 0.24$
- Výsledok  $= P(A^c) = 1 - P(A) = 0.76$



V pivnici je tma. Kompóty sú poukladané na policiach. Na prvej polici je 6 čučoriedkových a 10 malinových kompótov, na druhej polici je 7 čučoriedkových a 5 malinových kompótov. Marienka preložila jeden kompót z prvej police na druhú. Janko si potom vybral jeden kompót z a) prvej police, b) druhej police. Aká je pravdepodobnosť, že si vybral malinový?

Riešenie a)





V pivnici je tma. Kompóty sú poukladané na policiach. Na prvej polici je 6 čučoriedkových a 10 malinových kompótov, na druhej polici je 7 čučoriedkových a 5 malinových kompótov. Marienka preložila jeden kompót z prvej police na druhú. Janko si potom vybral jeden kompót z a) prvej police, b) druhej police. Aká je pravdepodobnosť, že si vybral malinový?

Riešenie a)

- $B_1$  - 5 čučoriedkových a 10 malinových na prvej polici
- $B_2$  - 6 čučoriedkových a 9 malinových na prvej polici



V pivnici je tma. Kompóty sú poukladané na policiach. Na prvej polici je 6 čučoriedkových a 10 malinových kompótov, na druhej polici je 7 čučoriedkových a 5 malinových kompótov. Marienka preložila jeden kompót z prvej police na druhú. Janko si potom vybral jeden kompót z a) prvej police, b) druhej police. Aká je pravdepodobnosť, že si vybral malinový?

Riešenie a)

- $B_1$  - 5 čučoriedkových a 10 malinových na prvej polici
- $B_2$  - 6 čučoriedkových a 9 malinových na prvej polici
- $P(A|B_1) = \frac{10}{15}, P(A|B_2) = \frac{9}{15}$



V pivnici je tma. Kompóty sú poukladané na policiach. Na prvej polici je 6 čučoriedkových a 10 malinových kompótov, na druhej polici je 7 čučoriedkových a 5 malinových kompótov. Marienka preložila jeden kompót z prvej police na druhú. Janko si potom vybral jeden kompót z a) prvej police, b) druhej police. Aká je pravdepodobnosť, že si vybral malinový?

Riešenie a)

- $B_1$  - 5 čučoriedkových a 10 malinových na prvej polici
- $B_2$  - 6 čučoriedkových a 9 malinových na prvej polici
- $P(A|B_1) = \frac{10}{15}, P(A|B_2) = \frac{9}{15}$
- $P(A) = \frac{10}{15} \cdot \frac{6}{16} + \frac{9}{15} \cdot \frac{10}{16} = 0.625$



Katarína A., Lenka B. a Monika C. sa spolu učia na maturitu. Z 30 maturitných otázok z angličtiny sa však stihli naučiť len prvých 20. Aká je pravdepodobnosť, že a) Lenka b) Monika si vytiahne otázku, ktorú vie, ak odpovedajú v poradí podľa abecedy a každá musí mať inú otázku?

Riešenie a)



Katarína A., Lenka B. a Monika C. sa spolu učia na maturitu. Z 30 maturitných otázok z angličtiny sa však stihli naučiť len prvých 20. Aká je pravdepodobnosť, že a) Lenka b) Monika si vytiahne otázku, ktorú vie, ak odpovedajú v poradí podľa abecedy a každá musí mať inú otázku?

Riešenie a)

- $B_1$  - Katka vytiahne otázku, ktorú vie
- $B_2$  - Katka vytiahne otázku, ktorú nevie



Katarína A., Lenka B. a Monika C. sa spolu učia na maturitu. Z 30 maturitných otázok z angličtiny sa však stihli naučiť len prvých 20. Aká je pravdepodobnosť, že a) Lenka b) Monika si vytiahne otázku, ktorú vie, ak odpovedajú v poradí podľa abecedy a každá musí mať inú otázku?

Riešenie a)

- $B_1$  - Katka vytiahne otázku, ktorú vie
- $B_2$  - Katka vytiahne otázku, ktorú nevie
- $P(A|B_1) = \frac{20}{30}, P = \frac{10}{30}$



Katarína A., Lenka B. a Monika C. sa spolu učia na maturitu. Z 30 maturitných otázok z angličtiny sa však stihli naučiť len prvých 20. Aká je pravdepodobnosť, že a) Lenka b) Monika si vytiahne otázku, ktorú vie, ak odpovedajú v poradí podľa abecedy a každá musí mať inú otázku?

Riešenie a)

- $B_1$  - Katka vytiahne otázku, ktorú vie
- $B_2$  - Katka vytiahne otázku, ktorú nevie
- $P(A|B_1) = \frac{20}{30}, P = \frac{10}{30}$
- $P(A) = \frac{19}{29} \cdot \frac{20}{30} + \frac{20}{29} \cdot \frac{10}{30} = \frac{2}{3}$



## Bayesov vzorec

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$





Karlovi urobili v rámci prehliadky Rtg hrudníku, ktorý sa vrátil s pozitívnym nálezom na rakovinu pľúc. Aká je pravdepodobnosť, že Karol má rakovinu, ak vieme, že test je falošne pozitívny v 5% prípadov a falošne negatívny v 40% prípadov. A tiež vieme, že iba jeden z 500 zamestnancov v Karlovej pozícii má rakovinu.



Karlovi urobili v rámci prehliadky Rtg hrudníku, ktorý sa vrátil s pozitívnym nálezom na rakovinu pľúc. Aká je pravdepodobnosť, že Karol má rakovinu, ak vieme, že test je falošne pozitívny v 5% prípadov a falošne negatívny v 40% prípadov. A tiež vieme, že iba jeden z 500 zamestnancov v Karlovej pozícii má rakovinu.

- $P(A_p) = 0.002$  - chorý,  $P(A_n) = 0.998$  - zdravý
- $B$  - pozitívny test



Karolovi urobili v rámci prehliadky Rtg hrudníku, ktorý sa vrátil s pozitívnym nálezom na rakovinu pľúc. Aká je pravdepodobnosť, že Karol má rakovinu, ak vieme, že test je falošne pozitívny v 5% prípadov a falošne negatívny v 40% prípadov. A tiež vieme, že iba jeden z 500 zamestnancov v Karolovej pozícii má rakovinu.

- $P(A_p) = 0.002$  - chorý,  $P(A_n) = 0.998$  - zdravý
- $B$  - pozitívny test
- $P(B|A_p) = 0.6, P(B|A_n) = 0.05$



Karolovi urobili v rámci prehliadky Rtg hrudníku, ktorý sa vrátil s pozitívnym nálezom na rakovinu pľúc. Aká je pravdepodobnosť, že Karol má rakovinu, ak vieme, že test je falošne pozitívny v 5% prípadov a falošne negatívny v 40% prípadov. A tiež vieme, že iba jeden z 500 zamestnancov v Karolovej pozícii má rakovinu.

- $P(A_p) = 0.002$  - chorý,  $P(A_n) = 0.998$  - zdravý
- $B$  - pozitívny test
- $P(B|A_p) = 0.6, P(B|A_n) = 0.05$
- $P(A_p|B) = \frac{0.6 \cdot 0.002}{0.6 \cdot 0.002 + 0.05 \cdot 0.998} = 0.024$



Rovnaký test ako Karol podstúpil aj Peter a tiež mu vyšiel pozitívny test. Peter však 20 rokov pracoval ako baník v banskom dole. Peter vie, že 15% jeho bývalých kolegov má rakovinu pľúc. Ak sa ostatné podmienky nezmenili, aká je pravdepodobnosť, že rakovinu má aj Peter?



Rovnaký test ako Karol podstúpil aj Peter a tiež mu vyšiel pozitívny test. Peter však 20 rokov pracoval ako baník v banskom dole. Peter vie, že 15% jeho bývalých kolegov má rakovinu pľúc. Ak sa ostatné podmienky nezmenili, aká je pravdepodobnosť, že rakovinu má aj Peter?

- $P(A_p) = 0.15$  - chorý,  $P(A_n) = 0.85$  - zdravý
- $B$  - pozitívny test



Rovnaký test ako Karol podstúpil aj Peter a tiež mu vyšiel pozitívny test. Peter však 20 rokov pracoval ako baník v banskom dole. Peter vie, že 15% jeho bývalých kolegov má rakovinu pľúc. Ak sa ostatné podmienky nezmenili, aká je pravdepodobnosť, že rakovinu má aj Peter?

- $P(A_p) = 0.15$  - chorý,  $P(A_n) = 0.85$  - zdravý
- $B$  - pozitívny test
- $P(B|A_p) = 0.6, P(B|A_n) = 0.05$



Rovnaký test ako Karol podstúpil aj Peter a tiež mu vyšiel pozitívny test. Peter však 20 rokov pracoval ako baník v banskom dole. Peter vie, že 15% jeho bývalých kolegov má rakovinu pľúc. Ak sa ostatné podmienky nezmenili, aká je pravdepodobnosť, že rakovinu má aj Peter?

■  $P(A_p) = 0.15$  - chorý,  $P(A_n) = 0.85$  - zdravý

■  $B$  - pozitívny test

■  $P(B|A_p) = 0.6, P(B|A_n) = 0.05$

■  $P(A_p) = \frac{0.6 \cdot 0.15}{0.6 \cdot 0.15 + 0.05 \cdot 0.85} = 0.679$





Predpokladajme, že máme školu so 60% chlapcami a 40% dievčatami. Všetci chlapci nosia nohavice a z dievčat nosí nohavice polovica. Pozorovateľ vidí z diaľky študenta v nohaviciach. Aká je pravdepodobnosť, že ten náhodný študent je dievča?



Predpokladajme, že máme školu so 60% chlapcami a 40% dievčatami. Všetci chlapci nosia nohavice a z dievčat nosí nohavice polovica. Pozorovateľ vidí z diaľky študenta v nohaviciach. Aká je pravdepodobnosť, že ten náhodný študent je dievča?

- $P(A_c) = 0.6$  - chlapec,  $P(A_d) = 0.4$  - dievča
- $B$  - osoba má nohavice



Predpokladajme, že máme školu so 60% chlapcami a 40% dievčatami. Všetci chlapci nosia nohavice a z dievčat nosí nohavice polovica. Pozorovateľ vidí z diaľky študenta v nohaviciach. Aká je pravdepodobnosť, že ten náhodný študent je dievča?

- $P(A_c) = 0.6$  - chlapec,  $P(A_d) = 0.4$  - dievča
- $B$  - osoba má nohavice
- $P(B|A_c) = 1, P(B|A_d) = 0.5$



Predpokladajme, že máme školu so 60% chlapcami a 40% dievčatami. Všetci chlapci nosia nohavice a z dievčat nosí nohavice polovica. Pozorovateľ vidí z diaľky študenta v nohaviciach. Aká je pravdepodobnosť, že ten náhodný študent je dievča?

- $P(A_c) = 0.6$  - chlapec,  $P(A_d) = 0.4$  - dievča

- $B$  - osoba má nohavice

- $P(B|A_c) = 1, P(B|A_d) = 0.5$

- $P(A_p) = \frac{0.5 \cdot 0.4}{0.5 \cdot 0.4 + 0.6} = 0.25$



## Náhodná premenná

Funkcia, ktorej hodnota je určená výsledkom náhodného pokusu. Prirad'uje číselnú hodnotu každému javu.

## Distribučná funkcia

Opisuje rozdelenie pravdepodobnosti náhodnej premennej definovanej na pravdepodobnostnom priestore.



Máme 4 stroje (nezávislé na sebe): 1. sa pokazí s pravdepodobnosťou 10%, 2. s pravdepodobnosťou 15%, 3. s pravdepodobnosťou 30%, 4. stroj s pravdepodobnosťou 50%. Náhodná premenná  $X$  označuje počet pokazených strojov. Popíšte túto náhodnú premennú. T.j. popíšte s akými pravdepodobnosťami bude mať jednotlivé hodnoty  $\{0, \dots, 4\}$ .



Máme 4 stroje (nezávislé na sebe): 1. sa pokazí s pravdepodobnosťou 10%, 2. s pravdepodobnosťou 15%, 3. s pravdepodobnosťou 30%, 4. stroj s pravdepodobnosťou 50%. Náhodná premenná  $X$  označuje počet pokazených strojov. Popíšte túto náhodnú premennú. T.j. popíšte s akými pravdepodobnosťami bude mať jednotlivé hodnoty  $\{0, \dots, 4\}$ .

■  $P(X = 4) = 0.1 \cdot 0.15 \cdot 0.3 \cdot 0.5 = 0.00225$



Máme 4 stroje (nezávislé na sebe): 1. sa pokazí s pravdepodobnosťou 10%, 2. s pravdepodobnosťou 15%, 3. s pravdepodobnosťou 30%, 4. stroj s pravdepodobnosťou 50%. Náhodná premenná  $X$  označuje počet pokazených strojov. Popíšte túto náhodnú premennú. T.j. popíšte s akými pravdepodobnosťami bude mať jednotlivé hodnoty  $\{0, \dots, 4\}$ .

■  $P(X = 4) = 0.1 \cdot 0.15 \cdot 0.3 \cdot 0.5 = 0.00225$

■  $P(X = 0) = 0.9 \cdot 0.85 \cdot 0.7 \cdot 0.5 = 0.26775$





Máme 4 stroje (nezávislé na sebe): 1. sa pokazí s pravdepodobnosťou 10%, 2. s pravdepodobnosťou 15%, 3. s pravdepodobnosťou 30%, 4. stroj s pravdepodobnosťou 50%. Náhodná premenná  $X$  označuje počet pokazených strojov. Popíšte túto náhodnú premennú. T.j. popíšte s akými pravdepodobnosťami bude mať jednotlivé hodnoty  $\{0, \dots, 4\}$ .

$$\blacksquare P(X = 4) = 0.1 \cdot 0.15 \cdot 0.3 \cdot 0.5 = 0.00225$$

$$\blacksquare P(X = 0) = 0.9 \cdot 0.85 \cdot 0.7 \cdot 0.5 = 0.26775$$

$$\blacksquare P(X = 1) = P(S_1 \cap S_2^c \cap S_3^c \cap S_4^c) + P(S_1^c \cap S_2 \cap S_3^c \cap S_4^c) + P(S_1^c \cap S_2^c \cap S_3 \cap S_4^c) + P(S_1^c \cap S_2^c \cap S_3^c \cap S_4) = 0.4595$$



Máme 4 stroje (nezávislé na sebe): 1. sa pokazí s pravdepodobnosťou 10%, 2. s pravdepodobnosťou 15%, 3. s pravdepodobnosťou 30%, 4. stroj s pravdepodobnosťou 50%. Náhodná premenná  $X$  označuje počet pokazených strojov. Popíšte túto náhodnú premennú. T.j. popíšte s akými pravdepodobnosťami bude mať jednotlivé hodnoty  $\{0, \dots, 4\}$ .

$$\blacksquare P(X = 4) = 0.1 \cdot 0.15 \cdot 0.3 \cdot 0.5 = 0.00225$$

$$\blacksquare P(X = 0) = 0.9 \cdot 0.85 \cdot 0.7 \cdot 0.5 = 0.26775$$

$$\blacksquare P(X = 1) = P(S_1 \cap S_2^c \cap S_3^c \cap S_4^c) + P(S_1^c \cap S_2 \cap S_3^c \cap S_4^c) + P(S_1^c \cap S_2^c \cap S_3 \cap S_4^c) + P(S_1^c \cap S_2^c \cap S_3^c \cap S_4) = 0.4595$$

$$\blacksquare P(X = 2) = 0.23, P(X = 3) = 0.0405$$